

KULONLENYOMAT AZ „ERDESZETI KISERULETEK” 1945–46. XLVI. KÖTETEBŐL

Az Erdélyi Mezőség erdei növényfajainak elterjedése.

Írta:

Dr. b. Soó Rezső

egyetemi tanár (Kolozsvár—Debrecen).

Distribution des espèces sylvestres de la Mezőség Transylvaine.

Par le

Prof. R. Soó de Bere,

Az Erdélyi Mezőség erdei növényfajainak elterjedése.

Írta: Dr. b. Scó Rezső egyet. tanár (Kolozsvár—Debrecen.)

Az élet delelőjének talán négy legmunkásabb esztendejét (1941—44) töltöttem Kolozsvárott, ugyanott, ahol diákkorom lelkesen rajongó éveiben (1916—25) első könyvemen, Kolozsvár geobotanikai monográfiáján dolgoztam. Már korábban összeállítottam az irodalom és saját egykori gyűjtéseim alapján a Magyar Flóraművek számára a Mezőség flórájának előmunkálatait (beleértve Kolozsvár flóráját). Mikor ismét alkalom nyílt e terület kutatására, sőt annak növényszociológiai feltárása Kolozsvár korszerű növényföldrajzi feldolgozásával intézetem legfőbb munkaterve lett, megindult előbb a város közelebbi környékének, majd a Mezőség északnyugati részének s a szomszédos Szamosvidéknek feltárása. Utóbbi tájon Hargita Zoltán adjunktus-magántanárom kutatott, a Borsa-völgyet a mezőségi és meszes-szamosvidéki vegetációk találkozópontját (l. Soó: *Eurotia ceratoides* Erdélyben 1944) — és innen keletre a belvederei határig a területet együtt jártuk be.*.) Florisztikai eredményeim javát már közzétettem (l. Soó: Adatok a Mezőség növényzetének ismeretéhez, 1944). Az Erdélyi Medence bennszülött és reliktum jellegű pusztai fajaival, azok elterjedésével már korábban foglalkoztam (l. Soó: *Acta Geobot. Hung.* V. 1943), a kapott areatérképek alapján még nem lehet biztosan megvonni a mezőségi flóravidék, a *Praerossicum* határát, mert a kérdéses fajok fele, a *Marusicum*, a déli szomszédos Marosvidék megfelelő termőhelyein is él. Ezzel szemben jelentős azoknak az erdei vagy hegyvidéki növényfajoknak száma — részben bükkös és gyertyános-tölgyes erdők, ligetek vagy láperdők növényei —, amelyek különösen a terület északnyugati felében a zárt erdőkben honosak. Maga a bükk is mélyen behatol a földrajzi Mezőség területére (Doboka—Füzesmikola—Szék—Gyulatelke — Marokháza — Vajdakamarás — Feketelak — Uzdiszentgyörgy — Teke — Nagyercse — Marosvásárhely vonaláig), viszont jelentős darabon hiányzik a Marostól délre, az Aranyostól és a Kis-Szamostól keletre is (v. ö. Fekete-Blattny II. 4. térkép), erdészeti leg ez a terület volna mező-

*) Ezen terület adatait minden egyes faj termőhelyeinek végén sorolom fel.

séginék tekintendő. Újabban e határvonalon belül Mezőszilvásról került elő. Viszont a jellegzetes pusztai növények és növényszövetkezetek is tovább terjednek észak felé, túl a bükk határvonalán. Hasonló a gyertyán elterjedése is, de azt a Mezőség nyugati és déli határain túl már mindenfelé megtaláljuk. Ritkák a cser, a hegyi szil, a nyír, a hegyi és a platanlevelű juhar, az ezüstthárs. A bejárt terület nagyrészén — eltekintve a kolozsvári Szénafüvektől, amely azonban mesophil rétjeinek gyepjében és cserjésmaradványainban számos erdei reliktumot őriz, mint az egykor, kiirtott erdők hírmondóit — a tetőkön és északi lejtőkön az árnyékos-húvós gyertyános, olykor bükkel kevert tölgysesek mozaikszerűen változnak a déli lejtők sztyepréteivel és az omlásos-suavadásos oldalak pusztai növényzetével. Ezért nehéz a Mezőség növényföldrajzi határának pontos megállapítása (v. ö. Hargita: Scripta Bot. Mus. Transs. I. 130, II. 64). Általában a Kis-Szamos, Nagy-Szamos, Beszterce—Szászrégen, Maros, Aranyos és Torda—Kolozsvár vonalaktól közbezárt területet nevezik földrajzi-történelmi művek Mezőségnek, de a geobotanikai Mezőség, a Praerossicum átlépi nyugaton a Kis-Szamost (v. ö. Kolozsvári Szénafüvek) Kajántó—Kolozsborsa—Kecsed—Désakna vonaláig, délen a Marost és az Aranyost is. Magam Magyarország flóratérképén (1933) délnyugat felé tetemesen kiterjesztettem a Praerossicum határát, hogy az magába zárja egyes ritka sztyepnövények — mint *Polygala sibirica*, *Haplophyllum suaveolens*, *Scutellaria supina* — termőhelyeit is. Készülő flóraművemben és jelen dolgozatban azonban — a végleges határok lerögzítéséig megmaradok a növényföldrajzi művekben, mint Pax és Prodán, szereplő határok mellett.**)

A flóra kutatástörténetéről az önálló floraműben óhajtok beszámolni. E dolgozat irodalomjegyzéke azonban magában foglalja a Mezőség virágos növénycire vonatkozó teljes irodalmat. Kolozsvár botanikatörténetéről beszámoltak Soó (1927), Győrffy (1932), Nyárády (1941) és Soó (1943), a Szénafüveken Baumgarten óta (1813) jóformán minden számottevő erdélyi és magyar florista gyűjtött, 130 év munkájának összefoglaló eredménye Nyárády—Soó floraműve, talán a legterjedelmesebb és legrészletesebb lokális flóra a világirodalomban. A

**) Borza legújabb dolgozatát (Die siebenbürgische Heide, Bibl. rer. Transs. V. 1944, p. 40) csak a korrektúra alkalmával használhattam fel (rövidítve: Borza 1944). Ebbenő csak a terület déli részet (Apahida—Vsztgothárd—Teke—Szabéd—M. Iudas—Torda közzött tekinti Mezőségnek. Borza eredeti mezősségi kutatásai minden össze néhány erdő felvételére szorítkoztak (Bul. Cluj 1928). A Mezőség növényföldrajzi jellegére vonatkozó megállapításaink az övéitől függetlenek (első beszámolóm 1923, Erd. Muz. Egy. Kolozsvár). „A magyar botanikusokra”, akik — szerinte — „siettek elismerni” eredményeit, tett szokásos támadó megjegyzéseire felesleges válaszolnunk. Megjegyzése, hogy a szabédi erdő aljnövényzetének tagja: „Isten tudja, honnan származnak” (p. 33) — a mezősségi erdőkben általánosan elterjedt fajokról van szó —, vagy hogy a Stipák a „Nyugati Kárpátok sziklás hegyciből” eredő tertiár maradványok (p. 29) elárulják, hogy szerzőjük mennyire nem látja tisztán a mezősségi flóra genezisét.

Mezőség belsejében már kevesebben kultattak, jelentős Jánka Viktor (ötvenes-hatvanas évek), a közelmultban Péterfi Márton (az *Astragalus Péterpii* felfedezése), Nyárády Gyula (Marosvásárhely), Julian Prodan, Al. Borza, helyi jellegű Kovrig és Ornstein (Szamosújvár) és mások munkássága. A Mezőség növénytakarójáról, annak formációiról Prodan terjedelmes, de nem mindig találó könyvet írt (Flora Câmpiei Ardelene 1931), v. ö. Soó Scripta III. 101—2. Lengyel Géza értékes adatai a délkeleti részről csak most kerülnek nyilvánosságra. A magyar földrajzi, földtani és növénytani irodalom a Mezőséget ősi, természetes sztyepnek tartotta, talaját is valódi csernoszjomnak minősítették. Magam a kolozsvári monografiában, valamint a magyar pusztaproblémát tárgyaló munkáimban 1923 óta többször kifejtettem, hogy a Mezőség erdős-sztyep táj, az egyhangú, kopárnak látszó lankák a délorosz sztyepekhez hasonló növénytakarót hordanak (innen a Praeioccum név), a lejtőkön dúsfüvű szénamezők virulnak, a széles völgyek sós talaján az alföldi szíkesek másai, de a klimax a kevert tölgyes (*Quercetum mixtum graminosum* Soó 1927), északi felében bükkös és gyertyános tölgyes is. Ám a Mezőségen már a bronzkortól kezdve irtották és felújulásában megakadályozták az erdőt, úgy az ősi települők, mint később a román parasztság, míg a Marostól délre, a szászok földjén, akik kímélték, megmaradt s csak a déli, meredek, nagyon meleg lejtőkön, mint mikroklimatikus-physiographikus sztyepeken hiányzik. A Mezőség ősi (post-glaciális-boreális) sztyepjei később, az atlantikus periódusban javarészét beerdősültek — bár a sós talajokon és a márgás, suavadó hegyoldalakon erdő meg nem települhetett —, amit bizonyít, hogy a korábban valódi csernoszjomnak minősített (Ballenegger, Timkó—Treitz) ural-kodó mezősségi talajtípus degradált csernoszjomnak bizonyult (Enculeșcu, Saidel és Protopopescu—Pake: Anuarul Inst. Geologic al României 1925, Harta Solurilor României 1927). Az erdőirtásokkal azután tág tere nyílott az ősi pusztai vegetáció megmaradásának és ki-terjeszkedésének. (Soó 1927, Földr. Közl. 1931.) A mezősségi szénamezők erdő-cserjelakó hegyvidéki, sőt praealpin elemeinek, mint erdőreliktumoknak előfordulására már kolozsvári monografiámban rámutattam. Jelei munkám ép a jellegzetes erdei és részben erdős-sztyepnövényfajok elterjedési adatait tartalmazza, az irodalom és saját kutatásaim alapján, mint a Mezőség kritikai flórafeldolgozásának második részét (az első rész a bennszülött és reliktum pusztai fajok összeállítása Acta Geobot. Hung. V. 1943), egyben gazdag dokumentumanyag a Mezőség erdős-sztyep jellegrének igazolására. Megemlítem még, hogy míg Prodan munkáiban alig érinti a mezősségi növénytakaró genetikáját, Borza több dolgozatban hasonló nézeteket fejtett ki. Sajnálatos, hogy nálunk még újabb jelentős földrajzi, kultúrtörténelmi stb. munkákban is Treitz klímazonális ta-

AZ ERDÉLYI MEZŐSÉG
ÉS ERDŐI.

Terv. B. Ső R.
Rajz. Keresztes K.



1. minta - 825. perec országi felülvétele felügye

lajtérképe szerepel, holott annak beállítása — számos egyéb hibája mellett — úgy az Alföldre, mint a Mezőségre nézve téves (v. ö. ezzel szemben saját vegetáció [ill. klimax] térképem 1933).

A Mezőség erdei, ill. fás növényszövetkezeteinek áttekintése:

(Mintegy 150 felvétel [1941—44] alapján, a Kolozsvár—K. borsa-Dés—Vasasszentgothárd—Kolozs közötti területről.)

1. Querceto-Carpinetum transsilvanicum, subass. praerossicum. Mesophil zárt erdő. Állandó és subconstans fajai: *Carpinus*, *Corylus*, *Carex pilosa*, *Helleborus purpurascens*, *Anemone hepatica*, *A. nemorosa*, *Ranunculus auricomus-cassubicus*, *Asarum europaeum*, *Lathyrus vernus*, *Pulmonaria officinalis*. A bükkösönövények a Mezőségen az árnyas, zárt gyertyános-tölgyesekben teremnek, mint *Dryopteris filix-mas*, *Melica uniflora*, *Gagea silvatica*, *Galanthus*, *Actaea*, *Aconitum moldavicum*, *A. variegatum*, *Corydalis cava*, *solida*, *Geranium phaeum*, *Robertianum*, *Mercurialis perennis*, *Epilobium montanum*, *Stachys silvatica*, *Veronica officinalis*, *Lathraea* etc.

Jellemző fajai *Tilia argentea*, *Fritillaria montana*, *Adoxa*, a kolozsvárkörnyéki hasonló erdőkben hiányzó *Quercus cerris*, *Acer tataricum*. Az erdélyi Qu.-Cp. transs. karakterfajai: *Fritillaria montana*, *Aconitum moldavicum*, *Erythronium*, *Helleborus purpurascens*, *Potentilla thuringiaca*, *Lathyrus Hallersteinii*, *L. transsilvanicus*, *Melampyrum bihariense*, *Hieracium pseudobifidum*.

Típusai (faciesek): *Carex pilosa*, *Convallaria*, *Polygonatum latifolium*, *Asarum*, *Hedera*, *Aposeris*. A *Fraxino-Carpinion* csoport képviselője.

2. Quercetum roboris-sessiliflorae transsilvanicum subass. praerossicum. Xerophil nyíltabb erdő. Állandó ill. subconstans fajai: *Quercus petraea*, *Q. robur*, *Carpinus* (szálanként), *Crataegus monogyna*; *Polygonatum latifolium*, *Asarum*, *Stellaria holostea*, *Helleborus*, *Anemone hepatica*, *Ranunculus auricomus-cassubicus*, *Sedum maximum*, *Potentilla alba*, *Viola sylvatica*, *Pulmonaria mollissima*, *Sympytum nodosum*, *Ajuga reptans*, *Veronica chamaedrys*, *Chrysanthemum corymbosum*.

Jellemző fajai: *Quercus pubescens*, *Tilia platyphyllos*, *Berberis*, *Rhamnus baphicoccus*, stb., általában a *Quercion pubescens-sessiliflorae* csoport, amelynek képviselője, elemei, ugyanezek cserjésekben s mint erdőreliktumok, mesophil réteken is teremnek. Az erdélyi Qu. rob.-sess. transs. karakterfajai: *Rhamnus baphicoccus*, *Iris ruthenica*, *I. pseudocyperus*, *Aristolochia pallida*, *Cytisus albus*, *Genista transsilvanica*, *Ferulago silvatica*, *Galium pseudoaristatum*, *Hieracium phaedrocheilon*, *H. jablonicense*, az előbbivel közös *Erythronium*, *Helleborus*, *Poten-*

tilla thuringiaca, *Melampyrum bihariense*, a füzesekkel közös *Oenanthe banatica*, *Inula helenium*.

Típusai (faciesek): *Poa nemoralis-Brachypodium silvaticum*, *Polygonatum latifolium*, tavasszal *Arum*, *Asarum*, *Vinca*.

3. **Crataego-Prunetum fruticosae.** A xerophil erdő kialakulásának stádiuma, mint cserjés. *Aegopodium* facies, subkonstans fajok még: *Brachypodium silvaticum*, *Polygonatum odoratum*, *Anthriscus silvester*, *Laserpitium latifolium*. Jellemző *Prunion spinosae* fajok: *Prunus fruticosa*, *P. tenella*.

4. **Pruneto-Crataegetum.** Legelők másodlagos cserjése. Állandó fajok: *Prunus spinosa*, *Crataegus monogyna*, *Ranunculus monogyna*, *Ranunculus polyanthemos*, *Euphorbia cyparissias*, *Primula veris*, *Plantago media*. Erdei, réti, pusztai és ruderális fajokból kevert kísérőnövényzet. A *Prunion spinosae* képviselője.

5. **Prunetum tenellae.** A xerophil erdő kialakulásának stádiuma, átmenet a sztyep-rétek (számos *Festucetalia* elem) és a *Crataego-Prunetum* között. Konstans a *Prunus tenella*. Cedominansak lehetnek *Calamagrostis epigeios* vagy *Agropyrum intermedium*. A *Prunion spinosae*-hoz vagy a *Festucetalia*-hoz sorozható.

6. **Populeto-Salicetum (Saliceto-Populeto-Alnetum).** Kevert fügnyárliget. Hygrophil, folyóparti. Állandó (subconstans) fajok: *Salix alba*, *Rubus caesius*, *Angelica silvestris*. Jellemző fajai: *Salix alba*, *S. fragilis*, *S. triandra*, *S. viminalis*, *S. purpurea*, *Populus nigra*, *P. alba*, *Alnus incana*, *Senecio fluiatilis*, adventivek (*Stenactis*, *Rudbeckia laciniata*, *Solidago canadensis* és *leiophylla*). Típusai (facies): *Rubus caesius*, *Urtica dioica*, *Aegopodium*, *Chaerophyllum bulbosum*, *gramineae* etc. A *Salicion* képviselője.

7. **Salicetum cinereae.** Fűz-lápcserjés. Állandó fajok: *Salix cinerea*, *thelypteris*, *Peucedanum palustre*. Facies: *Dryopteris thelypteris*, *Carex acutiformis*, *riparia*. Az *Alnion glutinosae* képviselője.

8. Erdei reliktumnövényekben gazdag rétszövetkezet (ám a Mezőség belsejében hiányozni látszik): **Pediculari-Caricetum montanae**, 3 típusban (subass.). *Pediculari-Anthoxanthetum*, *Brachypodio-Caricetum montanae*, *Narciso-Caricetum montanae*. Állandó fajok: *Anthoxanthum*. *Pedicularis campestris*, *Carex montana*, *Clematis recta*, *Filipendula hexapetala*, *Trifolium montanum*, *Primula veris*. Bennük réti, pusztai (*Festucetalia*), erdős-sztyep (*Quercetalia pub.-sess.*) elemek, reliktum erdei fajok, pl. *Anemone ranunculoides*, *Ranunculus auricomus*, *Potentilla thuringiaca*, *Viola mirabilis*, *Symphytum nodosum*, *Pulmonaria mollissima*, *Trollius europaeus* (praealpin elem a nárciszréten). A 3. subass. konstansai: *Narcissus stellaris*, *Anthoxanthum*, *Carex montana*, *Potentilla alba*.

Mindezen növényszövetkezetekről bővebben Közép-Erdély (Kolozsvár és az Erdélyi Mezőség) növényszövetkezetei c. munkámban.

Rövidítések: Kv: Kolozsvár. Összetételekben: M: Mező, Magyar, Maros, Sz: Szamos, Szu: Szamosújvár, Vszt: Vasasszent, B: Borsa, de B. váralja: Bálványosváralja, G: Gerend, P: Puszta, N: Nagy stb. — h: hegyl., v: völgy, e: erdő.

Fák.

Fagus silvatica L. Határvonala a Mezőség központja felé: Kolozsvár (Szt. Páltető északi lejtői Bács felé!—Monostori erdő!—Bükk!—Feleki erdő!—Györgyfalvi erdő!—Pusztasztmáron—Aranyosrákos (tovább a földrajzi Mezőség területén kívül fut, az Aranyostól és Marostól délre), majd M. vásárhely!—Sárpatak—N. ercse—Teke—Uzsí-szentgyörgy—Feketelak—Vajdakamarás—Gyulatelke—Szék!—Füzesmikola!—Sajgó!—Doboka!—Bádok!—Kide!—Sólyomkő! Innen tovább Ny-ra a Mezőség területén kívül fut Kolozsvárig. Ezen belül a Kisiklói Hárastetőn (Soó 101) és Mezőszilváson. (Borza BC. VIII. 16). V. ö. Fekete—Blattny 82. Irodalmi adatok még: Szásznyires, Coptelke, Báton (Pr. Cp. 99—100), Sz. újvár (K. et 0.12, Pr. I. c.), B. váralja, Szu. németi, Coptelke (Harg. III. 124—30), M. décse (F. & Bl. 688), Kötke, M. derzse (Pr. Flora II. 146).

Carpinus betulus L. — Határvonala megállapítandó, a tölünk bejárt területen mindenütt honos. Kv. Szénafü: Csúp, Diószegi-e., Fejérdi-e. (Soó GM. 82, Kv. 156, Ny. I. c.), Apahida „Méneshágó”!, Ajton (Ny. I. c.), Sz. újvár (K. & 0.115, Pr. Cp. 100, Harg. II. 66), Füzesmikola (Harg. II. 65), B. váralja, Szu. németi, Coptelke (Harg. III. 124—30), Bonchida, Sz. jenő, Iklód, Bonchida—Szék, Szék—V. sztegyed—Pujon—Cege stb., Korpád, Kolozs!, M. szilvás, Báld Teke (Borza BC. VIII. 17, 22, 26), Kékes, Berkes, Meggyesf. (Pr. Cp. 100, 104, 106), Bazéd, Mojos Sárpatak (Lengy.), M. vásárhely (Ny. Mv. 30)—Bádok, Kide—B. újfalu, Csomafája, Sólyomkő!, Bádok—Doboka—Tötör—Móró (Harg. I. 127—9).

Quercus cerris L. (incl. var. *austriaca* (Willd.) Loud.) — Határvonala északon a Mezőség belseje felé (F. & Bl. 689 adatai alapján) Sztbenedek—Szu. németi!—Füzesmikola!—Boncnyires—Vszt. egyed!—Cege!—Kékes—Szászújfalu, továbbá Iklód „Harsastető”!, Cege—Pujon „Tisztáserdő”!—Sz. újvár! (K. & 0.21, Pr. Cp. 100), Coptelke (Harg. III. 130), Mohaj (Janka Linn. 601), Dezmér (Pr. Flora II. 146)—Bádok, Kide—B. újfalu, Sólyomkő!, Bádok—Doboka (Harg. I. 129). Schur (ÖBZ. VII. 22). Bei Klausenburg, doch keine Waldbestände bildend, amit Ny. (Kv. 159) tévesen így fordít, „kisebb erdőt alkotott”.

Q. *pubescens* Willd. — Vice, Vszt. egyed (F. & Bl. 688), Füzesmikola (Harg. II. 68) Szék „Széki-h.” (Soó 102).

Q. *petraea* (Mattuschka) Lieblein (Q. *sessilitora* Salisb.), főleg f. *aurea* Wierzb. — Elterjedt. Kv. „Fejérdi-e.” (Soó GM. 72), „Diószegi-e.” (Ny. Kv. 158 erroneo Fj. e), Dezmér (Pr. Flora II. 146), Ajton, Kolozs, Aranyakút, Berkenyes (Freyn 81), Apahida „Méneshágó” (! Ny. I. c.), Sz. újvár (Pr. Cp. 100, Harg. II. 66), Füzesmikola (Harg. II. 65), B. váralja, Szu. németi, Coptelke (Harg. III. 124—30), Sz. jenő, Szék, Cege—Pujon, Korpád!, M. szilvás, Báld, Teke (Borza BC. VIII. 17, 22, 26), Kékes (Pr. Cp. 100), Bazéd (Lengy.), M. vásárh. (Ny.)—Bádok, Kide, B. újfalu, Sólyomkő!—Doboka (Harg. I. 129).

Q. *robur* L. — A Mezőség leggyakoribb erdőalkotó fája (f. *tricuspidata* Janka Linn. 600: Cege), f. *pilosa* Schur., f. *cuneifolia* Vuk. (Borza BC. VIII. 20).

Q. *pubescens* × *petraea* (Q. *calvescens* Vukot. s. !)—Füzesmikola (Harg. II. 68). *)

*) Kolozsvár flórájából hiányzó új adat: Q. *petraea* × *robur* (*rosacea* Bechst.) v *pseudosessilis* (Schur) Georg. et Cretz. B. Cl. XXI. (1941) 134, Bükk (Borza).

Corylus avellana L. — Közönséges.

Betula pendula Roth. — Kv. „Csúp” (Harg.), Sz. újvárnémeti (K. & O. 6, Pr. Cp. 100), M. ménes (F. & Bl. 689), Mojos, Sárpatak (Lengy.).

Alnus glutinosa (L.) Gártin. — Szamosvölgy: Kolozsvár—Apahida (Soó GM. 106, Ny. Kv. 157, Erd. Muz. 1941), Bonchida!, Sz. újvár (K. & O. 4), — Marosvölgy: M. vásárhely (Ny. Mv. 29), Kide „Biszóhegy”!

A. incana (L.) Mönch. — Szamosvölgy: Kolozsvár—Apahida (Ny. Kv. 157, Erd. Muz. l. c., Soó & Ujv. Kv. 652), Sz. újvár (K. & O. 4), Betlen, — Aranyosvölgy: Hadrév (F. & Bl. 689.).

Populus alba L. — Szamosvölgy: Kolozsvár—Apahida (Freyn 82, Soó GM. 106, Ny. Kv. 150), Sz. újvár (K. & O. 20), Bonchida!, Aranyosvölgy: pl. A. gyéres (Freyn 82), Marosvölgy: M. kece (Nyár!) Vajdasztiván (F. & Bl. 689).

P. nigra L. — Szamosvölgy: Kolozsvár—Apahida (Soó GM. 102, Ny. Kv. 148), Sz. újvár (K. & O. 20), Bonchida!—Omlásalja, Betlen, Aranyosvölgy: pl. Hadrév, Marosvölgy: Vajdasztiván (F. & Bl. 689), M. vásárhely (Ny. Mv. 27).

P. tremula L. — Kv. „Szénafű: Előv., Fejérdi-e.”, Szamospart (Soó GM. 82, 96, 106, Ny. FK. 43, Kv. 149), Kolozs (Soó Kv. 651), Korpád, Kiskályán, Bonchida, Sz. jenő Iklód, Bonchida—Szék, Vszt. gothárd st., Sz. újvár (K. & O. 4), Bváralja, Copitelke (Harg. III. 128, 130), M. szilvás (Borza BCl. VIII. 17), M. bánd (Pr. Cp. 105), Bala—N. circce (Ny. ap Pr. Cp. 106), — Kide!—Bádok—Doboka (Harg. I. 129).

P. alba × *tremula* (*P. canescens* Sm. ssp. *Gombocii* (Polgár) Nyár). — Szamosszt-miklós—Apahida (Ny. Kv. 150, f. *apahidensis* Nyár), Sz. újvár (K. & O. 20).

Salix alba L. — Folyók, patakok, tavak mentén közönséges.

S. fragilis L. — Mint az előbbi. — Szamosfalva—Apahida (Ny. Kv. 150: f. *latifolia* Anderss. és f. *discolor* Kern. is.).

S. triandra L. és var. *discolor* W. et Gr. (*amygdalina* L.). — Mint az előbbi

S. purpurea L. — Mint az előbbiekn. — var. *Lambertiana* (Sm.) Koch, Szamosfalva—Apahida (Ny. Kv. 153).

S. viminalis L. — Szsztmiklós—Apahida!, Kajántó (Ny. Kv. 152, Erd. Muz. l. c.), A. gyéres (Freyn 82), A. lóna, Egerbegy, M. csán (Simk. Erd. 493—4), Sz. újvár K. & O. 22), M. szabad (Lengy.), M. vásárhely (Ny. Mv. 29), Vsztgothárd!

S. repens L. ssp. *rosmarinifolia* (L.) W. et Gr. — Kv. „Szénafű: Előv., Morgó! (Pr. Cp. 20, Ny. Kv. 151), Sz. újvár (K. & O. 22).

S. cinerea L. — Kv. „Szénafű: Előv., Harmadv., Fejérdi-e.” (Soó BK. XXV. 143, cum f. *spuria* Wimm. — Pr. Cp. 141, Ny. FK. 43—6, Kv. 152), Apahida „Kerektó!”, Kajántó, Ajton (Ny. Kv. 152, Erd. Muz. l. c.), Sz. újvár, Füzesmikola (Harg. II. 66), M. szilvás (Borza BCl. VIII. 16), Vszt. gothárd!, Cege!, Kaján (Pr. Cp. 52), M. vásárhely (Ny. Mv. 29)—K. borsa, Kide „Biszóh.”!

S. caprea L. — Kv. „Szénafű: Diószegi-e., Fejérdi-e., Morgó” (Soó GM. 82, Kv. 652, Ny. Kv. 152), Ajton (Ny. l. c.), Sz. újvár (K. & O. 22), B. váralja, Szu. németi (Harg. III. 126—9), Bonchida—Szék, Sz. jenő, Vszt. gothárd!, Báld (Borza BCl. VIII. 22), M. bánd, Meggyesf. (Pr. Cp. 105—6), Mojos (Lengy.), M. vásárhely (Ny. Mv. 28)—Kide—B. újfalu!

S. alba × *fragilis* (*S. rubens* Schrank). — Sv. „Szénafű: Előv., Pokolköz” (Soó GM. 96, Ny. FK. 43, Kv. 154 var. *viridis* (Wahlbg.) A. & G.), Szamosfalva—Apahida (Soó BK. XXV. 143, GM. 106, Ny. l. c. var. *excelsior* (Host) és var. *palustris* (Host) A. & G.), Bonchida!, M. vásárhely (Ny. Mv. 28)—Sólyomkő!

S. fragilis × *triandra* (*S. alopecuroides* Tausch)—Szszt. miklós—Apahida (Ny. Kv. 155, BK. 1941. 143 f. *latifolia* Nyár.).

S. caprea × *S. cinerea* (*S. Reichardtii* Kern.). — Szamosfalva (Ny. Kv.. 155).

- Ulmus laevis* Pall. — M. szengyel, M. ör, M. bánd, M. ölyves (F. & B. 689).
U. campestris L. (*U. glabra* Mill., *U. carpiniifolia* Gleditsch). — Kv. „Szénafű: Kúph., Előv., Fejérdi-e.” (Soó GM. 82, 96, Pr. Cp. 117) cf. Soó Kv. 652. — Apahida „Méneshágó”, Korpád!, Bonchida!, Berkes, M. záh, M. bánd (Pr. Cp. 104–5), M. vásárhely (Ny. Mv. 30)—Bádok!—Doboka (Harg. I. 129), — var. *suberosa* (Mönch) Wahlbg. — Bonchida (Soó 107), Kékes, P. kamarás, M. záh (Pr. Cp. 92, 101, 104).
- U. *scabra* Mill. — Bonchida (Soó 107), P. kamarás (Pr. Cp. 101)—K. borsa, Bádeck!
- Pyrus pyraster* (L.) Borkh. — Kv. „Szénafű: Előv., Tekintő, Csúp, Fejérdi-e.” (Soó GM. 82, Kv. 658, AGH. V. 147, Ny. Kv. 273), Kolozs (Soó Kv. 658), Bonchida.
- Malus silvestris* (L.) Mill. — Kv. „Fejérdi-e.” (Soó GM. 82, Kv. 658), „Tekintő” (Ny. Kv. 274), Sz. újvár (K. & O. 17), Sz. jenő (!), Sármás, P. kamarás (Borza BCl. VIII. 23, 25–6), N. sármás (Borza I. c. 20 var. *achras* Gártn.), Kékes Borza BCl. VIII. 23, 25–6), N. sármás (Borza I. c. 20 var. *hortulana* C. K. Schn.), M. vásárhely (Ny. Mv. 53)—Bádok, Kide, B. újfalu, Sólyomkő!—(Pr. Cp. 100), M. vásárhely (Ny. Mv. 53)—Bádok, Kide, B. újfalu, Sólyomkő!—Bádok—Doboka (Harg. I. 129), Sz. újvár (K. & O. 21).
- Sorbus aucuparia* L. (*praecipue var. lanuginosa* (Kit.) Beck). — Bonchida „Bánffy-park” (Soó 110), M. szilvás, Báld (Borza BCl. VIII. 17, 22)—K. borsa „Órhegy”!
- S. torminalis* (L.) Cr. — Bonchida „Bánffy-park” (Soó 110), Sz. újvár (K. & O. 23, Pr. Cp. 100), Füzesmikola (Harg. II. 65), B. váralja, Szu. németi, Coptelke (Harg. III. 124, 129–30), Teke (Borza BCl. 27)—Kide, B. újfalu, Sólyomkő!
- S. aria* (L.) Cr. var. *incisa* Rchb. — Borsa „Órhegy” (subspont.?).
- Prunus avium* L. var. *silvestris* (Kirschl.) Dierb. — Kv. „Fejérdi-e., Diószegi-e.” (Soó Kv. 659, Ny. Kv. 304), Dezmér „Puc”!, Apahida „Méneshágó” (Ny. I. c.), Kolozs (Soó Kv. 649), Ajton (Freyn 127, Ny. I. c.), Sz. újvár (K. & O.), Coptelke (Harg. III. 130), Bonchida—Szék, Sz. jenő, Iklód, Szék—Vszt. egyed—Ombozelke—Pujon. Feketelak stb., Kiskályán „Somai-e.” (Harg.), M. szilvás, P. kamarás, N. sármás, M. ménes (Borza BCl. VIII. 17, 20, 25), Gyeke—Sármás, Berkes, M. záh, Bala—M. ercse (Pr. Cp. 103–6), M. vásárhely (Ny. Mv. 55), Kide „Biszóh.”!
- P. cerasus* L. — M. ménes (Borza BCl. VIII. 25 subspont.).
- P. cerasifera* Ehrh. — Dezméri-e., Apahida „Méneshágó” (Ny. Kv. 302 subspont.).
- P. padus* L. — Sz. újvár (K. et O. 18, Pr. Cp. 100), Bonchida (Soó 111), Vajdasztiván (Nagy ap. Ercsei 168), A. gyéres (Freyn 127), M. szilvás (F. & Bl. 690, Pr. Flora II. 173), K. sármás, M. ölyves, Szabéd, M. kölpény, Székes, Ikland (F. & Bl. 691), [M. vásárhely (Ny. Mv. 54)]. *)

Cserjék.

Berberis vulgaris L. — A. gyéres (Ercsei 27).

Ribes uva-crispa L. — Benchida „Bánffy-park”, bizonnyal subspontan.

Crataegus monogyna Jacq. — Közönséges. Gyakori alakjai: var. *intermedia* Schur és var. *hirsuta* (Schur) A. et G., pl. Dezmér „Puc” (Ny. Kv. 275), ritkább a *lacinata* (C. Koch) Beck (var. *fissa* Poir.) „Puc” (Ny. I. c.) — Sólyomkő!

C. oxyacantha L. — Apahida „Méneshágó” (Ny. Kv. 274), Meusel (Herc. 300) szénafűvi és Borza (BCl. VIII. 20) sármási adata bizonnyal az előbbi fajra vonatkozik.

A *Rubus* genust a *R. caesius* L.-n és hybridjein [*R. caesius* × *tomentosus*: *R. agrestis* × *W.* et *K.*] — így Apahida (Ny. Kv. 276), Kolozs (Freyn 125) — és *R. caesius* ×

*) M. vásárhely [] zájelben azt jelenti, hogy Nyárády a növényt a Maros déli oldaláról közli.

procerus: R. Holandrei Müll. — Kv. „Szénafű“ (Butujás ap. Ny. Kv. 277), Ajton (Freyn 125) —] kívül a

R. *tomentosus* Borkh. képviseli. Kv. „Szénafű: Tekintő“ (Richter ap. Ny. Kv. 277 *t. setosoglandulosus* Wirtg.). A *R. subereclus* And.-t Gáyer (MBL. 1921, 12) Kolozs megyéből és nem Kolozsról közli, mint Ny. Kv. 277 tévesen idézi.

R. *caesius* × *Vestii* (*R. Schnelleri* Hol.). — Kide „Biszóh.“! (det. A. Kiss).

A *Rosa* genus mezősségi alakjait összeállította Prodán rózsa-monografiája, javai észük Kolozsvár környékéről (l. még Ny. Kv. 291—302, Soó BK XXIII. 148 és Kv. 658—9) és Marosvásárhelyről ismert (l. Keller BCl. VI. 1). A következő fajok ismeretesenek: *R. foetida* Herm. ('subspontan'), *R. spinosissima* L., *R. Jundzillii* Bess., *R. micrantha* Sm., *R. caryophyllacea* Bess., *R. obtusifolia* Desv., *R. dumetorum* Thuill., *R. canina* L. és *ssp. dumalis* (Bechst.) Hay., *R. arvensis* × *gallica* (*R. Polliniana* Spr.) és *R. gallica* × *canina*, Kolozsborsánál még *R. rubiginosa* L.

Prunus *spinosa* L. Közönséges, a typuson (*var. vulgaris* Sér.) kívül különösen mint *var. dasypylla* Schur (v. ö. Ny. Acta Bot. Szeged I. 37, Mv. 55, Kv. 303). A *f. major* Posp. Kolozs-on (Ny. l. c.).

P. *fruticosa* Pall. — Kv. „Szénafű: Előv., Morgó „Pokolköz, Fejérdi-e. stb.“ (Soó GM. 84, BK. XXII. 72, Kv. 659, Pr. Cp. 95, 132, Ny. Kv. 304 cum *f. aucta* (Borb.) Ját.), Dezmér „Puc“!, Apahida „Méneshágó“!, K. kara (Ny. l. c.), Kolozs, K. bós (Freyn 127), Dezmér (Pr. Flora II. 147), Sz. újvár (Pr. Cp. 99), Bonchida—Szek, Iklód, Szék, Mezőszava felett, Feketelak (Soó 111, részben *f. aucta*), Bala—N. ercse, Szabéd—M. fele (Ny. ap. Soó l. c.), Vszt. egyed, Vajdasztiván, Lövér, K. sármás, N. ölyves, M. lekence (F. & Bl. 691), M. vásárhely (Ny. Mv. 56)—Kide „Biszóh.“!

P. *tenella* Batsch [*P. nana* (L.) Stokes non Durci] mint pusztai törpecserje igen elterjedt, itt nem tárgyaljuk.

Evonymus *verrucosus* Scop. — Kv., Szénafű: Pokolköz, Csúp, Fejérdi-e. (Soó GM. 82, Kv. 622, Ny. Kv. 354), Dezméri-e. (Pr. Flora II. 148), Sz. újvár, Füzesmikola (Harg. II. 65), Bonchida—Szek, B. váralja (Harg. III. 126). M. szilvás, N. sármás, Báld, P. kamarás, M. ménés (Borza BCl. VIII. 17—25), Berkes, M. bánd, Meggyest. (Pr. Cp. 104—6), M. vásárhely (Ny. Mv. 73, ap. Pr. 107), Vajdaszt. iván (Nagy ap. Ercsei 81), Bádok, B. újfalu, Sólyomkő!—Bádok—Doboka (Harg. I. 129).

E. *europaeus* L. — Közönséges. Borza *E. latifolius* adata P. kamarásról (BCl. VIII. 23) kétségtelen téves.

Staphylea *pinnata* L. — Kv. „Szénafű: Fejérdi-e.“ (Soó GM. 82, & Ujv. Kv. 662), Dezméri-e. (Pr. Flora II. 148), Dezmér „Puc“!, Apahida „Méneshágó“!, Kolozs—Bós Ny. l. c., Soó Kv. 662), Bonchida, Sz. jenő, Iklód, Szék, Cege—Vszt. egyed—Pujon stb., Kiskályán „Somai-e.“! M. szilvás, N. sármás, P. kamarás, M. ménés (Borza BCl. VIII. 17—25), M. záh (Ercsei 72, Pr. Cp. 104), M. szengyel (Ercsei l. c.), Gyeke—Sármás (Pr. Cp. 103), M. őr, Mócs, V. kamarás, Marokháza, Szék, Gyulatelke, Sz. nyires, Coptelke, Szt. margita, M. décse, Kékes, Vice, Sz. máté, Vszt. egyed, Cege, Teke, K. sármás, N. ölyved, Szabéd, M. kölpény, M. bánd, M. lekence (F. & Bl. 691), [M. vásárhely (Ny. Mv. 73)]—Kide—B. újfalu!, Moró—Tötör (Harg. I. 127).

Acer *tataricum* L. — Dezmér „Puc“!, Apahida „Méneshágó“! (Ny. Kv. 335), Kolozs (Soó Kv. 662), Dezméri-e. (Pr. Flora II. 148), Berkenyes (Freyn 122), Korpád, Kis-kályán „Somai-e.“, Bonchida—Szek, Sz. jenő, Iklód!, M. szilvás, N. sármás, Báld, P. kamarás, M. ménés, Teke (Borza BCl. VII. 17—26), Kékes, Gyeke—Sármás, Bala—N. ercse (Pr. Cp. 100, 103, 106), Mócs, V. kamarás, Marokháza, Szék, Gyulatelke, Sz. nyires, Coptelke, Szt. margita, M. décse, Füge, Apanagyfalu, Borzás, Kéthely, Kékes, Vszt. egyed, Sz. újfalu, M. lekence Teke, Betlen (F. & Bl. 690).

Szék—Vszt. egyed—Pujon—Cege, Vszt. gothárd stb.!, M. vásárhely (Ny. Mv. 74).
Pr. Cp. 107)—Bádok—Doboka (Harg. I. 129).

→ *Rhamnus catharticus* L. — Kv. „Szénafű: Előv., Fejérdi-e.” (Soó GM. 82, & Ujv. 662), Kolozsvár—Apahida (Ny. Kv. 357), Dezmér „Puc”!, Apahida „Méneshágó” (Ny. I. c.), Berkenyes (Freyn 122), Kolozs (Scó Kv. 662 cum f. *leiophylla* Bor. Sz. jenő, Szék!, M. ménes (Borza BCl. VIII. 25), Kékes, Berkes, M. záh (Pr. 100, 104—5), M. vásárhely (Ny. Mv. 75).
→ *Rh. baphicoccus* Rothm. (*Rh. tinctorius* W. et K.). — Kv. „Szénafű: Szt. györgyh., Gödölköz (Wolff ap. Schur VSV. X. 97, Schur En. 142, Pr. Cp. 95, 117, Soó 662, Ny. Kv. 358: f. *valdepubens* Nyár. Sztgyörgyh.), Dezmér „Puc”!, Dezmér [Ny. I. c. et f. *heterocaulis* (Wierzb.) Soó], Sz. újvár (K. & O. 21, Pr. Cp. 110), M. vásárh. „Besev.” (Ny. Mv. 81).

→ *Frangula alnus* Mill. — Kv. „Szénafű: Pokolköz, Fejérdi-e.” (Richter ap. Ny. Kv. 3 Soó Kv. 662), Szamosfalva (Soó GM. 106), Apahida „Méneshágó”, Korpád, Kályán „Somai-e.”, Bonchida, Sz. jenő, Pujon stb.!, Sz. újvár (K. & O. 12), Kékes Doboka (Harg. I. 129).

→ *Cornus mas* L. — Kv. „Fejérdi-e.” (Soó GM. 82, Kv. 401), Dezméri-e. (Pr. Flora II. 148 Sz. újvár (K. & O. 9), Kékes (Pr. Cp. 100), Vajdasztiván (Nagyap. Ercsi 138 M. vásárh. „Beseh.” (Ny. Mv. 81)).

→ *C. sanguinea* L. — Közönséges.

→ *Ligustrum vulgare* L. — Közönséges.

→ *Sambucus nigra* L. — Közönséges, irodalmi adata kevés: Kv. „Fejérdi-e.” (Soó GM. 82), Kolozsvár—Apahida (Soó GM. 106, Ny. Kv. 503), Bonchida!, N. sárma (Borza BCl. VIII. 20), M. záh, M. bánd (Pr. Cp. 105), Feketelak!—Borsavidék köz.

→ *Viburnum opulus* L. — Kv. „Szénafű: Csúp, Fejérdi-e.” (Soó Kv. 667), Szamosf. (Soó GM. 106) Ajton (Ny. Kv. 504), Kolozs (Soó Kv. 667), Sz. újvár (K. & O. 26), Szu. németi (Harg. II. 129), Bonchida—Szék, Sz. jenő, Iklód, Szék, Vszt. gothárd!, M. szilvás, P. kamarás (Borza BCl. VIII. 18, 23), M. bánd, Meggyesf. (Pr. Cp. 105—6) [M. vásárhely (Ny. Mv. 101)]—Kide „Biszóh.”!

→ *V. lantana* L. — Kv. „Szénafű, Pokolköz” (Pr. Cp. 117, Ny. Kv. 504), „Fejérdi-e.” (Soó GM. 82, Kv. 504), Dezmér „Puc”!, Apahida „Méneshágó” (Ny. I. c.), Sz. újvár (K. & O. 26), Szu. németi (Harg. II. 129), Bonchida—Szék, Szék—Vszt. egyed, Korpád!, Kolozs (Soó Kv. 667), M. szilvás, P. kamarás, M. méhes (Borza BCl. VIII. 17, 23, 25), Kékes, M. záh, M. bánd, Meggyesf. (Pr. Cp. 100—6), M. vásárhely (Ny. Mv. 102)—Bádok—Doboka (Harg. I. 129).

→ *Lonicera xylosteum* L. — Kv. „Fejérdi-e.” (Soó Kv. 667), Sz. újvár (Harg. II. 67), Bonchida, Iklód, Szék, Apahida „Méneshágó”, Kiskályán „Somai-e.” (Soó 117), M. szilvás, Teke (Borza BCl. 19, 26), M. bánd (Pr. Cp. 105)—Csomafája „Dunga”!

Epiphyták.

→ *Loranthus europaeus* Jacq. — Kolcs—Berkenyes (Freyn 110), Cege (Janka Linn 574), M. szilvás (Borza BCl. VIII. 18), Berkes, M. bánd (Pr. Cp. 105).
→ *Viscum album* L. — Teke (Roth Erd. Kis. 1926, 48)—M. vásárhely (Ny. Mv. 31).

Aljnövények.

→ *Cystopteris tiliifragilis* (L.) Borb. — Bonchida (Soó 103), B. váralja (Harg. III. 126)—Csomafája „Dunga”! (Soó III. 140).
→ *Dryopteris Linnaeana* Christensen (*Phegopteris dryopteris* (L.) Féé). — Füzesmikola

(Harg. II. 65), Sz. németi, Coptelke (Harg. III. 129—30)—Csomafája „Dunga” (Soó III. 140), Kide (kutban)!

D. phegopteris (L.) Christensen (*Ph. polypodioides* Fée). — Coptelke (Harg. III. 130).
D. filix-mas (L.) Schott. — Kv. „Csúp, Fejérdi-e.” (Soó Kv. 644), Bonchida, Iklód (Soó 103), Füzesmikola (Harg. II. 65), B. váralja, Szu. németi, Coptelke (Harg. III. 125—130)—Kide—B. újfalu, Csomaafája, Sólyomkő!—Bádok—Doboka—Moró, Szu. németi (Harg. I. 128—9).

Athyrium filix-femina (L.) Roth. — Bonchida (Soó 103), Füzesmikola (Harg. II. 65); Szu. németi, Coptelke (Harg. III. 129—30)—Kide—B. újfalu, Sólyomkő!
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. — Kv. „Fejérdi-e.”, Kolozs (Soó Kv. 644), Cege—Pujon (Soó 103), B. váralja, Szu. németi (Harg. III. 125—9)—Kide!—Bádok—Doboka (Harg. I. 129), M. vásárhely (Ny. Mv. XXXIX.).

Asplenium trichomanes L. — Kide, Csomaafája „Dunga”! (Soó III. 140).

Folypodium vulgare L. — Füzesmikola (Harg. II. 65), B. váralja, Szu. németi (Harg. III. 128—9)—Kide—B. újfalu, Csomaafája, Sólyomkő! (Soó III. 140).

Hierochloë odorata (L.) Wahlbg. — Kv. „Szénafű” (Wolff ap. Andrae BC. XIV. 204, Schur ÖBZ. IX. 12, X. 355, VSV. X. 108, Fn. 725, Soó GM. 89), Apahida (Pr. Cp. Freyn 71, 142, Ny. FER. 338), Kolozs (! Schur l. c., Freyn 71), K. kara (Freyn 71), Dezmér „Puc” (Ny. Soó Kv. 645), Dezmér—Pata (Ny. Kv. 54), Mócs (Pr. BCI. XVI. 87).

H. australis (Schrad.) R. et Sch. — Kv. „Szénafű” (Soó GM. 83, Pr. ap. Ny. Kv. 53), Apahida „Büdöstő” (Scó AGH. V. 149), Ördöngösfüzes (K. & O. 14), Coptelke (Harg. III. 130), Mócs, M. szovát (Pr. BCI. XVI. 87), Katona—Kiscég, Vszt. gothárd—Gyeke (Janka MTK. XII. 169)—Kide „Biszóh.”!—Móró—Tötör (Harg. I. 127).

Milium effusum L. — Kv. „Fejérdi-e.” (Ujv. in Kv. 645), Ajton (Ny. Kv. 55), Sz. újvár (Pr. Cp. 100, BCI. XVI. 87), Füzesmikola (K. & O. 17, Harg. II. 65), Szu. németi, Coptelke (Harg. III. 129—130), Bonchida—Szék (Soó 104), N. sármás, Báld, P. kamarás (Borza BCI. VIII. 21—4), Bazéd (Lengy. ap. Soó 104), M. vásárhely (Ny. Mv. 4)—Kide „Biszóh.”!—Bádok—Doboka—Moró—Tötör (Harg. I. 127—9).

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. — Kv. „Szénafű, Harmadv., Csúp” (Schur VSV. X. 110, Ny. Kv. 58, Bélteki ap. Ny. l. c., Soó Kv. 645)—Moró—Doboka (Harg. I. 128).

Sieglungia decumbens (L.) Bernh. — Kv. „Szénafű: Morgó, Csúp”, Fejérdi-e.” (Ny. Kv. 62), Cege „Tisztás-e.” (Scó 104), Sz. újvár (Harg. II. 68).

Melica altissima L. — Cege (Soó 104).

M. uniflora Retz. — Apahida „Ménesh.-e.” (Ny. Kv. 66), Cege—Pujon—Vszt. egyed (Soó 104), B. váralja (Harg. III. 125), Báld, M. ménes, Teke (Borza BCI. VIII. 22—26), Mojos (Lengy. ap. Soó 104).

M. nutans L. — Kolozs (Pr. BCI. XVI. 89, Soó 104), Sz. újvár (Pr. Cp. 100), Füzesmikola (Harg. II. 65), B. váralja, Coptelke (Harg. III. 125—30), Szék, Pujon, Vszt. gothárd, Korpád (Soó 104), Dezmér (Pr. Flora II. 148), Mócs, M. szovát (Pr. BCI. XVI. 89), Kékes, M. bánd (Pr. Cp. 101, 105, 111), M. szilvás, Báld (Borza BCI. VIII. 18—22), Mojos, Bazéd (Lengy. ap. Soó 104), M. vásárhely (Ny. Mv. 10), Meggyesf. (Pr. Cp. 106)—Bádok!, Doboka!, Moró—Tötör (Harg. I. 127, 129).

M. picta C. Koch. — Dezmér „Puc” (Ny. Soó Kv. 646), Kolozs (Soó l. c.), Füzesmikola

*) A Mezőség páfrányai összeállításának teljessége végett közlöm itt még a mocsári-lápi *D. thelypteris* (L.) A. Gray termőhelyeit: Kv. „Szénafű” (! Péterfi ap. Ny. Kv. 36), „Harmadvölgy” (! Ny. FK. 50, Kv. 36), Apahida (Soó Kv. 644, Ny. EM. 114), Szék (Pr. Cp. 51, 223), Szásznyires, Coptelke (Pr. MBL. XII. 124)—Kide „Biszóhegy”!

(Harg. II. 65), Vszt. gothárd—Gyeke (Janka MTK. XII. 169, ap. Papp BCl. XII. 100) M. záh(Richter ap. Papp l. c.) — rendesen *f. rubriflora* Seemen, Kide—B. újfalu!

Dactylis glomerata L. ssp. *Aschersoniana* Gräbn. (incl. *pendula* Dum.) — Dezmér „Puc“ (Soó & Ujv. Kv. 646), Sz. újvár (Harg. II. 66), B. váralja (Harg. III. 125—7), Zsuk (Borza FER. 1866), Kékes (Pr. Cp. 101), N. sármás, Teke (Borza BCl. VIII. 21, 26), M. vásárhely (Ny. Mv. 6).

Poa nemoralis L. (var. *vulgaris* Gaud. et var. *tenella* Rchb.). — Kv. „Szénafű, Csúp“ (Schur VSV. X. 111, Ny. Kv. 70), Fejérdi-e. (Scó GM. 83), Sz. újvár—Ördöngősfüzes (K. & O. 19), Füzesmikola (Harg. II. 65), B. váralja, Szu. németi, Coptelke (Harg. III. 125—130), Bonchida—Szék, Szék, Vszt. egyed, Pujon, Vszt. gothárd, Cege, Feketelak, Korpád (Soó 104), Kolozs (Soó Kv. 646, Pr. BCl. XVI. 89), N. sármás, Kékes (Pr. Cp. 101), M. szilvás, Báld, M. ménes, Teke (Borza BCl. VIII. 18—26), Teke—M. királyf. (Pr. BCl. I. c.), Szabéd, Bazéd (Lengy. ap. Soó 104), M. vásárhely (Ny. Mv. 10)—K. borsa, Bánok, Kide, B. újfalu, Csomaťája, Sólyomkő!, Doboka (Harg. I. 129).

var. *firmula* Gaud. — Fejérdi-e. (Ujv. in Kv. 646) — var. *rigidula* M. et K. Kv. „Szénafű: Csúp“ (Ny. Kv. 70) — ad var. *agrostoides* A. et G. verg. Doboka—Moró (Harg. I. 128).

Festuca ovina L. ssp. *vulgaris* (Koch) Montan elem. — Kv. „Szénafű: Tekintő“, Ajton „Csolt“ (Ny. Kv. 74 f. *variegata* Krajina).

F. heterophylla Lam. — Ajton, Aranykút, Berkenyes (Freyn 73), Teke—M. királyf. (Pr. BCl. XVI. 90), Apahida „Méneshágó“, Korpád, Pujon—Omboztelek, Vszt. gothárd (Soó 104), B. váralja, Coptelke (Harg. III. 127, 130)—Kide, Sólyomkő!

F. gigantea (L.) Vill. — Kv. „Fejérdi-e.“ (Soó 647), Sz. újvár (K. & O. 27, Pr. Cp. 108), Bonchida, B.—Szék (Soó 105), Kékes, P. kamarás (Pr. Cp. 101, 108), Bazéd (Lengy.), —Kide—B. újfalu, Csomaťája!

F. valesiaca Schleich. ssp. *pseudodalmatica* (Krajina) Soó. — Sz. újvár (Harg. II. 67). *Bromus ramosus* Huds. — Ajton (Freyn 73—?), M. szilvás, N. sármás (Borza BCl. VIII. 18, 21). — Bánok, Kide—B. újfalu!

ssp. *Benekeni* (Lange) Sch. et Th. — Kv. „Fejérdi-e.“ (Soó Kv. 647), Szabéd (Lengy. ap. Soó 104).

Brachypodium silvaticum (Huds.) P. B. — Kv. „Csúp, Fejérdi-e., Diószegi-e.“ (Soó Kv. 648), Szamosjenő, Iklód, Bonchida—Szék, Szék, Vszt. egyed, Pujon, Vszt. gothárd, Feketelak, Kiskályán (Soó 105), Kékes (Pr. Cp. 101), M. sztmihály (Pr. BCl. XVI. 96), Bazéd, Szabéd (Lengy. ap. Soó 105), Sz. újvár (Harg. II. 67), B. váralja (Harg. III. 125)—K. borsa, Bánok—Kide—B. újfalu, Csomaťája, Sólyomkő!, Doboka—Moró (Harg. XVI. 96).

Agropyrum caninum (L.) P. B. — Bonchida (Soó 104), Teke—M. királyf. (Pr. BCl. XVI. 96).

Carex muricata L. — Szamosf.—Apahida, Bonchida, Sz. jenő, Pujon (Soó 105), Sz. újvár (Harg. II. 66), B. váralja (Harg. III. 125), Vszt. iván (K. & O. 26), M. szilvás, Báld, N. sármás, Teke (Borza BCl. VIII. 18—26), M. szabad, M. vásárhely (Ny. Mv. 13), Szászrégen (Pr. Cp. 76)—Bánok, B. újfalu, Sólyomkő!

C. divulsa Stokes. — Cege „Blomberg-park“ (Soó 105)—Moró—Tötör (Harg. I. 127).

C. Pairaei F. Schultz. — Bánok, Sólyomkő „Piatra“!

C. pallescens L. — Kv. „Szénafű: Elővölgy, Morgó“ (Ny. FK. 43, Soó Kv. 649), Ajton (Ny. Kv. 99), Korpád, Sz. jenő (Soó 105), Sz. újvár (Harg. II. 66), B. váralja (Harg. III. 126), Báld (Borza BCl. VIII. 22), Szabéd, Bazéd (Lengy. ap. Soó 105), Galambod „Nyírmege“ (Ny. Mv. 17), Szászrégen (Pr. Cp. 76)—Kide „Biszóh.“!

- C. transsilvanica* Schur. — Szabéd, Bazéd (Lengy. I. c.). A terület határán: Dés (Pr. Cp. 233, BCl. XVI. 97).
- C. digitata* L. — Kv. „Szénafű: Tekintő” (Pr. Cp. 137), Bonchida, Bonchida—Szék (Soó 105), Sz. újvár, Füzesmikola (Harg. II. 66, 65), B. váralja, Szu. németi, Coptelke (Harg. III. 126—30), Kékes (Pr. BCl. XVI. 98), M. szilvás (Borza BCl. VIII. 18)—Kide—B. újfalu, Sólyomkő!—Bádok—Doboka—Moró (Harg. I. 128—9).
- C. silvatica* Huds. — Kv. „Szénafű: Tekintő” (Wolff ap. Andrae B. Z. XIV. 204, Pr. Cp. 137) „Fejérdi-e.” (Soó Kv. 649), Szék (Soó 105), B. váralja, Coptelke (Harg. III. 125—130), Kékes, Bánd (Pr. Cp. 101, 105), M. vásárhely „Uriesul” (Ny. Mv. 18)—Bádok, Kide—B. újfalu!—Bádok—Doboka (Harg. I. 129).
- C. Michelii* Host. — Kv. Szénafű: Kúph., Előv., Melegv., Harmadv., Tekintő” (Soó GM. 83, Ny. Kv. 101, Knapp ap. Ny. I. c., Soó AGH. V. 143, 148—9, Kv. 649), Apahida „Csuhá” (Ny. Kv. 101, Pr. Cp. 142, BCl. XVI. 98), Kolozs, K. bós, Vírágosv. (Freyn 75), Bonchida—Szék, Cege—Pujon, Vszt. gothárd!, Füzesmikola (Harg. II. 66), Sz. újvár, M. szovát, Bánd (Pr. BCl. XVI. 98), Kékes (Pr. Cp. 101), Báld (Borza BCl. VIII. 22), Szabéd, Mojos (Lengy.), M. vásárhely (Ny. Mv. 18)—K. borsa, Kide—B. újfalu!—Kecsed (Harg. I. 126).
- C. pilosa* Scop. — Kv. „Sztgyörgyh.” (Bélteki ap. Ny. Kv. 100), „Fejérdi-e.”, Dezinér „Puc” (Soó Kv. 649), Kolozs—Ajton (Ny. I. c.), Kolozs (Soó I. c.), Apahida—Kálván „Ménesh., Somai-e.”, Korpád, Iklód, Szék, Vszt. egyed, Szék—Omboztelek—Pujon—Cege (Soó 105), Dezmér (Prod. Flora II. 148), Sz. újvár, Füzesmikola (Harg. II. 66, 65), B. váralja, Szu. németi, Coptelke (Harg. III. 125—30), Kékes, Bánd (Pr. Cp. 101, 105), M. szilvás, Báld (Borza BCl. VIII. 18, 22), M. vásárhely „Uriesul” (Ny. Mv. 17)—Kide—B. újfalu, Sólyomkő!—Moró—Tötör (Harg. I. 127).
- C. flacca* Schreb. var. *dinarica* Heuff. — Fejérdi-e., Szamosjenői-e. (Soó 105).
- Arum maculatum* L. var. *intermedium* Schur. — Bonchida „Bánffy-park”, Szamosjenői-e., Iklód „Hársastető”, Bonchida—Szék „Csanafű; Váné-berke” (Soó 105), B. váralja (Harg. III. 128).
- Juncus Rochelianus* R. et Sch. — Kv. „Szénafű: Előv., Tekintő, Fejérdi-e. (Schur En. 686, Soó Kv. 108, 649). Ajton (Freyn 76), Korpád, Feketelak „Látódomb” (Soó 105), Bazéd (Lengy. Cyp. Hung. 194), Szabéd, M. bánd, M. szabad (Lengy. ap. Soó 105)—Kide „Biszóh.”!
- Luzula pilosa* (L.) Willd. — Kv. „Szénafű” (Pr. BCl. XVI. 99)?, Sz. újvár (K. & O. 16)?, Kékes (Pr. Cp. 101), M. ménes (Borza BCl. VIII. 25).
- L. luzuloides* (Lam.) Dandy et Wilmott (*L. nemorosa* Poll. (E. Mey.)). — Ajton, Berkenyes (Freyn 76), Kékes (Pr. Cp. 101), Báld (Borza BCl. VIII. 22), M. vásárhely „Templomdomb” (Ny. Mv. 19)—Kide—B. újfalu, Csoma-fája!
- L. pallescens* (Wahlbg.) Bess. — Galambod „Nyírmegye” (Ny. Mv. 19).
- Veratrum nigrum* L. — Kv. „Szénafű: Előv., Tekintő, Csúp, Morgó, Harmadv., Fejérdi-e.” (Schur VSV. X. 108, Soó GM. 90, Pr. Cp. 137, Ny. Kv. 112, FK. 52, FER. 754, Ghisa BCl. XXI. 62), Dezmér „Puc” (! Ujv. in Kv. 649), Kolozs (Freyn 76, Pr. BCl. XVI. 99), Apahida „Méneshágó”, K. bós, Ajton (Ny. Kv. 112), Berkenyes, Aranykút (Freyn 76), Korpád, Kiskálván „Somai-e.”, Bonchida—Szék, Sz. jenő!; Sz. újvár, Buza (Pr. Cp. 112), N. sármás (Borza BCl. VIII. 21), Bala—N. ercse (Ny. ap. Pr. Cp. 106), Szabéd (Lengy.), P. kamarás Borza 1944. 25).
- Colchicum autumnale* L. ssp. *pannonicum* (Griseb. et Sch.) A. et G. cum var. *transsilanicum* (Schur) Domin. Utóbbi: Sz. újvár—Dés (Janka ap. Domin MBL. VIII. 327).
- Gagea silvatica* (Pers.) Loud. (*G. lutea* (L.) Ker—Gawl.). — Kv. „Szénafű” (Ny. Kv. 115)—„Fejérdi-e.” (Soó et Ujv. Kv. 650), Szamosfalva (Ny. I. c.), Kolozs, Ber-

kenyes (Freyn 77), Dezmér „Puc”!, Sz. újvár (K. & O. 12, Pr. Cp. 100), Kékes Berkes, G. keresztur (Pr. Cp. 101, 104–5), M. szentmihály (Pr. BCl. XVI. 99). Vszt. gothárd (Janka ÖBZ. XVIII. 169), Szabéd (Lengy.)—Kide—B. újfalu, Sólyomkő! —Doboka—Moró (Harg. I. 128).

→ *G. pratensis* (Pers.) Dum. — Kv. „Szénafü: Előv.” (Soó GM. 92, Ny. Kv. 114), Szszt. miklós—Apahida (Ny. FER. 1650), Sz. jenő, Szék (Soó 105), Kékes (Pr. Cp. 144), Feketelak (Janka Linnaea 603), M. kece (Ny. ap. Soó 105).

→ *G. minima* (L.) Ker—Gawl. — Vszt. gothárd (Janka MTK. XII. 170), Kékes (Pr. Cp. 101).

Allium ursinum L. — Ördöngösfüzes (K. & O. 4, Pr. Cp. 108).

→ *A. oleraceum* L. — Kv. „Szénafü” (Schur VSV. X. 107, En. 671)?, Kolozs (Schur En. 671, Freyn 78), Aranykút, Berkenyes (Freyn 78), K. bós (Freyn ap. Ny. Kv. 116), Korpád (Soó 105)—Sólyomkő „Dumbrava”!

→ *Lilium martagon* L. (kül. var. *pubescens* Borb.). — Kv. „Szénafü, Fejérdi-e., Csúp, Diós-szegi-e.” (Soó FK. 1927, 24, GM. 83, Kv. 118, 650, Ny. Kv. 118), Dezmér „Puc” (Soó Kv. 650), Apahida „Csuhá” (! Ny. I. c.), Kolozs, K. bós (Freyn 77, Ny. I. c. etiam typus), Ajton (Ny. I. c.), Gerend (Ercsi 95), G. keresztur (Wolff MNL. I. 67), Sz. újvár (Pr. Cp. 100), Gyulatelke (K. & O. 16), Füzesmikola (Harg. II. 65), B. váralja, Szu. németi (Harg. III. 128–9), Gyulatelke (K. & O. 16), Sz. jenő, Iklód, Bonchida—Szék, Szék—Vszt. egyed—Ombozelke—Pujon—Cege, Vszt. gothárd, Apa-Bonchida—Kályán „Méneshágó”, Somai-e., Korpád!, P. kamarás, M. szilvás, Teke (Borza BCl. VIII. 24, 18, 26), Kékes, Berkes, M. bánd (Pr. Cp. 101–5), Bazéd (Lengy. BCl. VIII. 24, 18, 26), Szabéd (Szakmány EK. VII. 117), Kide—B. újfalu, Sólyomkő!—Bádok—Doboka Moró—Tötör (Harg. I. 127–9).

→ *Fritillaria montana* Hoppe (*F. tenella* auct.). — Kv. „Szénafü: Előv., Morgó, Melegv. Harmadv.” (Landoz I. 15, Wolff ap. Andrae B. Z. XIV. 112, Simk. Erd. 523, So. GM. 84, Pr. Cp. 138, Ny. Kv. 118, Bélteki ap. Ny. I. c.), Dezmér „Puc” (! Ny. I. v.), Korpád „Hársastető” (Soó 106), Vszt. gothárd (Janka ÖBZ. XVIII. 169), Feketelak (Janka Linnaea 602, ap. Tuzson BK. XI. 134), M. záh (Ercsei 71), Gerencsér keresztur (Pr. Cp. 105, Ny.!), M. gerebenes (Ny. FER. 32 cum f. *Nyárádyai*), Borza), M. ménés (Borza BCl. VIII. 25), M. bánd (Pr. Cp. 147, BCl. XVI. 100).

Erythronium dens-canis L. — Kv. „Szénafü, Harmadv., Fejérdi-e., Diós-szegi-e.” (So. FK. 1927, 24, GM. 83, Ny. Kv. 118, Janka ap. Ny. I. c.), Sz. újvár (! K. & O. 118), Füzesmikola (Harg. II. 65), Sz. jenő, Szék (Soó 106), Kékes (Pr. Cp. 36, 118), M. bánd (Pr. Cp. 101, 105), M. záh (Ercsei 112), Vszt. gothárd (Janka ÖBZ. XVI. 160), Sárpatak, Pókakeresztur (Lengy. ap. Soó I. c.), M. vásárhely (Ny. Mv. 21), Kide—B. újfalu, Sólyomkő!

→ *Scilla bifolia* L. — Kv. „Szénafü, Fejérdi-e.” (Brassai ap. Ny. Kv. 650, Soó GM. 83, var. *subtriphylla* (Schur) Domin: Soó & Ujv. Kv. 650), Szamosf. (Ny. I. c.), Kolozs Berkenyes (Freyn 77), K. bós (Ny. ap. Pr. Cp. 99), Sz. jenő, Iklód, Szék (Soó 106), Sz. újvár (K. & O. 22), B. váralja (Harg. III. 127), Kékes (Pr. Cp. 101), M. záh (Ercsei 40), Pujon, Feketelak (Janka), Vszt. gothárd (Janka ÖBZ. XVIII. 168), Sárpatak (Lengy. ap. Soó I. c.)—Kide—B. újfalu, Sólyomkő!—Bádok—Doboka (Harg. I. 129).

Asparagus officinalis L. — A var. *pseudotenuifolius* Polgár (*collinus* A. et G. an. *collinus* Schur?), Szszt. miklós—Apahida (Csürös ap. Ny. Kv. 641 sub „*A tenuifolio*”!, cf. Soó 106).

→ *Majanthemum bifolium* (L.) Schm. — Kv. „Fejérdi-e.” (Soó Kv. 650), Sz. jenő, Szék—Ombozelke, Cege—Pujon, Kiskályán „Somai-e.” (Soó 106), Ajton (Ny. 122, FER. 1887 b), Sz. újvár (K. & O. 17, Pr. Cp. 100), Füzesmikola (Harg.

65), B. váralja, Szu. németi, Coptelke (Harg. III. 128—30), Vszt. gothárd (Janka Linnaea 607), M. szilvás, Teke (Borza BCl. VIII. 18, 26), M. vásárhely „Beseh.” (Ny. Mv. 20)—Kide „Biszóh.”!—Doboka—Moró—Tötör (Harg. I. 127—8).

Polygonatum latifolium (Jacq.) Desf. — Kv. „Szénafű, Fejérdi-e.” (Ny. Kv. 122, Soó & Ujv. Kv. 650), Dezmér „Puc” (Ny. Soó Kv. 650), Kolozs (Soó I. c.), Korpád, Sz. jenő, Cege, Pujon (Soó 106), Bonchida—Szék, Iklód, Szék—Ombozelke—Vszt. egyed, Apahida—Kiskályán „Méneshágó, Somai-e.” stb.!; Sz. újvár!, Füzesmikola (Harg II. 65), B. váralja, Szu. németi (Harg. III. 125—30), M. ménes (Borza BCl. VIII 25), M. vásárhely, Galambod (Ny. Mv. 22), Szabéd, M. fele (Nyár!)—K. borsa, Bádok, Kide—B. újfalu, Sólyomkő!, Bádok—Doboka, Moró—Tötör (Harg. I. 127, 129) — var. *angustatum* Schur: Pujon—Vszt. egyed „Pujoni-h.” (Soó 106).

P. odoratum (Mill.) Druce (*P. officinalis* All.). — Kv. „Szénafű, Előv., Csúp” (Soó GM. 83, Kv. 122, 650, Harg., Ujv. in Kv. 650, Meusel Herc. 300), Kolozs (Soó Kv. 650), Dezmér (Pr. Flora II. 143), Apahida „Méneshágó”, Kiskályán „Somai-e.”, Bonchida, — Szék, Sz. jenő, Iklód, Szék—Ombozelke—Vszt. egyed—Pujon, Vszt. gothárd, Feketelak stb., Füzesmikola (Harg. II. 65), B. váralja, Szu. németi (Harg. III 125—9), P. kamarás, N. sármás (Borza BCl. VIII. 21), Kékes, Berkes, M. bánd (Pr. Cp. 101, 104—5), M. vásárhely (Ny. Mv. 22)—Bádok, Kide—B. újfalu!—Moró—Tötör (Harg. I. 127).

P. multiflorum (L.) All. — Kv. „Fejérdi-e., Diószegi-e.”, Kolozs (Soó Kv. 650), Dezmér „Puc” (Ny. Soó I. c.), Korpád, Sz. jenő, Iklód, Vszt. gothárd (Soó 106), Füzesmikola (Harg. I. 65), M. szovát [Pr. BCl. XVI. 100 cum var. *intermedium* (Bor.) Baker], M. szilvás Báld, Teke (Borza BCl. VIII. 18, 22, 26), Bala—N. ercse (Ny. ap. Pr. Cp. 106)—Bádok!—Doboka (Harg. I. 129), Szabéd (Borza 1944, 33).

Convallaria majalis L. — Kv. „Szénafű: Csúp (Harg.), Fejérdi-e., Diószegi-e.” Kolozs (Soó Kv. 650), Apahida, Korpád, Kiskályán, Bonchida, — Szék, Sz. jenő, Iklód, Szék, Cege—Pujon, Vszt. egyed, Vszt. gothárd stb., Füzesmikola (Harg. II. 65), Szu. németi (Harg. III. 129), Sz. újvár (Pr. Cp. 100), P. kamarás, M. szilvás, Báld, M. ménes (Borza BCl. VIII. 18—25), Berkes, M. bánd (Pr. Cp. 104—5), Bazéd, Mojos (Lengy.), M. vásárhely (Ny. Mv. 21), Kide—B. újfalu, Sólyomkő!—Doboka—Moró—Tötör (Harg. I. 127—8), Szabéd (Borza 1944, 33).

Paris quadrifolia L. — Sz. újvár (! Pr. Cp. 100), Vízszilvás (K. & O. 18), Füzesmikola (Harg. II. 65), B. váralja, Szu. németi, Coptelke (Harg. III. 128—30), Sz. jenő, Iklód, Szék (Soó 106)—Kide „Biszóh.”, Csomafája!

Galanthus nivalis L. — Kv. „Fejérdi-e.” (Soó, Schmidt in Kv. 123 — var. *major* Ten. Soó Kv. 650), Bonchida—Szék (Soó 106), Kolozs (Freyen 79, Soó I. c.), K. bós, Berkenyes (Freyen 79), Sz. újvár (K. & O. 12, Pr. Cp. 100), B. váralja (Harg. III. 124), Vszt. gothárd (Janka Linn. 608), Doboka—Moró—Tötör (Harg. I. 127—8).

Iris ruthenica Ker—Gawl. — Kv. „Szénafű” (Schur VSV. X. 107, Wolff ap. Andrae B. Z. XIV. 69), Ajton (Ny. Kv. 128, Pr. BCl. XV. 86), M. panit „Cseretető” (Ny. Mv. 24), Szabéd, Bazéd, Mojos (Lengy.), Monosf.—Sóspatak (Ny. ap. Pr. Cp. 98). Kékesudvarhely (Pr. BCl. I. c.), M. vásárhely (Barabás ap. Pr. I. c.)

I. graminea L. ssp. *pseudocyperus* (Schur) Soó. — Kv. „Szénafű: Elővölgy, Morgó, Fejérdi-e.” (Wolff ap. Andrae B. Z. XIV. 69, Soó GM. 90, AGH. V. 147, Bélteki, Knapp, Borbás, Richter etc. ap. Pr. BCl. XV. 98 et Ny. Kv. 127, Soó & Ujv. Kv. 651), Dezmér (Pr. Flora II. 148), „Puc”, Apahida „Méneshágó” (Ny. I. c., Soó 107), Kolozs, K. bós (Freyen 79), Korpád, Sz. jenő, Szék (Soó 107), G. keresztur (Wolff MNL. I. 66), Katona, Kiscég, Nagycég (Janka MTK. XII. 173), Mszt. mihály (Pr. BCl. XVI. 100), Báld (Pr. Cp. 146), M. bánd (Pr. Cp. 105)—M. vásárhely (Barabás ap. Pr. BCl. XV. 99), Kide—B. újfalu!

- I. variegata* L. — Kv. „Szénafü: Elővölgy” (Schur VSV. X. 107, Wolff ap. Andrae B. Z. XIV. 69, Soó GM. 90, AGH. V. 148, Ny. FK. 46, Wolff, Knapp, Richter ap. Pr. BCl. XIV. 171, Ny. Kv. 127), Kolozs, K. bós, Virágosv. (Freyn 79, ap. Pr. l.c.), Kis-kályán „Kistelek”, „Pujoni-e.” (Soó 107), Gerend (Wolff MNL. I. 66), M. vásárhely „Bese-h.” (Ny. Mv. 24, ap. Pr. l. c.), B. újfalu! Monosf. — Sz. sóspatak (Ny. ap. Pr. Cp. 98).
- Gladiolus imbricatus* L. — Kv. „Szénafü: Morgó, Csúp, Fejérdi-e!, Diószegi-e.” (Wolff ap. Andrae B. Z. XIV. 68, Ny. Kv. 126), Ajton, Kolozs (Freyn 79), Korpád, Cege, Pujoni-e., Feketelak (Soó 107), Palatka, Vszt. gothárd (Janka Linn. 608), Kékes (Pr. MBL. V. 33 sub „G. palustre” ex Soó BK. XXII. 71), Szabéd, Bazéd (Lengy. ap. Soó 107), — cf. Máthé BK. XXXI. 268. — K. borsa „Szénafüvek”! Bala—N. ercse (Ny. ap. Pr. Cp. 106).
- Cypripedium calceolus* L. — Kv. „Szénafü” (Wolff ex Ny. Kv. 129, Istvánffy, Butujás ap. Soó Orchideen (Bot. Arch. XXIII.) 128 — egykor), Sz. újvár (Pr. Cp. 100 Richter ap. Soó l. c.), Ördöngösfüzes, Vízszilvás (K. & O. 9).
- Orchis coriophora* L. — Kv. „Szénafü: Tekintő, Csúp, Fejérdi-e.” (Ny. Kv. 130, Ujv. in Kv. 651), Kajántó (Schmidt ap. Ny. l. c.), Kolozs, K. bós, Virágosv. (Freyn 159), Sz. újvár (K. et O. 18, Pr. Cp. 118), Cege, Pujon, Ombozelke, Vszt. gothárd, Feketealja (Soó 107), Bala—P. almás (Ny. ap. Soó Orch. 141), Bazéd (Lengy. ap. Soó 107), M. vásárhely „Beseh.” (Ny. Mv. 22—5)—K. borsa, Borsai-tanyák, Kide „Biszóh.”! Doboka, Kecsed (Harg. I. 121, 126) — gyakran mint f. *Borosiana* Soó (*strypiens*) Zapal. ?).
- O. ustulata* L. — Kv. „Szénafü: Csúp” (Harg. in Kv. 651), Kolozs (Freyn 79), Sz. újvár (K. & O. 18, Harg. II. 68), Bonchida—Szék, Sz. jenői-e.—Hársastető, Cege (Soó 107), Kékes (Pr. ap. Soó Orch. 143), M. csávás (Ny. ap. Soó l. c.), M. záh (Richter ap. Soó l. c.), Mojos (Lengy. ap. Soó 107)—K. borsa „Órhegy, Szénafü”! (Méz)
- O. militaris* L. — Kv. „Szénafü: Elővölgy, Morgó” (Bélteki, Knapp, etc. Ny. Kv. 1651, Pr. BCl. XVI. 101, Soó Orch. 149, Kv. 130 etiam f. *subsimia* Hausm. et intercedens Beck), Kolozs (Freyn 79), Sz. újvár (K. & O. 18, Pr. Cp. 118), B. váralja (Harg. III. 126), M. vásárhely (Barabás ap. Soó Orch. 149), Bazéd (Lengy.)—Bor. „Órhegy”!
- O. purpurea* Huds. — M. vásárhely „Bese-h.” (Ny. Mv. 25).
- O. maculata* L. — Kolozs, K. bós (Freyn 79). — Kétes az *O. mascula* L. ssp. *signata* (Vest) Soó. — Kv. „Szénafü” (Wolff ap. Soó Orch. 152).
- O. incarnata* L. ssp. *haematodes* (Rchb. f.) emend. Soó — Montan elem. — Kv. „Szénafü: Tekintő, Elővölgy, Morgó” (Soó, Ny. Kv. 133, 651).
- Traunsteinera globosa* (L.) Rchb. f. — Montan elem. — Kv. „Szénafü: Morgó” (Soó 166, Kv. 130)—Kide „Biszóhely”!
- Coeloglossum viride* (L.) Hartm. — Montan elem. — Kolozs, K. bós (Freyn 80), egy Kétes a *Gymnadenia odoratissima* (Nath.) Rich. — Kv. „Szénafü” (Schur X. 107), egykor a Bükkben!
- Platanthera bifolia* (L.) Rich. — Kv. Szénafü (Wolff ap. Ny. Kv. 136, Soó Orch. 179 f. *densiflora* (Drejer) A. et G.), „Diószegi-e.” (Ujv. in Kv. 651), „Fejérdi-e.”, Cege—Pujon (Soó 107), Vízszilvás (K. & O. 19), Sz. újvár (Pr. Cp. 100), F. mikola (Harg. II. 65), B. váralja, Szu. németi (Harg. III. 127, 129), Buza (Pr. Soó Orch. 179), M. szilvás (Borza BCl. VIII. 19), Szabéd (Lengy. ap. Soó 107), Bátaszék, Kide—B. újfalu!—Bátaszék—Doboka (Harg. I. 129).
- Cephalanthera rubra* (L.) Rich. — Sz. újvár (Pr. Cp. 100), Ördöngösfüzes (K. & O.

- M. szilvás* (Borza BCl. VIII. 18), Sárpatak (Lengy. ap. Soó 107), Vajdaszt. iván (Nagy ap. Ercsei 26).
- C. alamasonium* (Mill.) Druce (*C. alba* (Cr.) Simk.) — Sz. újvár (K. & O. 9, Pr. Cp. 100, Richter ap. Soó Orch. 187), B. váralja (Harg. III. 125).
- C. longifolia* (L.) Fritsch. — Kékes (Pr. Cp. 101).
- Epipactis helleborine* (L.) Cr. — Szamosjenő-i. (Soó 107). Az *E. palustris* (Mill.) Cr. — montan elem — kétes: M. záh (Erzsei 26).
- Neottia nidus-avis* (L.) Rich. — Kv. „Diószegi-e.” (Soó Kv. 651), Dezmér „Puc” (Soó & Ujv. I. c.), Ajton, Apahida „Méneshágó” (Ny. Kv. 138), Bonchida—Szék (Soó 107), Füzesmikola (Harg. II. 65), B. váralja (Harg. III. 125, 128), M. szilvás (Borza BCl. VIII. 18), Vajdaszt. iván (Nagy ap. Ercsei 26), M. vásárhely „Bese-e” (Ny. Mv. 24)—Bádok, Kide—B. újfalu!—Bádok—Doboka—Moró—Tötör (Harg. I. 127—9).
- Listera ovata* (L.) R. Br. — Vajdaszt. iván (Nagy ap. Ercsei 25).
- Aristolochia pallida* Willd. — Kolozs, K. bós (Freyn 85), Vszt. gothárd—Feketelak „Látó-domb” (Soó 107).
- Asarum europaeum* L. — Kv. „Szénafű, Fejérdi-e.” (Soó GM. 82, Kv. 652, Meusel Herc. 299), Dezmér (Pr. Flora II. 148), „Puc” (Ny., Soó Kv. 164, 652), Sz. újvár (K. & O. 5, Pr. Cp. 100), Füzesmikola (Harg. II. 65), B. váralja, Szu. németi, Coptelke (Harg. III. 125—130), Bonchida, Szék—Vszt. egyed—Ombozelke—Pujon—Cege, Vszt. gothárd, Apahida—Kiskályán, Korpád stb., P. kamarás, M. szilvás, N. sármás, M. ménes, Teke (Borza BCl. VIII. 18—26), Kékes, Berkes, M. bánd, Gerendkeresztur, Meggyesf. (Pr. et Ny. ap. Pr. Cp. 101—6), Mojos, Sárpatak (Lengy.), M. vásárhely (Ny. Mv. 31)—K. borsa, Bádok—Kide, Kide—B. újfalu, Csomaafája, Sólyomkő!—Bádok—Doboka—Moró—Tötör (Harg. I. 127—9).
- Rumex sanguineus* L. var. *viridis* (Sm.) Koch. — Bonchida (Soó 107), B. újfalu „Nagy-hegy”!
- R. obtusifolius* L. ssp. *silvester* (Lam.) Rech., ssp. *transiens* (Simk.) Rech. et ssp. *sub-alpinus* (Schur) Rech. f., utóbbiak: M. szovát (Bihari ap. Rech. f. Beih. B. CBl. XLIX. 54), Füzesmikola (Harg. II. 65 transiens).
- Polygonum bistorta* L. — Montan elem. — Kv. „Szénafű: Elővölgy, Tekintő, Fejérdi-e.” (Ny., Soó Kv. 170), Ajton (Freyn 83), a terület szélén: A. polyán (Wolff MNL. I. 65).
- P. dumetorum* L. — Kv. „Szénafű: Csúp (Harg. in Kv. 652), Fejérdi-e.”!, Bonchida, Cege—Pujon, Vszt. gothárd, Feketelak, Apahida „Méneshágó”!, Kolozs (Soó Kv. 652), Sz. újvár (K. et O. 19, Pr. Cp. 74, Harg. II. 65), Bazéd, Szabéd (Lengy.), M. vásárhely (Nyár!)—Bádok, Kide, B. újfalu, Sólyomkő!
- P. dumetorum* × *convolvulus* (*P. heterocarpum* Beck). — Kolozs—K. bós (Ny. Kv. 174, BK. 1941. 134).
- Stellaria holostea* L. — Kv. „Szénafű: Csúp, Diószegi-e., Fejérdi-e.” (Soó GM. 83, Kv. 193, 653, Ny. Kv. 193), Dezmér (Pr. Flora II. 148) „Puc”!, Ajton, Apahida „Méneshágó”!, Sz. újvár (K. & O. 15, Pr. Cp. 100), B. váralja, Szu. németi, Coptelke (Harg. III. 125—30), Bonchida—Szék, Sz. jenő, Iklód, Szék, Vszt. egyed, Pujon, stb., Kiskályán, Korpád, Kolozs!; P. kamarás, N. sármás, M. ménes, Báld, Teke (Borza BCl. VIII. 18—26), M. bánd, Sz. kakasd (Pr. Cp. 105—6), M. vásárhely (Ny. Mv. 37)—Bádok, Kide—B. újfalu, Sólyomkő!—Bádok—Doboka—Moró—Tötör (Harg. I. 127—9) — var. *elatior* Peterm. — Dezmér „Puc” (Ny. Kv. 193).
- Moehringia trinervia* (L.) Clairv. — Kv. „Szénafű: Csúp” (Harg. in Kv. 654), Bonchida—Szék, Korpád (Soó 109), Sz. újvár!, Füzesmikola (Harg. I. 65), B. váralja, Szu. németi, Coptelke (Harg. II. 127—130), N. sármás (Borza BCl. VIII. 20)—B. újfalu, Sólyomkő!

Aconitum anthora L. — Kv.: „Szénafű, Előv.” (Soó FK. 1927. 24, Kv. 214, 654), Dezmér „Puc!” (Ny. Kv. 214), Kolozs (Schur En. 30, Freyn 113). Berkenyes (Freyn I. c.), Gerend (Simk. En. 60), G. keresztur (Ny. ap. Pr. Cp. 105), Apahida „Méneshágó” Kiskályán „Somai-e.”, Korpád, Vszt. gothárd, Szék (Soó 108), P. kamarás (Borza BCI. VIII. 23), Szabéd (Borza 1944, 33), Buza (Pr. Cp. 118)—Bádok!

A. moldavicum Hacq. — Kv.: „Fejérdi-e.” (Soó & Ujv. Kv. 654), Apahida „Méneshágó” (Ny. Kv. 214), Kiskályán „Somai-e.”, Korpád (Soó 109), Kolozs, Berkenyes (Freyn 113), Mócs (Fuss Alt. Archiv II. 370), Vszt. gothárd (Janka Linnaea 556), Kékes, M. szovát (Pr. Cp. 21), Kékes—Szt. Miklós (Pr. Cp. 101, 118), P. kamarás (Borza BCI. VIII. 23), Berkes (Pr. Cp. 104), Bala—N. ercse (Ny. ap. Pr. Cp. 105), Sz újvár (K. & O. 3), B. váralja (Harg. II. 127)—Kide „Biszóh.” (Soó III. 140), Bádok —Doboka (Harg. I. 129) cf. Balázs AGH. II. 18.

A. lycoctonum L. ssp. *vulparia* (Rchb.) Gáyer. — Bazéd (Lengy. ap. Soó 109).

A. variegatum L. — Kv. Csúp „Fejérdi-e.” (Harg., Soó Kv. 655. Soó 109), Ajton (Freyn 113), Sz. újvár—Dés (Pr. Cp. 112)—Kide „Biszóh.”!

Delphinium Simonkaianum Pawl. (*D. elatum* auct.). — Ajton „Nagy Csolt” (Pr. Cp. 105, cf. Ny. Kv. 213—4?), Bala—N. ercse (Ny. ap. Pr. Cp. 106, ap. Pawl. Bull. Acad. Pol. B. 1933. 151, Ny. Kv. 214).

Anemone hepatica L. — Kv. „Fejérdi-e.” (Soó GM. 83, Kv. 217), Szamosfalva (Soó G. M. 106), Dezmér „Puc” (Soó Kv. 655), Dezméri-e. (Pr. Flora II. 148), Apahida „Méneshágó” (! Ny. Kv. 217), Sz. újvár (! K. & O. 13, Pr. Cp. 100), Füzesmikola (Harg. II. 65), B. váralja, Szu. németi (Harg. II. 125—30), Bonchida, Sz. jenő, Iklód, Szék—Vszt. egyed—Ombozelke—Pujon—Cege, Vszt. gothárd, Kiskályán, Korpád (Soó 108), Kolozs (Soó Kv. 655), M. záh, Vajdaszt. iván, Sárpaták (Ercsei 103), M. szilvás, P. kamarás, M. ménes (Borza BCI. VIII. 18, 23, 25), Kékes, Gyeké—Sármás, Berkes, G. keresztur (Pr. Cp. 101—5)—K. borsa, Bádok, Kide, B. újfalu, Csomafája, Sólyomkő! Bádok—Doboka—Moró—Tötör (Harg. I. 127—9). — *var multiloba* Hartm. — Korpád (Soó 108).

A. nemorosa L. — Kv. „Szénafű, Diószegi-e.” (Soó GM. 82, Kv. 655, Pr. Cp. 117), Szamosfalva (Soó GM. 106), Dezmér „Puc”, Kolozs (Soó Kv. 655), Sz. újvár (K. & O. 4, Pr. Cp. 100, 118, Harg. II. 66, 68), Füzesmikola (Harg. II. 65), B. váralja, Szu. németi, Coptelke (Harg. III. 127—30), Bonchida, Sz. jenő, Iklód, Szék—Vszt. egyed—Ombozelke—Pujon—Cege, Vszt. gothárd, Kiskályán, Korpád (Soó 108), K. bós (Pr. Cp. 99), Teke (Borza BCI. VIII. 26), Kékes (Pr. Cp. 100), G. keresztur (Ny. ap. Pr. Cp. 105), Feketelak (Janka Linn. 556), M. vásárhely (Ny. Mv. 40)—Kide—B. újfalu, Sólyomkő!, Bádok—Doboka—Moró (Harg. I. 128—9).

A. ranunculoides L. — Kv.: „Szénafű, Előv., Harmadv., Tekintő, Pokolköz, Fejérdi-e” (Soó GM. 83, 90, BK. XXV. 144 cum f. *latisecta* Schur et *biflora* Peterm., Pr. Cp. 133, Ny. Kv. 218, Soó & Ujv. Kv. 655), Dezmér „Puc” (Ny. I. c., Soó Kv. 655), Dezméri-e. (Pr. Flora II. 148), Kolozs (Soó I. c.), K. bós (Pr. Cp. 99), Sz. újvár (K. & O. 4, Pr. Cp. 100), B. váralja (Harg. II. 127), Sz. jenő, Iklód, Bonchida, Szék—Vszt. egyed—Ombozelke—Pujon—Cege, Vszt. gothárd, Apahida „Méneshágó”, Kiskályán, Korpád (Soó 108), Kékes, M. bánd, G. keresztur (Pr. Cp. 101, 105), M. vásárhely (Ny. Mv. 40)—Kide—B. újfalu, Sólyomkő!, Moró—Tötör (Harg. I. 127).

Clematis vitalba L. — Szamosfalva (Soó GM. 106), Sz. újvár (K. & O. 9, Pr. Cp. 74), B. váralja, Szu. németi (Harg. III. 125, 129), Bonchida, Sz. jenő, Pujon, Vszt. gothárd, stb., M. szilvás (Borza BCI. VIII. 19)—Kide, Csomafája, Sólyomkő!—Bádok—Doboka (Harg. I. 129).

Ranunculus ficaria L. — Kv. „Szénafű, Fejérdi-e.” (Soó GM. 86, 90, Kv. 222, Soó & Ujv. Kv. 655), Szamosfalva (Soó GM. 106, Ny. Kv. 221—2), Apahida (Ny. Kv. 222)—Dezmér

„Puc” (Harg. in Kv. 655), Kolozs, Bós, Berkenyes (Freyn 112), Sz. újvár (K. & O. 12, Pr. Cp. 100), B. váralja, Szu. németi (Harg. II. 127—9), Bonchida—Szék, Sz. jenő, Iklód, stb., G. keresztur (Pr. Cp. 105), M. vásárhely (Ny. Mv. 41), Gyeke (Janka Linn. 555)—Kide—B. újfalu, Sólyomkő!, Doboka—Moró—Tötör (Harg. I. 127—8). — A ssp. vel var. *calthaefolius* (Rchb.) Bl. Nym. Sch. gyakoribb a typusnál, v. ö. Janka ÖBZ. IV. 189, Ny. Kv. I. c. mint *t. stipitatus* Nyár.

R. auricomus L. — Kv.: „Szénafű, Diószegi-e., Fejérdi-e.” (Schur VSV. X. 85, Soó GM. 83, Kv. 655, 223, Ny. BCl. XIII. 94), Dezmér „Puc” (!Ny. Kv. 223), Kolozs, K. bós, Berkenyes (Freyn 112), Sz. újvár, B. váralja (Harg. III. 125), Bonchida—Szék, Sz. jenő, Iklód, Szék—Vszt. gothárd—Pujon—Cege, Feketelak, Apahida „Ménesh.”!, M. szilvás, M. ménes, Teke (Borza BCl. VIII. 18, 25—6), M. vásárhely (Ny. Kv. 42 BCl. XIII. 95)—Mszt. györgy (Pr. Cp. 75)—Kide—B. újfalu, Sólyomkő!, Bádok—Doboka (Harg. I. 129).

var. *binatus* (Kit.) Heuff. — Kv.: „Szénafű, Előv., Csúp” (Schur VSV. X. 84, Wolff, Butujás ap. Ny. Kv. 222, 655), Bonchida (Soó 109), M. vásárhely, (Ny. BCl. XIII. 95)—Kide „Biszóh.”!

tr. *sibiricus* Glehn (*binatus-auricomus*). — Kv.: „Szénafű, Harmadv., Fejérdi-e.” (Wolff, Richter ap. Ny. Kv. 231, BCl. I. c., Soó Kv. 655), Iklód „Hársast.” (Soó 109)—Kide „Biszóh.”

tr. *reiniformis* Kitt. (*auricomus-binatus*). — Kv.: „Szénafű” (Bélteki, Richter ap. Ny. I. c., BCl. XIII. 94), Dezmér „Puc” (Soó Kv. 655), Szék (Soó 109), B. váralja (Harg. III. 127), M. vásárhely (Ny. BCl. I. c.)—Kide „Biszóh.”!, Sólyomkő!

tr. *incisifolius* Rchb. (*auricomus-cassubicus*). — Dezmér „Puc” (Soó Kv. 655), Sz. újvár (Harg. II. 66), Sz. jenő, Iklód, Bonchida—Szék (Soó 109), Kékes, M. vásárhely (Ny. BCl. XIII. 94—5)—Moró—Tötör (Harg. I. 127).

R. cassubicus L. — Kv.: „Szénafű, Fejérdi-e., Tekintő—Pokolköz” (Pr. Cp. 133—?, Soó & Ujv. Kv. 655), Sz. újvár (Pr. Cp. 100), Kékes, M. bánd (Pr. Cp. 100, 105), Szu. németi, Coptelke (Harg. III. 129—130), Bonchida—Szék, Sz. jenő, Korpád (Soó 109), M. vásárhely (Ny. BCl. XIII. 97)—Kide „Biszóh.”, Sólyomkő „Piatra”! (v. ö. Soó III. 140).

tr. *fallax* W. et Gr. (*cassubicus-auricomus*). — Kv. „Fejérdi-e.” (Soó 109, Ujv. in Kv. 655), Sz. újvár, F. mikola (Harg. II. 65—7), Dezmér „Puc” (Soó & Ujv. I. c.).

tr. *silvicola* W. et Gr. (*binatus-cassubicus*). — Kolozs (Soó Kv. 655), Bonchida—Szék (Soó 109), Sz. újvár, Füzesmikola (Harg. II. 66, 65), B. váralja (Harg. III. 127), Kékes (Ny. BCl. XIII. 97)—Kide „Biszóh.”, Sólyomkő „Piatra”!

tr. *pinguior* Rchb. (*cassubicus-binatus*). — Dezmér „Puc” (Ujv. I. c.), Bonchida—Szék (Soó 109), Sz. újvár, Füzesmikola (Harg. II. 65—7), B. váralja (Harg. III. 127), Sz. újfalu (Pr. ap. Ny. I. c.), K. borsa „Órhegy”, Kide „Biszóh”, Sólyomkő „Piatra”!

tr. *gracilis* Schur (*cassubicus-flabellifolius*). — Bonchida—Szék „Csanafű” (Soó 109).

R. lanuginosus L. — Szu. németi „Városerdeje” (Harg. III. 129), Sz. újvár, rétről közlik K. & O. 21.

Thalictrum aquilegiifolium L. — Kv.: „Szénafű, Előv., Harmadv., Morgó, Fejérdi-e.” (Soó FK. 1927. 24, Kv. 655, Bélteki, Knapp, Richter, stb. ap. Ny. Kv. 233), Dezméri-e. (Pr. Flora II. 148), Kolozs!, K. bós, M. csán, Berkenyes (Freyn 111), Sz. újvár (K. & O. 24), Korpád, Kiskályán, Pujon, Feketelak (Soó 109), Bazéd, Mojos (Lengy. ap. Soó I. c.), M. vásárhely (Ny. Mv. 39)—K. borsa „Szilaj”, Bádok, Kide—B. újfalu!

Th. minus L. (v. ö. Soó 109) — ssp. *elatum* (Jacq.). — Vszt. gothárd „Ombuzi-malom” (Soó I. c.).

Corydalis cava (L.) Schw. et Körte (incl. *lus. albiflora* (Kit.) Rchb.). — Kv. Szénafű?

(Soó GM. 83 Kolozsra von.), Kolozs (Freyn 114), Sz. újvár (K. & O. 9), Szu. németi (Harg. III. 130), Sz. jenő (Soó 109), Feketelak, M. örményes (Janka Linn. 556 sub. C. *Marschalliana*), Kékes (Pr. Cp. 101), Bazéd, Szabéd (Lengy. ap. Soó 109)—Kide „Biszóh.”, Sólyomkő „Piatra”!

C. *solida* (L.) Sw. — Kv. „Szénafű” (Pr. Cp. 117*), Szamosfalva (Soó GM. 106, Ny. Kv. 247), Dezmér „Puc”, Kolozs (Freyn 114, ide von. Soó GM. 83), Sz. újvár (Pr. Cp. 100, Harg. II. 67), Bonchida, Iklód, Bonchida—Szék (Soó 109), Vszt. gothárd (Janka ÖBZ. XVIII. 169), Kékes, Berkes, M. bánd (Pr. Cp. 101, 104—5), Szabéd (Lengy. ap. Soó l. c.), M. vásárhely „Beseh.” (Ny. Mv. 44)—Kide „Biszóh.”, Sólyomkő „Piatra”—Bádok—Doboka (Harg. I. 129) — var. *crenata* F. Schultz (*subintegra* Casp.)—Bonchida „Bánffy-park”, Iklód „Hársastető” (Soó 109).

Sisymbrium strictissimum L. — Kv.: „Szénafű, Fejérdi-e.” (Ny. Kv. 259, Soó GM. 83, Soó 109), M. vásárhely (Ny. Mv. 46).

Dentaria bulbifera L. — Füzesmikola (Harg. II. 65), B. váralja, Szu. németi (Harg. III. 125—8, 130), Iklód „Hársast.”, Cege—Pujon „Tisztáse.” (Soó 110), Teke (Borza BCl. VIII. 26)—Moró—Tötör (Harg. I. 127).

D. *glandulosa* W. et K. Montan elem. — Kékes (Pr. Cp. 101), B. váralja „Belliváry-i.”, Szu. németi „Városerdeje” (Harg. III. 128, 130)—Sólyomkő „Piatra” (Soó III. 140). Cardamine *impatiens* L. — Füzesmikola (Harg. II. 65), B. váralja, Szu. németi (Harg. III. 127, 130), Teke (Bozta BCl. VIII. 26)—Kide „Biszóh”! — Talán ide vonatkozik K. & O. 7. C. *silvatica* Lk. adata.

Arabis *hirsuta* (L.) Scop. — Kv.: „Szénafű”, Zsuk „Kesélyhegy”, Apahida (Pr. Cp. 133, Ny. Kv. 267), Bonchida—Szék (Soó 110), Szabéd (Lengy. ap. Soó l. c.), Szu. németi—Coptelke (Harg. III. 130).

Cardaminopsis *arenosa* (L.) Hay. — Montan. — Kv.: „Szénafű, Gella, Előv.” (Soó GM. 98, Butujás, Richter ap. Ny. és Ny. Kv. 267, főleg mint var. *segetalis* (Schur), Szék „Vánéberke” (Soó 110), Kolozs, K. bós (Freyn 114), M. vásárhely (Ny. Mv. 48, ap. Pr. Cp. 107), Füzesmikola (Harg. II. 66), B. váralja (Harg. III. 126), Mojos (Lengy. ap. Soó l. c.), Sólyomkő!

Turritis *glabra* L. — Kv. „Szénafű: Előv., Harmadv., Pokolköz, Morgó” (Bélteki, Ny. Soó Kv. 268), Dezmér „Puc” (Ny. l. c.), Korpád!, Gerend, M. záh (Ercsei 158). Sz. újvár (Harg. II. 67), Ördöngősfüzes (K. & O. 25), N. sármás (Borza BCl. VIII. 20), M. vásárhely (Ny. Kv. 45, ap. Pr. Cp. 107).

Hesperis *silvestris* Cr. — Kv. „Szénafű: Szt. györgyh., Pokolköz” (Ny. Kv. 265, Soó Kv. 657), Dezmér „Puc” (Soó l. c.), Kolozs—K. bós (Freyn 115, Ny. l. c.), Sz. újvár (K. & O. 10), Korpád, Bonchida—Szék (Soó 110), Kékes (Pr. Cp. 101), Feketelak (Pr. MBL. V. 31)—Kide—M. derzse!

Sedum *maximum* (L.) Hoffm. — Kv. „Szénafű: Előv., Csúp, Fejérdi-e.” (Soó GM. 98, Kv. 269, 657, Ny. Kv. 269), Sz. újvár (K. & O. 23, Harg. II. 68), Füzesmikola (Harg. II. 66), B. váralja, Coptelke (Harg. III. 125, 130), Sz. jenő, Iklód, Cege, Pujon, Vszt. gothárd, Korpád, Kolozs (Soó 110), M. szilvás, Báld (Borza BCl. VIII. 18, 22, 24), P. kamarás, Kékes (Pr. Cp. 102, 108), M. vásárhely (Ny. Mv. 50)—Kide, B. újfalu!, Doboka—Moró (Harg. I. 128).

S. *Aispanicum* Jusl. — Montan elem, adventive? — Kv. „Szénafű” (Butujás ap. Ny. Kv. 270).

Chrysosplenium *alternifolium* L. — Sz. újvár (Pr. Cp. 100), Ördöngősfüzes (K. & O. 8), Bonchida „Bánffy-park” (Soó 110), M. vásárhely (Ny. Mv. 51).

Fragaria *vesca* L. var. *semperflorens* Duch. — Szu. németi (Harg. III. 130), a typus kö-

*) Pr. Cp. 19, 185 adatai Kolozsvár, K. bós és Sz. újvár között bizonytalanok.

zönséges. A *F. moschata* Duch. csak a terület szegélyén: M. vásárhely (Kovács ap. Sternh. Siebenb. 28). — K. borsa!

Potentilla alba L. — Kv. „Szénafű: Gella, Tekintő, Előv., Morgó, Csúp, Diószegi-e., Fejérdi-e.” (Soó GM. 83, 90, Pr. Cp. 132, 136, Ny. Kv. 280, Soó 110, Kv. 658, Ghisa BCl. XXI. 61), Dezméri-e. (Ny. I. c.), Ajton (Ny. I. c.), Kolozs, K. bós (Freyn 125, Ny. I. c., Pr. Cp. 99), Sz. jenő, Iklód, Szék, Cege—Pujon, Kiskályán (Soó 110), Füzesmikola (Harg. II. 65), Sóspatak—Ménesfalu (Ny. ap. Pr. Cp. 98), Mojos (Lengy. ap. Soó 110)—Kide—B. újfalu, Sólyomkő!, Doboka—Moró (Harg. I. 128) —
P. thuringiaca Bernh. resp. *P. parviflora* Gaud. ssp. *thuringiaca* Soó. — Kv. „Szénafű: Előv., Csúp, Harmadv.” (Schur VSV. X. 98, Soó BK. XXIII. 148, GM. 83, AGH. V. 148, Kv. 658, Bélteki, Wolff ap. Ny. Kv. 285, Ny. I. c.), Dezmér „Puc”!, Ajton Ny. I. c.), Pujon (Soó 110), Sz. újvár (Harg. II. 67), B. váralja (Harg. III 125). Kékes (Pr. Cp. 108), Vszt. gothárd (Janka MTK. XII. 186), Mojos (Lengy. ap. Soó 110), M. vásárhely „Uriesul” (Ny. Mv. 59), K. borsa „Órhegy”, Bánok, Sólyomkő! — Moró—Tötör (Harg. I. 127).

t. elongata (Goldb.) Th. W. — „Szénafű: Előv.” (Butujás, Soó, Ujv. Kv. 285, 658). var. *Nestleriana* (Tratt.) Sch. et K. — „Szénafű: Előv.” (Ny. FER. 793, Soó Kv. 658), B. váralja, Szu. németi—Coptelke (Harg. III. 128, 130) Dezmér „Puc” (Soó I. c.).

ssp. *chrysanthia* (Trev.) Soó. — Kv. „Szénafű: Előv., Morgó, Fejérdi-e.” (Schur VSV. X. 98, Soó BK. XXIII. 148, Soó & Ujv. Kv. 658, Knapp ap. Ny. Kv. 286), Kolozs (Freyn 126, Soó Kv. 658), K. bós (Freyn 126), Vszt. gothárd (Janka Linn. 567).

Waldsteinia geoides Willd. — Apahida „Méneshágó” (! Ny. Kv. 288), Fejérdi-e., Szék „Vánéberke” (Soó 111), Berkenyes (Freyn 126), P. kamarás (Borza BCl. VIII. 24), Berkes (Pr. Cp. 104), Feketelak, Kiscég (Janka Linn. 566).

Geum urbanum L. — Kv. „Szénafű: Csúp, Diószegi-e., Fejérdi-e.” (Soó GM. 83, Kv. 658), Apahida „Ménesh.” (Ny. Kv. 288), Dezmér „Puc”, Kolozs (Soó Kv. 658), Egerbegy (Ercsei 35), Sz. újvár (K. & O. 13, Pr. Cp. 100), B. váralja (Harg. III. 126), Bonchida, Sz. jenő, Iklód, Bonchida—Szék, Vszt. egyed—Pujon—Cege, Feketelak, Korpád stb., P. kamarás, N. sármás (Borza BCl. VIII. 24), Gyeke—Sármás, M. bánd (Pr. Cp. 103, 111), M. vásárhely (Ny. Mv. 54)—K. borsa, Bánok, Kide, B. újfalu, Sólyomkő!, Bánok—Doboka (Harg. I. 129).

Alchemilla vulgaris L. — Montan elem. — Kolozs (Freyn 126).

Cytisus supinus L. (*C. aggregatus* Schur). — Kolozs, K. bós (Freyn 128), Sz. újvár (K. & O. 10 sub *C. ratisbonensi*).

C. hirsutus L. ssp. *leucotrichus* (Schur) A. et G. — Kv. „Szénafű: Előv., Fejérdi-e.” (Soó GM. 82, Ny. Kv. 309), Apahida (Ny. I. c.), Egerbegy (Barabás ap. Simk. En. 173), Sz. újvár (K. & O. 9), Szék!, Magyarszovát (Péterfi MBL. XVII. 59), Kide „Biszóh.”, Sólyomkő „Dumbrava”!

var. *semielongatus* Nyár. — Bonchida—Kisiklód (Soó 111).

Tritolium medium L. — Kv. „Szénafű: Csúp, Diószegi-e.” Ny. Kv. 319, Harg. in Kv. 660, Soó 111), Ajton (Ny. I. c.), Dezméri-e. (Pr. Flora II. 148), Aranykút, Berkenyes (Freyn 128), Korpád, Apahida „Ménesh.”, Sz. jenő, Iklód, Szék, Cege, Pujon, Vszt. gothárd (Soó 111), Sz. újvár (K. et O. 25, Pr. Cp. 109), Füzesmikola (Harg. II. 65), B. váralja, Coptelke (Harg. III. 125, 130), Bál (Borza BCl. VIII. 22), Szt. miklós, Zsuk (Pr. Cp. 93, 152), Bazéd (Lengy. ap. Soó 111), M. vásárhely (Ny. Mv. 64)—Kide, B. újfalu, Sólyomkő!, Doboka—Moró (Harg. I. 128).

ssp. *sárosiense* (Hazsl.) Gib. et Belli. — Füzesmikola (Harg. II. 65).

T. agrarium L. (*T. strepens* Cr.). — Kv. „Szénafű: Tekintő” (Ujv. in Kv. 660), Sz. újvár (K. & O. 16), Korpád (Soó 111), Bazéd (Lengy. ap. Soó 111), M. vásárhely „Temp-lomdomb” (Ny. Mv. 63).

- Astragalus glycyphyllos* L. — Kv. „Szénafű: Csúp, Fejérdi-e.” (Soó GM. 83, Kv. 324, Harg. in Kv. 661), Sz. újvár (K. & O. 5), Füzesmikola (Harg. II. 65), B. várhalja (Harg. III. 125), Bonchida—Szék, Sz. jenő, Iklód, Pujon, Cege, Vszt. gothárd, Feketelak!, M. szilvás, Báld (Borza BCI. VIII. 18, 22), M. vásárhely (Ny. Mv. 68, ap. Pr. Cp. 107)—Kide, B. újfalu, Sólyomkő!
- Vicia silvatica* L. — Kv. „Fejérdi-e.” (Soó 111), Apahida „Méneshágó” (Ny. Kv. 329), Aranykút, Berkenyes (Freyn 129), M. szilvás (Borza FER. 803a.), Bala—N. ercse (Ny. ap. Pr. Cp. 106)—Sólyomkő „Piatra”!
- V. dumetorum* L. — Fejérdi-e. (Soó & Ujv. Kv. 661), Kolozs!, Berkenyes (Freyn 129), Iklód „Hársast.” (Soó 111), N. sármás, Báld (Borza BCI. VIII. 20—1), Bazéd (Lengy. ap. Soó 111)—Bádok—Doboka (Harg. I. 129).
- V. pisiformis* L. — Ajton (Freyn 129), P. kamarás (Borza FER. 1712), Egerbegy (Barabás ap. Simk. En. 192), Báld (Borza BCI. VIII. 22).
- V. cassubica* L. — Kolozs (Baumgt. En. II. 338), Cege „Újtó-v.” (Soó 111), Szabéd (Lengy. ap. Soó l. c.), Báld (Borza BCI. VIII. 22).
- V. sepium* L. — Kv. „Szénafű: Gella, Diószegi-e., Fejérdi-e.” (Soó GM. 83, Kv. 328, 661, Pr. Cp. 96, 167, Richter ap. Ny. Kv. 328), Szamosf.—Apahida, Ajton (Ny. l. c.), Sz. újvár (K. & O. 26), Kolozs, Korpád, Bonchida, Iklód, Szék, Cege stb.!—K. borsa, Kide, B. újfalu, Sólyomkő!
- Lathyrus Hallersteinii* Baumg. tr. *longipedunculatus* Nyár. — Füzesmikola (Soó ap. Ny. Kv. 661), Sz. jenői-e. (Soó 112). A typus a terület határán, Ajton és Rőd között Freyn 130, ap. Ny. Kv. 332), de nincs a Szénafűveken (Hayek, Pflanzendecke 466 adata téves).
- L. silvester* L. var. *platyphyllus* (Retz.) Asch. — Kv. „Szénafű: Fejérdi-e.” (Soó BK. XII. 72, GM. 83, Kv. 333), Kolozs (Freyn 130).
- L. latifolius* L. — Kv. „Szénafű” (Baumg. En. II. 335, Zsák ap. Ny. Kv. 333), K. bós (Freyn ap. Ginzberger Sitzb. Akad. Wien CV. 326), Cege „Újtó-v.”, Ombozteleke, Vszt. gothárd „Ombozi malom” (Soó 112) — rendesen mint var. *brachypterus* (Alef.) Beck.
- L. vernus* (L.) Bernh. — Kv. „Szénafű: Csúp, Diószegi-e., Fejérdi-e.” (Soó GM. 83, Harg., Soó Kv. 661), Dezméri-e. (Pr. Flora II. 18), Dezmér „Puc”, Kolozs (Soó l. c.), Apahida „Ménesh.” (! Ny. Kv. 335), Sz. újvár (K. & O. 18), Füzesmikola (Harg. II. 65), B. várhalja, Szu. németi, Coptelke (Harg. III. 125—30), — Szék, Sz. jenő, Iklód, Szék—Vszt. egyed, Pujon, Vszt. gothárd, Kiskályán, Korpád!, M. szilvás, Báld, Teke (Borza BCI. VIII. 18, 22, 26), Kékes, Berkes, G. keresztur, Meggyesf. (Pr. Cp. 101—6), M. vásárhely (Ny. Mv. 65)—Kide, — E. újfalu, Sólyomkő!, Bádok—Doboka—Moró—Tötör (Harg. I. 127—9).
- L. niger* (L.) Bernh. — Kv. „Szénafű: Csúp, Diószegi-e., Fejérdi-e.” (Soó GM. 83, Ny. Kv. 335, Harg. Kv. 661), Apahida „Ménesh.”!, Ajton (Ny. l. c.), Dezméri-e. (Pr. Flora II. 148), Dezmér „Puc”. Kolozs (Soó Kv. 661), Sz. újvár (Harg. II. 67), Füzesmikola (Harg. II. 65), B. várhalja, Szu. németi (Harg. III. 125—30), Bonchida—Szék, Sz. jenő, Iklód, Szék, Vszt. egyed, Pujon, Cege, Feketelak, Vszt. gothárd, Kiskályán, Korpád!, M. szilvás, N. sármás, Báld, P. kamarás, Teke (Borza BCI. VIII. 18—26), Kékes (Pr. Cp. 101), M. vásárhely (Ny. Mv. 65)—Bádok, Kide, B. újfalu, Sólyomkő!, Bádok—Doboka—Moró (Harg. I. 128—9).
- L. transsilvanicus* (Spr.) Rchb. — Kide „Biszóhegy”! (Soó III. 140).
- Genista ovata* W. et K. ssp. *transsilvanica* (Lerchenf.) Jáv. var. *Mayeri* (Janka). — Kidetől ÉNy-ra M. derzse felé, Csomafája „Dunga”!
- Geranium phaeum* L. — Kv. „Szénafű (Richter ap. Ny. Kv. 337—?), Sz. újvár (Pr. Cp. 100), B. várhalja, Szu. németi (Harg. III. 127, 130), Szék, Cege, Vszt. gothárd (Soó 112). Kide „Biszóh.”!, Bádok—Doboka (Harg. I. 129).

G. palustre Torner. — Kv. „Szénafű: Előv.” (Soó GM. 94, Kv. 337), „Fejérdi-e.”, Füzesmikola!, Bonchida, Szék (Soó 112), M. vásárhely (Ny. Mv. 69)—Kide „Biszóh.”!—Bádok—Doboka (Harg. I. 129).

G. Robertianum L. — Sz. újvár (K. & O. 13), Füzesmikola (Harg. II. 66), B. váralja (Harg. III. 126), Bonchida, Cege, Vszt. gothárd, parkokban (Soó 112), P. kamarás, N. sármás (Borza BCl. VIII. 21, 24), Kékes, Gyeke—Sármás (Pr. Cp. 101, 103), M. vásárhely (Ny. Mv. 69), Mojos (Lengy. ap. Soó 112).—Kide—B. újfalu!, Bádok—Doboka (Harg. I. 129).

Oxalis acetosella L. — Bonchida, Vszt. gothárd (Soó 112, parkokban, valószínűleg adventív), Füzesmikola (Harg. II. 65), B. váralja, Szu németi, Coptelke (Harg. III. 127—30).

O. stricta L. — Bonchida, Cege (Soó 112 mint az előző).

Mercurialis perennis L. — Kv. „Szénafű: Tekintő—Pokolköz (Pr. Cp. 133), Fejérdi-e.” Dezmér „Puc” (Soó & Ujv. Kv. 661), Bonchida, Szék, Pujon, Vszt. egyed (Soó 112), B. váralja, Szu németi (Harg. III. 127, 230), Kékes (Pr. Cp. 101), Kide „Biszóh., Sólyomkő „Piatra”!, Bádok—Doboka (Harg. I. 129).

Euphorbia stricta L. — Kv. „Szénafű” (Pr. Cp. 168, Borbás ap. Ny. Kv. 346—?), Füzesmikola (Harg. II. 66).

E. polychroma Kern. — Kv. „Szénafű: Szt. györgyh., Gella, Kúph., Jósikatanya, Pokolköz, Előv., Morgó, Fejérdi-e.” (Andrae B. Z. XIII. 913, Soó GM. 82, Pr. Cp. 95, auct. pl. ap Ny. Kv. 346, Soó Kv. 662, AGH. V. 145, 148), Dezmér „Puc” (Soó Kv. 662), Kolozs, K. bós (Freyn 123), Sz. jenő, Iklód, Bonchida—Szék (Soó 112), Füzesmikola (Hg. II. 66), P. kamarás, Teke (Borza BCl. VIII. 24—6), Mojos, Szabéd (Lengy. ap. Soó 112), M. vásárhely (Ny. Mv. 72)—K. borsa, Bádok, Kide, —B. újfalu, Sólyomkő!

E. angulata Jacq. — Kv. „Szénafű: Előv., Fejérdi-e.” (Soó FK. 1927. 24, GM. 83, Kv. 346, 662, Ny. Kv. 346), Dezméri-e. (Pr. Flora II. 148), Dezmér „Puc”!, Ajton (Ny. I. c.), Kolozs, K. bós (Freyn 346), Bonchida—Szék, Iklód, Szék, Cege—Pujon, Feketelak, Korpád (Soó 112), Mojos (Lengy. ap. Soó 112), Bala, M. panit (Ny. ap. Soó I. c.), M. vásárhely „Bese-h.” (Ny. Mv. 72)—Bádok, Kide, Sólyomkő „Dumbrava”!

E. amygdaloides L. — Kv. „Fejérdi-e.” (Soó & Ujv. Kv. 662), Dezmér „Puc”!, Apahida „Ménesh.” (! Ny Kv. 347), Kolozs (Soó I. c.), Sz. újvár (Pr. Cp. 100), Füzesmikola (Harg. II. 65), B. váralja, Szu németi, Coptelke (Harg. III. 126 130), Bonchida—Szék, Vszt. gothárd, Kiskályán, Korpád (Soó 112), M. ménes, P. kamarás (Borza BCl. VIII. 24—5), M. bánd (Pr. Cp. 105), M. vásárhely (Ny. Mv.)—Bádok, Kide, Sólyomkő!, Bádok—Doboka—Moró (Harg. I. 128—9).

Impatiens noli-tangere L. — Bonchida „Bánffy-park” (Soó 112), Gerend (Ercsei 48).

Hypericum montanum L. var. *scabrum* Koch. — Kv. „Szénafű: Előv., Fejérdi-e.” (Soó GM. 83, Kv. 564, Ghisa ap. Ny. Kv. 564), Ajton (Freyn 121), M. bánd, Bazéd (Lengy. ap. Soó 112)—Kide „Biszóhegy”!

H. hirsutum L. — Kv. „Szénafű (Ny. Kv. 364), Fejérdi-e.” (Soó 113), Dezmér „Puc” (! Ny. I. c., Ujv. in Kv. 662 f. *latifolium* Beckh.), Kolozs, K. bós, Berkenyes (Freyn 121), Mócs (Fuss Transs. 134), Sz. újvár (K. & O. 14, Pr. Cp. 109, Harg. II. 67), Szék, Cege—Pujon, Korpád (Soó 113), Szabéd, M. bánd (Lengy. ap. Soó I. c.)—Kidel, Doboka—Moró (Harg. I. 128).

H. maculatum Cr. — Kv. „Szénafű” (Schur VSV. X. 97, Wolff ap. Ny. Kv. 263), „Fejérdi-e.” (Soó GM. 83, Kv. 263), Ajton „Csolt” (Ny. I. c.).

Viola cyanea Cel. — Kv. „Szénafű: Szt. györgyh., Fejérdi-e.” (Schur ÖBZ. IX. 253, Soó BK. XXIII. 149, GM. 83, Pr. Cp. 138), Szamosfalva (Soó GM. 106, Ny. Kv. 369),

- Dezmér „Puc“ (! Harg. 662), Bazéd, Szabéd (Lengy. ap. Soó 113)—K. borsa „Ór-hegy“!
- V. odorata* L. — Sz. újvár (K. & O. 27, Harg. II. 67), Kv. „Szénafű“ (Pr. Cp. 117), P. kamarás, Kékes, M. záh, M. bánd (Pr. Cp. 101—105), Bazéd, Szabéd (Lengy. ap. Soó 113), M. vásárhely (Ny. Mv. 76), N. sármás (Borza BCl. VIII. 21).
- V. odorata* × *hirta* (*V. permixta* Jord.) — Kv. „Szénafű: Szt. györgyh.“ (Soó Kv. 371, Ny. I. c. f. *oenipontana* Murr.), Sz. újvár (Harg. II. 67).
- V. cyanea* × *hirta* (*V. Kernerii* Wiesb.). — Kv. „Szénafű“ (Soó Kv. 371, Borbásia III. 94. f. *monostorensis* Nyár I. c.).
- V. mirabilis* L. — Kv. „Szénafű: Előv., Harmadv., Fejérdi-e.“ (Soó FK. 1927. 24, GM 83, Kv. 372, 662, Ny. Kv. 372 cum *t. pratensis* Nyár), Dezmér „Puc“, Apahida „Ménesh.“ (!Ny. I. c.), Dezméri-e (Pr. Flora II. 148), Kolozs, Ajton, Berkenyes (Freyn 118), Kiskályán, Szék, Pujon, Vszt. gothárd (Soó 113), Sz. újvár (K. & O. 27), M. szilvás, N. sármás, P. kamarás (Borza BCl. VIII. 18, 21, 24), Kékes, Berkes, M. bánd (Pr. Cp. 101, 104—5), Bazéd, Sárpatak, Pókakeresztur (Lengy. ap. Soó 113), Szabéd (Borza 1944, 33), M. vásárhely (Ny. Mv. 76)—Borsa „Szilaj“!, Moró—Tötör (Harg. I. 127).
- V. sylvatica* Fr. — rendesen mint *tr. intermedia* Rchb. (*nemorosa* N. W. M.). — Kv. „Szénafű: Csúp, Fejérdi-e.“ (Soó GM. 83, Harg., Soó Kv. 662), Dezmér „Puc“ (! Harg. in Kv. 662), Dezméri-e (Pr. Flora II. 148), Kolozs—Ajton (Ny. Kv. 373), Berkenyes (Freyn 117), Kiskályán, Apahida „Ménesh.“, Bonchida, — Szék, Iklód, Cege—Pujon—Vszt. egyed stb. (Soó 113), Sz. újvár (K. & O. 27, sub. *V. pratensi ex loco natali*), Füzesmikola (Harg. II. 66), B. váralja, Szu. németi, Coptelke (Harg. III. 125—30), M. szilvás, M. ménes, N. sármás, Teke (Borza BCl. VIII. telke (Harg. III. 125—30), M. szilvás, M. ménes, N. sármás, Teke (Borza BCl. VIII. 18—26), Kékes, P. kamarás, Berkes, M. bánd (Pr. Cp. 101—5), Mojos (Lengy. ap. Soó 113), M. vásárhely (Ny. Mv. 77)—Kide (itt a typus, ill. var. *pseudolividu* Schur (*transsilvanica* W. Beck) is), — B. újfalu, Sólyomkő!, Bánok—Doboka—Moró—Tötör (Harg. I. 127—9), Szabéd (Borza 1944, 33).
- ssp. Riviniana* (Rchb.) Asch. — Dezmér „Puc“ (Harg. in Kv. 662), Dezméri-e (Pr. Flora II. 148), Sz. újvár (Harg. II. 67), M. vásárhely (Ny. Mv. 77).
- V. Riviniana* × *montana* (W. Weinharti W. Beck.). — Sz. újvár (Harg. II. 67).
- V. montana* L. — Kv. „Szénafű: Előv.“ (Soó Kv. 374, Zsák, Ny. Kv. 374), Sz. újvár (Harg. II. 68).
- V. erecta* Gilib. — Montan elem. — Kv. „Szénafű: Előv., Harmadv.“ (Bélteki ap. Ny. I. c., Ujf. in Kv. 662).
- V. tricolor* L. *ssp. Bielziana* (Schur) Soó — Montan elem. — Kv. „Szénafű“ (Richter ap. Ny. Kv. 375 non typ. 376 sub. *V. saxatili*. Magam *V. tricolor* (s. l.)-et nem láttam a Mezőségen, csak *V. arvensis* Murr. (s. l.)-t. Ny. Mv. 76 M. vásárhelyről közli.
- Daphne mezereum* L. — Kv. „Szénafű: Diószegi-e., Fejérdi-e.“ (Soó & Ujf. Kv. 662), Dezmér „Puc“ (! Ny. Kv. 380), Kolozs (Soó I. c.), Sz. újvár (Pr. Cp. 100), Kolozs—néma (K. & O. 10), B. váralja, Coptelke (Harg. III. 126—8, 130), Iklód, Bonchida—Szék, Vszt. gothárd, Kiskályán „Somai-e.“ (Soó 113), M. szilvás (Borza BCl. VIII. 17), Bala—N. ercse (Ny. ap. Soó 113), M. vásárhely (Ny. Mv. 78!)—Bánok, B. újfalu—Kide, Sólyomkő!, Bánok—Doboka (Harg. I. 129).
- D. cneorum* L. csak a terület szélén: Apahida „Csuhá“ (!Pr. Cp. 18, 142, Ny. Kv. 380), Dezméri-e. (Ny I. c.).
- Epilegium montanum* L. — Kv. „Szénafű: Csúp“ (Harg. in Kv. 662), Ajton (Freyn 124), Sz. újvár (Pr. Cp. 100), Füzesmikola (Harg. II. 66), Ördöngősfüzes (K. & O. 11), M. szilvás, Bál (Borza BCl. VIII. 18, 22), — K. borsa, Kide, B. újfalu, Csoma-fája!—Bánok—Doboka—Moró (Harg. I. 128—9).

E. palustre L. — Montan elem. — Kv. „Szénafű Elővölgy” (Soó Kv. 663), Szamosfalva (Borb. ap. Ny. Kv. 384), Apahida „Kerektó” (Pr. Cp. 53, ez az adat hiányzik a kolozsvári flóraműből)—Kidei völgy!

E. palustre × parviflorum (*E. rivulare* Wahlbg.) — Kv. „Szénafű: Előv.” (Soó Kv. 642).

E. collinum Gmel. — Kékes (Pr. Cp. 108).

Hedera helix L. — Kv. „Fejérdi-e.” (Soó Kv. 663) Apahida „Méneshágó” (Soó 113), Sz. újvár, B. váralja, Szu. németi, Coptelke (Harg. III. 128—30), M. szilvás, M. ménes (Borza BC. VIII. 18, 25), Berkes (Pr. Cp. 104)—Kide, Csomafája, Sólyomkő! Bádok—Doboka (Harg. I. 129).

Sanicula europaea L. — Sz. újvár!, Füzesmikola (Harg. II. 65), B. váralja, Szu. németi, Coptelke (Harg. III. 128, 130), Pujon, Vszt. egyed (Soó 113)—Bádok—Doboka Harg. I. 129).

Chaerophyllum aromaticum L. — Kv. „Fejérdi-e.” (Soó GM. 83, Kv. 300), B. váralja, Szu. németi (Harg. III. 126—130), Bonchida—Szék, Cege, Kiskályán „Somai-c.” (Soó 113)—Kide „Biszóh.”!, Bádok—Doboka (Harg. I. 129).

Aegopodium podagraria L. — Kv. „Szénafű: Diószegi-e., Fejérdi-e.”, Kolozs (Soó Kv. 397, 663), Szamosfalva—Apahida (Soó GM. 106, Ny. Kv. 397), Sz. újvár (!), Füzesmikola (Harg. II. 66), B. váralja, Szu. németi, Coptelke (Harg. III. 128—130), Sz. jenő, Iklód, Vszt. gothárd (Soó 113), Bonchida, — Szék, Vszt. egyed, Pujon, Cege. Apahida „Méneshágó”, Kiskályán „Somai-e.”, Korpád!, P. kamarás, N. sármás (Borza BC. VIII. 24), M. ludas (Pr. Cp. 110), M. vásárhely (Ny. Mv. 79)—Kide, B. újfalu, Csomafája, Sólyomkő!, Bádok—Doboka (Harg. I. 129).

Cicuta virosa L. — Montan elem. — Kissármás (Pr. Cp. 103).

Oenanthe banatica Heuff. — Kv. „Szénafű: Előv., Harmadv., Csúp, Fejérdi-e.” (Soó GM. 96, Ny. FK. 52, Kv. 399), Ajton (Freyn 107, Ny. I. c.), Bonchida (Soó 113).

Peucedanum carviifolia (Cr.) Vill. — Kolozs (Freyn 109), M. földvár (Pr. Cp. 145). Pujon (Janka Linn. 573), Borsa „Órhegy”!

Angelica silvestris L., a montan jellegű var. *elatior* Wahlbg. — Kv. „Szénafű. Előv., Csúp” (Soó, Harg., Ujv. Kv. 663).

Heracleum sphondylium L. — Kv. „Szénafű: Előv., Pokolköz. Tekintő, Morgó, Csúp, Fejérdi-e.” (Soó GM. 83, 87, Pr. Cp. 137, Bélteki, Borbás, Zsák ap. Ny. Kv. 403. Soó & Ujv. Kv. 663), Ajton (Ny. I. c.), Kclozs (Soó Kv. 663), Korpád, Bonchida, Iklód, Szék, Cege, Pujon, Vszt. gothárd, Feketelak (Soó 114), Bazéd (Lengy. ap. Soó 114), Sz. újvár (K. & O. 13), Füzesmikola (Harg. II. 66), B. váralja, Coptelke (Harg. III. 126, 130), A. gyéres, Gerend, M. záh, Mojos (Ercsei 151), P. kamarás (Borza BC. VIII. 24), M. vásárhely (Ny. Mv. 70)—K. borsa „Szénafű”, Csomafája!

Laserpitium latifolium L. (rendesen mint *f. asperum* (Cr.) R. et C.). — Kv. „Szénafű: Előv., Harmadv., Morgó, Csúp, Fejérdi-e.” (Soó BK. XXIII. 150 a typussal *f. glabrum* (Cr.) R. et C., Soó GM. 83, 91, Kv. 663, Ny. Kv. 403), Dezmér „Puc” (! Ny. I. c., Ujv. in Kv. 663), Kolozs, K. bós, Ajton (Freyn 109, Ny. I. c.), Kis-kályán, Iklód, Bonchida—Szék, Feketelak (Soó 114), Bazéd (Lengy. ap. Soó 114), Füzesmikola (Harg. II 66), Sz. újvár (K. & O. 23 sub „*Siler trilobum*”—K. borsa „Szénafű”, Bádok, Kide!, Doboka—Moró—Tötör (Harg. I. 127—8).

L. pruthenicum L. — A terület szegélyén: Ajton (Freyn 109).

Pyrola rotundifolia L. — Sz. újvár (K. & O. 20, Pr. Cp. 100)—Bádok—Doboka „Nagy-hegy” (Harg. I. 129).

Monotropa hypopithys L. — Teke (Borza BC. VIII. 26).

Primula veris L. em. Huds. — Kv. „Szénafű: Szt. györgyh., Gella, Előv., Harmadv., Morgó, Tekintő, Csúp, Diószegi-e., Fejérdi-e.” (Soó GM. 83, 87, 90, Kv. 408, 663, Pr. Cp. 132, Ny. Kv. 408, Ghisa BC. XXI. 61 stb.), Apahida „Csuhá” (! Pr. Cp. 142),

Kolozs, K. bós (Freyn 106), Ajton (Ny. I. c.), Zsuk „Kesélyh.” (Ny. I. c.), Sz. újvár (K. & O. 20, Harg. II. 68), B. váralja, Szu. németi (Harg. III. 126, 130), Bonchida, — Szék, Sz. jenő, Iklód, Cege, Pujon, Vszt. gothárd stb., Berkes, Meggyesf., M. bánd (Pr. Cp. 104, 106, 110), Szabéd (Szakmáry EK. VII. 119 et sub *P. elatiore*), Meleg-földvér (Pr. Cp. 145), M. vásárhely (Ny. Mv. 82)—Boisavidék köz., Bádok—Doboka, Moró—Tötör (Harg. I. 127, 129). A typuson kívül gyakori a var. *canescens* (Opiz) Beck, átmeneti alak a *t. calvescens* Pax (v. ö. Borb. ÖBZ. 1891. 323).

Gentiana praecox Kern. ssp. *carpatica* Wettst. — Montan elem. — Kv. „Szénafű: Morgó” (Soó BK. XXII. 70, Bélteki, Harg., Ny. Kv. 414). A *G. baltica* Murb. adata a Szénafüvekről (Janka Linn. 591, ap. Weitst. Mon. *Gentiana*—*Endotricha* 1896. 318, Wolff ap. Ny. Kv. 413 stb.) a bizonyító példányok (?) ellenére is törlendő.

G. cruciata L. — Kv. „Szénafű: Fejérdi-e.” (Bélteki, Soó Kv. 414, Soó 114), Dezmér „Puc” (Ujv. in Kv. 663), Kolozs, K. bós (Freyn 97), Sz. újvár (K. & O. 13, Pr. Cp. 118), Buza (Pr. Cp. 145), Cege „Újtó” (Soó 114), Szabéd (Lengy. ap. Soó 114)— Borsa „Órhegy”!

G. ciliata L. — Kv. „Szénafű, Fejérdi-e.” (Soó BK. XXIII. 150 cum *t. multiflora* Gaud., GM. 91, Pop BCI. XIII. 103, Soó Kv. 663), Kolozs (Freyn 97), Sz. újvár (K. & O. 13), *Menyanthes trifoliata* L. — Montan elem. — Egerbegy—M. csán (Ercsei 44), Sz. nyires (Pr. Cp. 55, állítólag *Sphagnumokkal*).

Vinca minor L. — Bonchida „Bánffy-park”, Cege—Pujon „Tisztáse.” (Soó 102), B. váralja, Coptelke (Harg. III. 102, 125, 130), Kékes (Pr. Cp. 101)—Bádok, Sólyomkő „Piatra”!, Bádok—Doboka (Harg. I. 129).

Sympytum tuberosum L. ssp. *nodosum* (Schur) Soó (Syn.: *foliosum* Rehm.) — Kv. „Szénafű Előv., Csúp, Diószegi-e., Fejérdi-e.” (Soó GM. 83, Kv. 421, 664, Ny. Kv. 421), Dezmér „Puc” (Ny. I. c., Soó Kv. 664), Dezméri-e. (Pr. Flora II. 148), Ajton (Ny. I. c.), Kclozs!, K. bós, Berkenyes (Freyn 102), Sz. újvár (Harg. II. 68), Füzes-hida—Szék, Sz. jenő, Iklód, Szék—Vszt. egyed—Pujon, Feketelak, Vszt. gothárd, Kis-kályán, Korpád, M. ménes (Borza BCI. VIII. 25), P. kamarás (Borza 1944. 25), M. bánd (Pr. Cp. 105), M. vásárhely (Ny. Mv. 87), Bádok, Kide, — B. újfalu, Sólyomkő!, Bádok—Doboka—Moró—Tötör (Harg. I. 127—9).

Pulmonaria officinalis L. ssp. *obscura* (Dum.) Murb. — Kv. „Szénafű, Fejérdi-e.” (Soó GM. 83, Kv. 424), Dezmér „Puc”, Kolozs (Soó Kv. 664), K. bós (Pr. Cp. 99), Szamosfalva (Soó GM. 106, Ny. Kv. 424), Sz. újvár (Pr. Cp. 100), Füzesmikola (Harg. II. 65), B. váralja, Szu. németi, Coptelke (Harg. III. 125—30), Bonchida, — Szék, Sz. jenő, Iklód, Szék, — Vszt. egyed—Pujon, Vszt. gothárd, Kiskályán, Apahida „Méneshágó”!, M. szilvás, N. sármás, M. ménes, Teke (Borza BCI. VIII. 19—26), Kékes, Berkes, M. bánd (Pr. Cp. 101, 104—5), M. vásárhely (Ny. Mv. 87)—Kide, — B. újfalu, Csomafája, Sólyomkő!, Bádok—Doboka, Moró—Tötör (Harg. I. 127, 129).

P. mollissima Kern. — Kv. „Szénafű: Előv., Morgó, Csúp, Diószegi-e., Fejérdi-e.” (Soó GM. 87, 90 sub. *P. offic.*, AGH. V. 143, Kv. 425, 664, Pr. Cp. 133, Ny. Kv. 425), Ghisa BCI. XXI. 62), Apahida „Csuha”, Kolozs—Ajton (Ny. I. c.), Dezmér „Puc” (Soó Kv. 664), Kolozs, K. bós, Berkenyes, M. csán, Virágosv. (Freyn 100), Dezméri-e. (Pr. Flora II. 147), Sz. újvár (K. & O. 20, Harg. II. 67—8), B. váralja, Szu. németi (Harg. III. 128—30), Bonchida, — Szék, — Sz. jenő, Iklód, Szék — Vszt. egyed—Ombozelke—Pujon—Cege, Feketelak, Vszt. gothárd, Kiskályán, Apahida „Ménesh.”, Korpád! M. bánd (Pr. Cp. 105), Sóspatak, G. keresztur (Ny. ap. Pr. Cp. 105), M. vásárhely (Ny. Mv. 87)—K. borsa „Szénafüvek”, Bádok, Kide, — B. újfalu, Sólyomkő!, Doboka—Moró—Tötör (Harg. II. 127—8).

Myosotis sparsiflora Mikan. — Kv. „Szentgyörgyh.” (Soó Kv. 644), Bonchida (Soó 114), Sz. újvár' (K. & O. 17, Pr. Cp. 100)—Sólyomkő „Piatra”!

M. silvatica (Ehrh.) Hoffm. — Doboka—Moró (Harg. I. 128—?), valószínűleg *M. alpestris* Schm. ssp. *stenophylla* (Knaf) Vestergr. (*M. montana* & *suaveolens* auct.), amely Kv. „Szénafű: Előv., Tekintő, Pokolköz (Soó GM. 91, BK. XXIII. 157, Pr. Cp. 133, Ny. Kv. 427, számos gyűjtőtől FER. 1551), Morgó, Harmadv. (!); Kolozs, K. bós Virágosv. (Freyn 102), valamint Kide „Biszóh.” terem, sőt elterjedt Erdély nagy részében. L. Vestergreen Arch. f. Bot. 29 A. No. 8, 16—7, Soó Kv. 427.

Lithospermum purpuro-coeruleum L. — Kv. „Szénafű: Kúph., Morgó, Fejérdi-e.” (Soó GM. 83, Kv. 427, Wolff, Richter etc. ap. Ny. Kv. 427, Ujv. in Kv. 664), Apahida (Pr. ap. Ny. I. c.), Dezmér „Puc” (! Ny. I. c.), Kolozs (Freyn 101), Sz. újvár (Fuss VSV. XV. 119, K. & O. 17, Pr. Cp. 100), Szu. németi (Harg. III. 130), Bonchida-Szék, Sz. jenő, Iklód, Szék (Soó 114), Szabéd (Szakmáry E. K. VII. 117), Mojos (Lengy. ap. Soó 114), M. bánd (Ny. ap. Soó 114), M. vásárhely (Ny. Mv. 85), Gerend (Wolff MNL. I. 63)—K. borsa „Szilaj”!, Moró—Tötör (Harg. I. 126).

Ajuga reptans L. — Kv. „Szénafű: Előv., Csúp, Diószegi-e., Fejérdi-e.” (Soó GM. 83, Kv. 421, 664, Ny. Kv. 431), Ajton (Ny. I. c.), Kolozs (Soó Ky. 664), Korpád, Kis-kályán, Bonchida, Sz. jenő, Szék, Cege, Pujon, Vszt. egyed (Soó 114), Sz. újvái (K. & O. 3), Füzesmikola (Harg. II. 66), B. váralja, Szu. németi, Coptelke (Harg. III. 125, 130), Teke (Borza BCI. VIII. 26), M. vásárhely (Ny. Mv. 92)—Bádok, Kide, B. újfalu, Csoma-fája, Sólyomkő!, Bádok—Doboka, Moró—Tötör (Harg. I. 127, 129).

Glechoma hirsuta W. et K. resp. *G. hederacea* ssp. *hirsuta* Herm. — Kv. „Szénafű, Fejérdi-e.” (Soó GM. 83, Kv. 436), átmenet a *G. hederacea* L.-hez a *G. pannonicu* Borb. (tr. pann. Soó). Kv. „Szt. györgyh.” (Borb. in Kv. 436), Füzesmikola (Harg. II. 66), Sz. újvár (K. & O. 13).

Melittis melissophyllum L. — Kv. „Szénafű: Csúp, Fejérdi-e.” (Ny. Kv. 438, Soó, Harg. Ujv. Kv. 665), Dezmér „Puc”!, Dezméri-e., Ajton (Ny. I. c.), Kolozs (Freyn 99), Sz. újvár (K. & O. 17), Füzesmikola (Harg. II. 66), B. váralja, Szu. németi, Coptelke (Harg. III. 125—130), Bonchida—Szék, Iklód, Szék—Vszt. gothárd—Pujon—Cege Feketelak, Kis-kályán, Apahida, Korpád!, M. szilvás, Báld, P. kamarás (Borza BCI. VIII. 18, 22, 24), Kékes (Pr. Cp. 101), Bala—N. ercse (Ny. ap. Pr. Cp. 106), M. vásárhely (Ny. Mv. 80, ap. Pr. 107)—Bádok, Kide, — B. újfalu, Sólyomkő!, Bádok—Doboka—Moró (Harg. I. 128—9).

Galeopsis speciosa Mill. — Sz. újvár (K. & O. 12), Bonchida!, Teke (Borza BCI. VIII. 26)—Doboka—Moró (Harg. I. 128).

G. pubescens Bess. — Kv. „Előv.” (Soó GM. 96, Kv. 439), Szamosfalva (Soó GM. 106, Borb. ap. Ny. Kv. 479), Sz. újvár (K. & O. 12, Harg. II. 67), Bonchida, Cege, Vszt. gothárd, Pujon, Apahida, Kis-kályán, Korpád, Kolozs (Soó 115), M. ludas (Pr. Cp. 166)—K. borsai tanyák, Kide!

Lamium galeobdolon (L.) Nath. (*L. luteum* Huds.). — Sz. újvár (Pr. Cp. 100), Ördöngös füzes (K. & O. 12), Füzesmikola (Harg. II. 65), B. váralja, Szu. németi, Coptelke (Harg. III. 125—130), Iklód, Szék, Cege—Pujon, Vszt. egyed, Vszt. gothárd, Apahida, Kis-kályán (Soó 115), M. szilvás, M. ménes (Borza BCI. VIII. 18, 25), Kékes, Berkes, M. bánd (Pr. Cp. 101, 104—5), — Kide—M. derzsel!, Bádok—Doboka—Moró—Tötör (Harg. I. 127—9).

var. vulgare (Pers.) Briq. — Kv. „Fejérdi-e.” (Soó & Ujv. Kv. 665).

L. maculatum L. — Szamosfalva (Soó GM. 106), Sz. újvár (K. & O. 15), Bonchida, Iklód, Szék, Vszt. gothárd (Soó 115), P. kamarás, N. sármás (Borza BCI. VIII. 23, 26), Mócs (Pr. Cp. 109), Szabéd (Lengy. ap. Soó 115), M. vásárhely (Ny. Mv. 92)—Bádok—Doboka—Moró (Harg. I. 128—9).

Stachys silvatica L. — Kv. „Fejérdi-e.”, Dezmér „Puc” (Soó & Ujv. Kv. 665), Sz. újvár (Pr. Cp. 100), Ördöngősfüzes (K. & O. 24), Füzesmikola (Harg. II. 66), B. váralja (Harg. III. 127), Bonchida—Szék, Iklód, Korpád (Soó 115), P. kamarás (Borza BCl. VIII. 24)—Kide, B. újfalu, Csomafája!, Bánok—Doboka (Harg. I. 129).

S. officinalis (L.) Trev. köz., a var. *stricta* (Ait.) Rouy. — Kv. „Szénafű” (Borb. MNL. X. 117, Soó BK. XXIII. 157), Kiskályán „Kistelek”, Vszt. gothárd (Soó 115).

Salvia glutinosa L. — Sz. újvár (K. & O. 22, Pr. Cp. 100), B. váralja, Szu. németi, Cop-telke (Harg. III. 127—30), Vszt. gothárd (Janka Linn. 594), „Ombuzi malom” (Soó 115)—Kide „Biszóhegy” (Soó III. 140).

Satureia vulgaris (L.) Fritsch. — Kv. „Szénafű: Csúp, Fejérdi-e.” (Soó GM. 83, Kv. 446, Harg. in Kv. 665), Sz. újvár (K. & O. 9, Pr. Cp. 118), B. váralja (Harg. II. 125), Bonchida, — Szék, Iklód, Szék, — Vszt. egyed—Pujon, Kiskályán, Korpád!, Kékes, Mócs (Pr. Cp. 101, 109)—Kide, B. újfalu, Csomafája!

Origanum vulgare L. — Kv. „Szénafű: Gella, Előv., Csúp, Fejérdi-e.” (Soó GM. 83, 88, Ny. Kv. 447, Harg. in Kv. 665), Dezmér „Puc” (Soó & Ujv. Kv. 665), Sz. újvár (K. & O. 18), Füzesmikola (Pr. Cp. 109), Bonchida—Szék, Szék, — Vszt. egyed sib.: Mócs (Pr. Cp. 118)—Kide, B. újfalu, Csomafája!

Atropa belladonna L. — Ördöngősfüzes (K. & O. 5, Pr. Cp. 100).

Physalis alkekengi L. — Sz. újvár (K. & O. 19), Szék „Váné-berke” (Soó 115).

Scrophularia Scopolii Hoppe. — Kv. „Szt. györgyh., Szénafű” (Soó Kv. 666, Ny. Kv. 471). Kolozs, K. bós, Berkenyes, Virágosv. (Freyn 103), Cege, Vszt. gothárd (Soó 116). Báld, N. sármás (Borza BCl. VIII. 21—2), K. borsa, Csomafája!

S. nodosa L. (rendesen mint *f. glandulosa* (Schustler) Soó). — Kv. „Szénafű: Előv., Csúp, Fejérdi-e.” (Soó GM. 83, 96, Kv. 471, Harg. in Kv. 666), Kolozs (Soó Kv. 471), Ajton (Ny. l. c.), Sz. újvár (Harg. II. 67), B. váralja (Harg. III. 128), Bonchida, — Szék, Iklód, Szék—Vszt. egyed—Pujon, Vszt. gothárd, Korpád!, Báld, N. sármás (Borza BCl. VIII. 21—2), Vszt. iván (K. & O. 22)—Kide, — B. újfalu, Csomafája, Sólyomkő!, Doboka—Moró (Harg. II. 128).

Veronica officinalis L. — Kv. „Diószegi-e., Csúp” (Ujv., Harg. in Kv. 666), Ajton (Freyn 104), Korpád, Sz. jenő, Vszt. egyed—Pujon (Soó 116), Füzesmikola (Harg. II. 125), Szu. németi (130), Báld, Teke (Borza BCl. VIII. 26)—Kide—M. derzse, — B. újfalu! Bánok—Doboka—Moró (Harg. I. 128—9).

V. teucrium L. — Kv. „Szénafű: Előv., Kúph., Tekintő, Pokolköz, Csúp, Harmadv.” (Soó GM. 83, 88, Kv. 477, Ny. Kv. 477, Ujv. in Kv. 666, cf. Keller Scr. Mus. Transs. II. 88—9 cum *f. lasiocalyx* (Beck) Watzl), Szamosfalva (Soó Kv. 477), Dezmér „Puc” (Soó Kv. 666), Kolozs, K. bós (Freyn 104), K. kara (Richter ap. Ny. l. c.), Sz. újvár (K. & O. 26), Szék, Cege, Pujon, Feketelak (Soó 116), Bala-Pusztaalmás (Nyár. ap. Soó 116), Kékes (Pr. Cp. 144), Bazéd, Szabéd, Mojos, Toldalag (Lengy. ap. Keller l. c.)—Borsa „Őrhegy”, Bánok (Soó ap. Keller l. c., cum *f. lasiocalyx*), Borsai tanyák (!).

V. teucrium × *austriaca* (*V. Handelii* Watzl). — Kv. „Szénafű” (Borb., Soó ap. Keller 89).

V. hederifolia L. — Szamosfalva—Apahida (Ny. Kv. 473), Bonchida!, M. vásárhely· Hid-vég (Ny. Mv. 96).

Digitalis grandiflora Mill. — Kv. „Szénafű: Előv., Csúp, Fejérdi-e.” (Soó FK. 1927. 24, GM. 83, Kv. 479, Ny. Kv. 479), Dezmér „Puc” (Soó Kv. 666), K. bós, Ajton (Freyn 104), Gyulatelke (K. & O. 10), M. záh, Buza (Pr. Cp. 105, 145), Gerend (Ércsei 69), Apahida „Méneshágó”, Kiskályán „Somai-e”, Korpád, Iklód, Sz. jenő, Szék, Vszt. egyed, Pujon, Vszt. gothárd, Feketelak!—Csomafája!

Melampyrum bihariense Kern. ssp. *Kümmerlei* Soó. — Kv. „Jósikatanya” (Schm. ap.

Ny. Kv. 482—?), Bonchida—Szék „Csanafű” (nem typ.), Feketelak „Látódomb” (Soó 111) — ssp. *Römeri* (Ronn.) Soó. — Kv. „Szénafű: Csúp, Fejérdi-e.” (Soó Mon. Melampyrum in Repert, XXIV. 158, GM. 83, FK. 1927. 24, Ny. Kv. 481, Harg. in Kv. 666), Kolozs (Soó I. c.), — K. bós (Ny. I. c.), Dezmér „Puc” (! Ny. Kv. 481), Sz. újvár (Harg. II. 67), B. váralja (Harg. III. 128), Bonchida—Szék, Sz. jenő, Iklód, Szék—Vszt. egyed—Ombozelke—Pujon—Cege, Feketelak, Apahida, Kiskályán, Korpád!, M. szilvás, M. záh (Pr. Cp. 101—2, 146), P. kamarás, Teke (Borza BCI. VIII. 18, 26), Kékes, M. vásárhely (Ny. Mv. 98), Buza, Betien (Soó I. c.)—K. borsa, Bádok, Kide, B. újfalu, Csomafája, Sólyomkő!, Bádok—Doboka—Moró (Harg. I. 128—9) — t. *Nyárádyanum* Soó. — Kv. „Szénafű” (Soó BK. XXIII. 158), M. nyulas, Faragó, Bala, P. almás, Gerend (Ny. ap. Soó Mon. 159), Kékes (Prod. ap. Soó I. c.).

M. pratense L. ssp. *vulgatum* (Pers.) Ronn. — Kv. „Szénafű: Csúp” (Harg. in Kv. 666). Ajton (Freyn 105).

Pedicularis palustris L. — Montan elem. — Szénafű (Schur VSV. X. 105, Pr. ap. Ny. Kv. 487)?, Ajton (Freyn 105), K. bós (Pr. Cp. 139). A szintén montan *P. exaltata* Bess.-t — Janka (MTK. XII. 182) Vszt. ivánról közli.

Lathraea squamaria L. — Kv. „Fejérdi-e.” (Soó & Ujv. Kv. 667), Füzesmikola (Harg. II. 65)—Kide „Biszóh.”, Sólyomkő „Piatra”! (Soó III. 140).

Asperula odorata L. — Sz. újvár (Pr. Cp. 100), Ördöngösfüzes (K. & O. 5), Füzesmikola (Harg. II. 66), Szu. németi, Coptelke (Harg. III. 130)—Kide „Biszóh.”, Kide—M. derzse, Bádok—Doboka (Harg. I. 129).

A. rivalis Sibth. et Sm. — Kv. „Szénafű: Előv.” (Soó Kv. 496, 667, Borb. ap. Ny. Kv. 496), Vszt. gothárd (Soó 117).

A. tinctoria L. var. *intermedia* Simk. — Kv. „Szénafű: Előv.” (Simk. MNL. III. 51. Borb. MNL. X. 116, Soó Kv. 497), Apahida „Csuhá” (Soó Kv. 667), Iklód, Bonchida—Szék, Cege, Feketelak (Soó 116). A typust jelzik: Kv. „Szénafű: Gella, Előv., Tekintő” (Ny. Kv. 497), Sóspatak (Pr. Cp. 153), Apahida, Kolozs, K. ból (Freyn 96), V. szí. iván (Janka ap. Fuss VSV. XIX. 206), ezek az adatok is valószínűleg az előbbire vonatkoznak.

Galium vernum (L.) Scop. — Kv. „Szénafű: Előv., Morgó, Fejérdi-e.” (Soó GM. 83, Kv. 497, Ny. Kv. 497), Dezmér „Puc” (Soó Kv. 667), Apahida, Ajton (Ny. I. c.) Kolozs, K. bós, Berkenyes (Freyn 96), Füzesmikola (Harg. II. 66), B. váralja, Szu. németi (Harg. II. 125, 130), P. kamarás (Pr. Cp. 102), Bonchida, Iklód, Szék, Fekete-lak stb., M. vásárhely (Ny. Mv. 100)—Bádok, Kide—B. újfalu, Csomafája, Sólyom-kő!, Bádok—Doboka—Moró (Harg. I. 128—9).

G. Schultesii Vest. — Kv. „Csúp, Diószegi-e., Fejérdi-e.” (Soó GM. 83, Kv. 500, 667), Dezméri-e. (Pr. Flora II. 148), Dezmér „Puc”!, Apahida „Ménesh.”!, Ajton (Ny. Kv. 500), Kolozs (Soó Kv. 667), Sz. újvár (Pr. Cp. 100), Füzesmikola (Harg. II. 66), B. váralja, Coptelke (Harg. III. 125, 130), Bonchida, — Szék, Sz. jenő, Iklód, Szék, — Vszt. egyed—Ombozelke—Pujon—Cege, Feketelak, Vszt. gothárd, Kiskályán, Korpád!, M. szilvás, Báld, P. kamarás, M. ménes (Borza BCI. VIII. 18—25), Kékes, Mócs (Pr. Cp. 101, 119)—Kide, Bádok, B. újfalu, Csomafája, Sólyomkő!, Bádok—Doboka (Harg. II. 129) — var. *angustifolium* (Heuff.) Soó — Vszt. gothárd „Ombuzi malom” (Soó 117).

G. pseudoaristatum Schur. — Vszt. gothárd „Ombuzi malom-e.” (Soó 117)—Kide—M. derzse, Kide „Biszóh.”, Sólyomkő „Dümbrava”!, Doboka—Moró (Harg. I. 128, cf. Soó III. 140).

G. rubioides L. — Kv. „Szénafű: Előv., Tekintő, Pokolköz, „Fejérdi-e.”! (Schur VSV. X. 99, Soó GM. 83, Kv. 498, Pr. Cp. 136, Ny. Kv. 499, Wolff ap. Ny. I. c.), Apahida „Csuhá” (Pr. Cp. 143), Kolozs, K. bós, Berkenyes (Freyn 96), Sz. jenő, Iklód, Bon-

hida—Szék (Soó 117), Bala—N. ercse (Ny. ap. Pr. 106), M. vásárhely (Ny. Mv. 101)—K. borsa „Szilaj”!

**. pseudo-rubrioides* (Schur) Simk. — Kv. „Szénafű: Előv., Morgó” (Soó et Ny. Kv. 498!), K. bós (Ny. I. c.), Pujon, Korpád (Soó 117).

Adoxa moschatellina L. — Iklód „Hársastető” (Soó 117).

Dipsacus pilosus L. — Bonchida „Szamosliget” (Soó 117).

Knautia silvatica (L.) Duby. adatai (Sz. újvár (K. & O. 15 és Buza Pr. Cp. 145) bizonnyal tévesek.

Adenophora liliifolia (L.) Bess. — Kv. „Szénafű” (Baumgt. En. I. 149, Andrae XIII. 329, Schur En. 432, Wolff ap. Borb. MBL. III. 193 et f. *perpallens* Borb.), „Harmadv.” (Pr. Cp. 138, Joó ap. Borb. I. c. f. *stylosa* (Lam.) et f. *intermedia* (R. et Sch.). — Ujabban a Szénafűveken nem látták. — Kolozs (Bgt. I. c.), K. bós (Freyn 96, ap. Ny. Kv. 514 et f. *stylosa* (Lam.), Ajton (Freyn 96), Buza (Pr. MBL. XII. 126, Cp. 15, 145), Betlen (Pr. MBL. I. c.),

Campanula rapunculoides L. — Kv. „Fejérdi-e.” (Soó GM. 83, Kv. 516), Dezmér „Puc” (Soó Kv. 667), Apahida (Ny. Kv. 516), Kolozs (Freyn 95), Sz. újvár (K. & O. 7, 118), M. ménes (Borza BC. VIII. 25), Kékes (Pr. Cp. 144), Bonchida, Szék, — Vszt. egyed—Pujon, Vszt. gothárd, Apahida, Kiskályán, Korpád (Soó 117), Szabéd (Lengy. ap. Soó I. c.)—Bádok, Kide—B. újfalu!

C. trachelium L. — Kv. „Szénafű: Csúp, Fejérdi-e.” (Soó, Harg., Ujv. Kv. 667), Dezmér „Puc” (! Ny. Kv. 517), Kolozs, Berkenyes (Freyn 95), Sz. újvár!, Vszt. iván (K. & O. 7), Füzesmikola (Harg. II. 66), Szék, Kiskályán „Somai-e.”, Korpád (Soó 117), M. szilvás (Borza BC. VIII. 18), P. kamarás. Kékes (Pr. Cp. 101-2), Bazéd, Szabéd (Lengy. ap. Soó I. c.), Bala—N. ercse (Ny. ap. Soó I. c.)—Kide „Biszóh.”!

C. rotundifolium L. — Montan elem — Kv. „Szénafű: Morgó” (Ny. Kv. 518 f. *dentata* Schur), Kolozs, K. bós, Berkenyes, Virágosv. (Freyn 95), Ajton „Csolt” (Freyn 95 sub C. *Hecsti*, f. *graminifolia* Hrbv ex Ny. Kv. 518, Ny. I. c.), Sz. újvár (K. & O. 7 sub. C. *Scheuchzeri*), Kékes, Buza (Pr. Cp. 144, 181).

Ritka a Mezőség területén a *C. rapunculus* L. is, így Apahida (Ny. Kv. 517), Sz. újvár (K. & O. 7).

Phyteuma tetramerum Schur — Montan-praealpin elem. — Sz. újvár (K. & O. 19), Szék (Janka Linn. 583 sub. *Ph. spicato*).

Stenactis annua (L.) Nees. — Bonchida „Bánffy-park” (Soó 118), az igazi! További ligetlakó adventívek: *Solidago canadensis* L., ugyanott *S. gigantea* Ait. var. *leiophylla* Fernald (*S. serotina* auct.) — Szszt. miklós—Apahida (Soó 118).

Rudbeckia laciniata L. — Kolozsvár—Apahida (Soó BK. XXII. 73, Kv. 533, Bélteki, Richter, Ny. Kv. 533), Bonchida (Soó 118).

Inula helenium L.* — Kv. „Szénafű: Előv.” (Landoz I. 9, Soó GM. 96, Kv. 529, Bélteki, Ny. Kv. 529), Fejérd (Harg. in Kv. 668, Soó 118), Sz. jenő, Bonchida—Szék (Soó 118), Sz. újvár, — Kecsed (K. & O. 9), M. csúcs (Ny. ap. Soó 118)—Doboka—Moró (Harg. I. 128).

Antennaria dioica (L.) Gärtn. — Montan elem. — Kv. „Szénafű: Előv., Morgó” (Soó Kv. 528, 668, Richter etc. et. Ny. Kv. 528), Sz. újvár (K. & O. 4), Kiskályán „Kistelek” (Soó 118)—Kide „Biszóh.”!

Gnaphalium sylvaticum L. — Ajton (Freyn 89), Kékes (Pr. Cp. 101), Pókakereszter (Lengy. ap. Soó 118)—Kide—M. derzse!

Chrysanthemum corymbosum L. — Kv. „Szénafű: Előv., Pokolköz, Tekintő, Csúp, Morgó. Diószegi-e., Fejérdi-e. (Schur VSV. X. 103, Soó GM. 83, Pr. Cp. 137—8, Ny. Kv.

*) *I. oculus-Christi* L. Erdélyben nincs, szamosújvári (K. & O. 15) és mócsi (Pr. MBL. V. 32) adatai bizonnyal tévesek.

540, Soó Kv. 540, 668), Apahida „Csuhá, Ménesh.”, Dezmér „Puc” (! Ny. l. c.), Kolozs (Soó Kv. 668), Zsuk „Kesélyh.” (Ny. l. c.), Sz. újvár (K. & O. 21), Füzesmikola (Harg. II. 66), B. váralja (Harg. III. 125), Bonchida, — Szék, Sz. jenő, Iklód, Szék, — Vszt. egyed—Pujon, Feketelak, Vszt. gothárd, Kiskályán, Korpád!, M. szilvás (Borza BC. VIII. 19 sub var. *subcorymbosa*), P. kamarás, Báld, Mócs (Pr. Cp. 102, 146, 119), M. vásárhely (Ny. Mv. 117)—Bádok, Kide, B. újfalu, Sólyomkő! Bádok—Doboka—Moró (Harg. I. 128—9).

Petasites hybridus (L.) G. M. Sch. — A. gyéres, Gerend (Ercsei 118), Bonchida (Soó 118), M. szabad (Lengy. ap. Soó 118), M. vásárhely „Városberke” (Ny. Mv. 103) — Csomaafája „Dunga” (Soó III. 140).

P. albus (L.) Gárt. — Copielke (Harg. III. 130).

Doronicum hungaricum Rchb. — Pujon, Vszt. gothárd „Ombuzi malom” (Soó 118), Feketelak (Janka Linn. 577), M. záh (Wolff ap. Schur En. 340), Buza (Pr. MBL. XV. 257), Sóspatak—Monosfalu (Ny. ap. Pr. Cp. 98).

Senecio silvaticus L. — Cege „Tisztás-e.” (Soó 119), Kékes (Pr. Cp. 101).

S. viscosus L. — Kide—M. derzse! — Adventív a *S. vernalis* W. et K. — Szamosfalva (Ny. Kv. 547), kétes a *S. rupester* W. et K. (Schur VSV. X. 103, Soó GM. 98 csak Schur alapján) a kolozsvári Szénafüvekről.

S. umbrosus W. et K. — Kv. „Szénafű: Előv.” (Schur VSV. X. 103, Ny. Kv. 547, Soó Kv. 547, részben *tr. transiens* Nyár. l. c.), Kolozs, K. bós, Berkenyes, Virágosv (Freyn 90), Fejérdi-e., Sz. jenő, Feketelak „Látódomb” (Soó 118), Vszt. gothárd—Feketelak (Janka MTK. XIII. 177), V. ö. Ny. l. c., Soó 118. Miután a *S. doria*-val átmeneti alakok kapcsolják össze (ezekre illik Simonkai Erd. 329 „*S. Biebersteinii*” leírása), annak alfajául tekinthető, így a *S. doria* Nath. hazai alakköre: *typus*, *var. Biebersteinii* Lindem., *vr. resp. tr. transiens* (Nyár.) Soó, *ssp. umbrosus* (W. et K.) Soó.

→ *S. fluviatilis* Wallr. — Kv. „Szénafű: Előv.” (Soó GM. 96, Kv. 546), Szszt. miklós—Apahida (Ny. Kv. 546), „Kerektó” (Pr. Cp. 53, FER. 487), Bonchida (Soó 119).

→ *S. nemorensis* L. — Kolozs, Ajton (Freyn 89), Sz. újvár (K. & O. 23), Kékes (Pr. Cp. 101), Szabéd (Lengy. ap. Soó 119).

Erechtites hieracifolia (L.) Raf. — Kide—M. derzse (Soó III. 140).

→ *Echinops commutatus* Jur. et var. *eglandulosus* (Schur) Soó (*E. globifer* Janka), utóbbi csak Kv. „Szénafű” (Borb. ap. Ny. Kv. 550), Vszt. gothárd (Janka Linn. 582).

Carduus crispus L. — Dezmér „Puc”, Apahida „Ménesh.”!, Kolozs—K. bós (Ny. Kv. 555), Korpád, Bonchida — Szék, Vszt. gothárd (Soó 119), Sz. újvár (K. & O. 7), Gyöke—Sármás (Pr. Cp. 103)—B. újfalu, Csomaafája, Sólyomkő!

→ *C. personata* (L.) Jacq. — Kv. „Szénafű: Harmadv.” (Ny. Kv. 555) an vero?

→ *Cirsium oleraceum* (L.) Scop. — Kv. „Szénafű: Előv.” (Soó GM. 96—7, Ny. FK. 43), Ajton (Freyn 91), Szamosfalva—Apahida (Soó GM. 107, in Gragger Gedenkb. 250), Bonchida (Soó 119), Kékes (Pr. Cp. 78)—Kidei v., Biszóh.!

→ *C. rivulare* (Jacq.) All. és *C. erisithales* (Jacq.) Scop. csak a terület határán, pl. Ajton (Ny. Erd. Muz. 1941. 130, ill. Freyn 91), Pr. Cp. 152 „*C. decussatum*” adata (Zsuk) kétségtelenül a *C. furiens* Gr. et Sch.-re vonatkozik, utóbbi elterjedését l. Soó AGH. V. 173.

→ *C. oleraceum* × *canum*: *C. tataricum* (L.) All. — Kidei völgy!

Centaurea austriaca Willd., *C. indurata* Janka, *C. jacea* L. s. l., *C. scabiosa* L. s. l. alakkörei és hybridjei, v. ö. Ny. BK. 1943. 16—45, Kv. 560—588. Újabb mezősségi gyűjtésű Centaureáim már nem kerültek monografikus feldolgozásra. Kimondottan erdei C.-faj nincs.

→ *Lapsana communis* L. — Kv. „Szénafű: Csúp, Diószegi-e., Fejérdi-e.” (Soó, Harg. Kv.

- 669), Dezméri-e., Apahida „Ménesh.” (Ny. Kv. 588), Sz. újvár (K. & O. 15!), Füzesmikola (Harg. II. 66), Bonchida, — Szék, Cege, Pujon, Vszt. gothárd, Kis-kályán, Korpád (Soó 119), N. sármás, Teke (Borza BCl. VIII. 20, 26), M. vásárh. „Szt. annah.” (Ny. Mv. 104)—K.borsa!, Doboka—Moró (Harg. I. 128).
- Poseris foetida* (L.) Less. — Kv. „Szénafű: Csúp, Diószegi-e., Fejérdi-e.” (Schur VSV. X. 101, Soó GM. 84, Kv. 669), Ajton (Freyn 92, Ny. Kv. 588), Sz. újvár (K. & O. 4. Pr. Cp. 100), Mócs, Betlen (Pr. Cp. 119, 21), B. váralja, Szu. németi (Harg. III. 125—30), Kide, — B. újfalu, Sólyomkő! (cf. Soó III. 140), Bánok—Doboka—Moró—Tötör (Harg. 127—9).
- Ycelis muralis* (L.) Dum. — Sz. újvár (!), Füzesmikola (Harg. II. 67), B. váralja (Harg. III. 127), Bonchida, — Szék, Sz. jenő, Cege (Soó 120), P. kamarás (Pr. Cp. 102).
- actuca quericina* L. — Dezmér „Puc” (! Ujv. in Kv. 669), Dezméri-e., Apahida „Ménesh.” (Ny. Kv. 598), Korpád (Soó 120), Ördöngősfüzes (K. & O. 15), Bazéd (Lengy. ap. Soó 120)—B. újfalu „Nagyh.”!
- Chaixii* Vill. — Dezmér „Puc”!, Apahida „Ménesh.”!, K. bós (Ny. Kv. 598), Kolozs (! Freyn 93), Pujon, Vszt. egyed, Vszt. gothárd, Kiskályán, Korpád (Soó 120), M. ménés (Borza BCl. VIII. 25), P. kamarás (Pr. Cp. 102), M. kók (Andrae B. Z. XIII. 324)—K. borsa!
- Crepis nicaeensis* Balb. — Montan elem. — Kolozs, Virágosv. (Freyn 93), Korpád (Fr. ap. Ny. Kv. 600), M. vásárhely „Szt. annahegy” (Ny. Mv. 117).
- Hieracium pseudobifidum* Schur. — Füzesmikola (Harg. II. 66).
- H. maculatum* Schrank. — Sólyomkő „Dumbrava”!
- H. praeacurrens* Vuk. — B. váralja (ssp. *macrodiaphyllum* és *cupræacurrens* Z.), Szu. németi, Coptelke (Harg. III. 127—30). Valószínűleg idetartozik Borza (BCl. VIII. 22)
- H. caesium* Fr. adata: Báld.
- H. phaedrocheilon* Z. — B. váralja (Harg. III. 127).
- H. racemosum* W. et K. — M. szilvás (Borza BCl. VIII. 18).
- H. sabaudum* L. — Kolozs, Ajton (Freyn 95), Báld (Borza BCl. VIII. 22), Apahida „Ménesh.”!
- H. silvaticum* (L.) Grub. — Ajton (Freyn 94 sub *H. Schmidtii* —?), Mohaj (Janka Linn. 588), Báld (Borza BCl. VIII. 22), Kékes, M. szovát (Pr. Cp. 21). A Borsavidék már gazdag az *Euhieracium*-okban, v. ö. Soó Scr. Bot. Mus. Tr. II. 100—121, kül. a kidei Biszóhegy, Kide, Csomafája és Borsaújfalu között, itt *H. jablonicense* (Wol., *H. phaedrocheilon* Z. (ssp. *Nyárádyi* et ssp. *napocense* Prod.). *H. laevicaule* Jord. (ssp. *triviale* (Norrl.) Z., *crepidiforme* Nyár. et Soó, *aphyllum* Nyár. et Soó).
- H. aurantiacum* L. — Montan elem. — Kv. „Előv., Tekintő, Pokolköz” (Pr. Cp. 133. Ny. Kv. 606, Pr. Flora I. 1122), Szamosf.—Dezmér, „Puc” (Soó Scr. Bot. Transs. II. 104 ssp. *carpathicola* N. P. et ssp. *subkajanense* Z.), Ajton (Freyn 94).
- H. Blyttianum* Fr. (*aurantiacum* — *auricula*). — Kide „Biszóh.” (Soó I. c. 105).
- H. tuscum* Vill. (*aurantiacum* — *auricula*). — Kv. „Tekintő” (Ny. Kv. 608).

A Mezőség florisztikai irodalma.

- Andrae, K. J.: Beiträge zur Kenntnis der Flora des südlichen Banats, der Banater Militärgrenze und Siebenbürgens. Botanische Zeitung XI. (1853), XIV. (1855). folytatásokban (Andrae B. Z.).
- Baumgarten, J. Ch. G.: Enumeratio stirpium Magni Transsilvaniae Principatui prae-primis indigenarum in usum nostratum botanophilorum conscripta, inque ordinem sexuali-naturalem concinnata. Wien I—III. 1816, N.-szeben IV. 1846. (Baumg.)

- Borbás V.*: Erdély flórájának kis pótléka. M. N. L. X. 1886. 113.
 — Biológiai közlemény. Orvos-természett. Ért. Kolozsvár, 1899. 240.
 Borbás több monografikus munkája tartalmaz egyes mezősségi adatokat
- Borza, A.*: Materiale pentru studiul ecoiologic al Câmpiei. Bul. Grad. Bot. Cluj VIII. (1928). 10. (Borza.)
 — Botanic excursion through the Câmpie. Guide de la VI. I. P. E. 1931. 196.
 — Câmpia Ardealului. Studiu geobotanic. (Contr. Botan. din Cluj II. No. 9.) 1935.
 — *Studii botanice in Câmpie Ardealului. Transilvania. 1920. 74.
 — Câteva notiuni de fitcsociologie. Soc. de maine I. (1924) 324.
 — *Climaxes and Succession in the Câmpia of Roumania. Carnegie Inst. Yearbook, 1926—27.
- *Enculescu, P.*: Antestepa din Câmpia Ardealului. Revista Pădurilor. LI. (1939) 255.
- Brassai, S.*: Botanische Misellen aus Siebenbürgen. Flora XXI. (1838). 305.
 — Egy pár kis curiosum. M. N. L. 1877. 129.
- Buja S.*: Adatok Erdély halophyton formációjának kialakulásához. Diss. Kolozsvár, 1914
- Bujorean, Gh.*: Zwei extreme Standorte bei Cluj. Veröff. Geobot. Inst. Rübel X. 145.
- Ercsei J.*: Nemes Torda vármegye flórája. Kolozsvár, 1842. (Ercsei.)
- Czetz A.*: Azon növények névlajstroma, amelyeket én kaptam és száritottam 1850-től fogva. Erd. Muz. Egyl. Évk. VI. 10.
- Freyn J.*: Az 1871—73. évben Magyarország keleti részeiben gyűjtött növények jegyzéke
 Közli Borbás V. Math. Termtud. Közl. XIII. (1876), 65. (Freyn.)
- Fekete L. és Blattny T.*: Az erdészeti jelentőségű fák és cserjék elterjedése a magyar állam területén. I—II. Selmechbánya, 1913.
- Fuss, M.*: Flora Transsilvaniae excursio. Nagyszeben, 1866
 (Egy-két adat más dolgozataiban is.)
- Ghisa, E.*: Cercetări asupra as. Stipetum stenophyllae cu Danthonia calycina în Transilvania centrală. Bul. Grd. Bot. Cluj XXI. (1941). 56.
- Statiunile cu Nepeta ucranica L. in România. Bul. l. c. XXII. (1942). 63.
- Hargitai Z.*: Adatok a Szamosvidék növényzetének ismeretéhez. (II.) Scripta Bot. Mus. Transs. I. (1942) 122. — III. — l. c. II. (1943) 64.
 — Bálványosváralja és környékének növényzetéről. Scripta ... III. (1944) 122.
- Hayek, A.*: Die Pflanzendecke Oesterreich-Ungarns. I. Wien, 1916. (Hayek.)
- Janka, V.*: Adnotationes in plantas dacicas nonnullasque alias europaeas. Linnaea XXX. (1859). 549. (Janka Linn.)
 — Adatok Magyarhon délkeleti flórájához. Math. Termtud. Közl. XII. (1876). 153. (Janka MTK. XII.)
 — Correspondenz Ö. B. Z. IV. 188, 403. — V. 229. — VI. 362. — VIII. 365. — XII. 293. — XVIII. 168, 231, 265, 297 (1854—68).
 — Eine für die Flora von Siebenbürgen neue Pflanze. Ö. B. Z. V. (1855) 60.
 — Anthemis Haynaldi Janka Ö. B. Z. VI. (1856). — Stipa Lessingiana und S. Graffiana Ö. B. Z. XVIII. (1868). 339. — Iris humilis M. B.? Ö. B. Z. XVIII. 376. (1868).
 — Ein für die Österreichische Monarchie neues Gras. Ö. B. Z. XIII. (1863) 364.
- Jávorka S.*: Magyar Flóra. Budapest, 1924—5.
- Keller, R.*: Wildrosen aus der Tátra. Bul. Grad. Bot. Cluj VI. (1926). 1.
- Kovrig, S. és Ornstein J.*: Index Floraë Szamosújváriensis. Szamosújvár, 1899. p. 31 (K. & O.)
- Landoz J.*: Névsora a Kolozsvárt termő növényeknek, melyeket több évi vizsgálódásai

*-gal jelzett dolgozatokhoz nem juthattam hozzá.

alapján összegyűjtött s a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1844. évi szept. 2-án Kolozsvárt tartott nagygyűlésének bemutatott. Kolozsvár, 1944 p. 18. (Landoz i.)

— A kolozsvári és szomszéd határon termő növények névsora, húszévi vizsgálódás után. Kolozsvár, szept. 1860. — Erd. Muz. Egy. Évk. II. (1860) 26.

Meusel, H.: Die Vegetationsverhältnisse der Gipsberge im Kyffhäuser und im südlichen Harzvorland Hercynia II. (1939). 1. (Kül. 297—305.)

Morariu, I.: Asociatii de plante antropofile din jurul Bucurestilor cu observatii asupra raspandirii lor in tara si mai ales in Transilvania. Bul. Grad. Bot. Cluj XXIII. (1943) 131.

Nyárády E. Gy.: Marcsvásárhely és környékén élő tavaszi és nyárcsedi növények határozója. Marosvásárhely, 1914. (Ny. Mv.)

— A Kolozsvári Szénafüvek suvadásos területeiről. Földr. Közl. 1941. 40. (Ny. FK.)
— Kolozsvár környékének mocsárvilága. Erdélyi Múzeum, 1941. 105. (Erd. Tud. Füzetek, 125 sz.)
— *Centaurea ruthenica* nu a dispărut din flora Transilvaniei. Bul. Grad. Bot. Cluj III. (1923) 85.
— és Soó R.: Kolozsvár és környékének flórája. 1—9. Kolozsvár, 1941—44. (Ny. Kv.) (Néhány adata a Bul. Grad. Bot. Cluj-ban megjelent dolgozatokban, így: Despre grupa Auricomus a genului Ranunculus. XII. (1932). 85.)
— Új adatok Kolozsvár flórájának bővebb ismeretéhez. Bot. Közl. XXXVIII. (1941). 130.
— Kelozsvár környékének ibolyái. Borbásia III. (1942). 90.
— Adatok a hazai *Centaureák „Jacea”* és „Phrygia” csoportjainak bővebb ismeretéhez, különös tekintettel Kolozsvár környékének flórájára. Bot. Közl. XL. (1943). (Egyes adatok más, a kolozsvári flóraművel egyidőben megjelent kisebb közleményekben is.)

Prodan Gy. (J.): Erdélyben, különösen a Mezőségen előforduló néhány ritkább növény lelőhelye. MBL. V. (1906). 32.

— Adatok Magyarország flórájához. MBL. XII. (1913). 124.
— Néhány adat hazánk flórájának ismeretéhez. MBL. XV. (1916). 321.
— A sármási földgázterület és környékének nyári flórája. Földr. Közl., 1914. 312.
— Flora pentru determinarea si descrierea plantelor ce cresc in România. I. II. Kolozsvár, 1923. 2. kiadás I. 1. 2. Kolozsvár, 1939—40 — II. 1944. (Pr. Flora.)
— Flora Câmpiei Ardelene. Bul. Acad. Agric. No. 2. (1931). Kolozsvár, p. 286. (Pr. Cp.)
— Conspectul sociologic si sistematic al florei aquatice si palustre din România. Bul. Acad. Agric. IV. (1933). 158.

— Plante din România. Bul. Grad. Bot. Cluj XVI. (1936). 85.
— *Menthae novae Romaniae et Jugoslaviae*. Bul. Grad. Bot. Cluj V. (1925). 103. (További adatok Achillea, Centaurea, Iris és Rosa monografiáiban.)

Pax, F.: Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Karpathen. I. II. 1898, 1908.
Péch D.: Adatok az erdélyrészti Mezőség flórájához. Englers Bot. Jahr. L. (1914). 32.

Péterfi M.: Adatok Erdély flórájához. MBL. XVII. (1918). 58.

Safta, I.: Contributiuni la studiul fitosocial agricol ai fânetelor din județul Cluj. Anal. Inst. Agronom. României. VIII. (1936). 299.

Schur, F.: Über Bulbocodium edentatum Schur Verh. Sieb. Ver. f. Naturw. II. 165, III. 117. V. 84, IV. 53. — Plantago Schwarzenbergiana VI. 3. — Centaurea Schwarzenbergiana VI. 4. (1853—57).

— Zur Flora Siebenbürgens. ÖBZ. X. (1860). 248, 324.

— Bericht über eine botanische Reise durch Siebenbürgen. V. Klausenburg, vorzüg-

- lich die Heuwiese. VI. Die Mezőség. Verh. Sieb. Ver. Natur. X. (1859). 96, 137. (Schur VSV.)
- Enumeratio plantarum Transsilvaniae. Wien, 1866. (Schur En.)
 - Phytopgraphische Mitteilungen. Verh. Naturf. Ver. Brünn, XV. (1877), p. 200. (Egy-két adat az ÖBZ. és Verh. Naturf. Ver. Brünn további kötetéiben.)
- Simonkai (Simkovics) L.*: Adatok Kolozsvár és Torda vidékének flórájához. MNL. II. (1878). 145. — Pótadatok ... III. (1879). 49.
- Erdély edényes flórájának helyesbitett foglalata. (Enumeratio Florae Transsilvaniae critica). Budapest, 1887. (Simk. En.)
 - (Adatok egyes monografikus munkáiból is.)
- b. Soó R.: Kritikai megjegyzések a magyar flóra ismeretéhez. I—III. Bot. Közl. XXII. (1925) 64, II. XXIII. (1926) 146, III. XXV. (1928) 133.
- Kolozsvár geobotanikája. Földr. Közl., 1927. 15.
 - Geobotanische Monographie von Klausenburg (Kolozsvár). Debrecen, 1927. p. 152. (Soó GM.)
 - Beiträge zu einer kritischen Adventivflora des historischen Ungarn. Bot. Archiv XIX. (1927) 349.
 - Zur Nomenklatur und Methodologie der Pflanzensoziologie. („Gragger Gedenkbuch Berlin“, 1927. 234.)
 - A magyar vizek virágos vegetációjának rendszertani és szociológiai áttekintése. I—IV. Magy. Biol. Int. Munkái. II. 45, VII. 135, VIII. 233, X. 174. (1928—1938)
 - Az Erdélyi Medence endemikus és reliktum növényfajai. Acta Geobot. Hung. V. 141. (Soó AGH.)
 - + — Adatok a Mezőség növényzetének ismeretéhez. Scripta Bot. Mus. Transs. III 1944, 100. (Soó.)
 - Az Eurotia ceratoides Erdélyben. Scripta ... III. (1944) 139.
 - Additamenta ad cognitionem generis Hieracium in Hungaria. Scripta ... II. (1943) 100. (További adatok monografikus munkáiból: Melampyrum, Rhinanthus, Orchideae stb.)
- i. Nyárády E. Gy.: Kolozsvár és környékének flórája. A pótlások (1944. 643—69) nagyrészről Soótól. (Soó Kv.)
- Sternheim K.: Übersicht der Flora Siebenbürgens ... Diss. Wien, 1846.
- Szakmáry F.: Floristikai tanulmányok a szabédi m. kir. erdészeti kísérleti telepen. Erdészeti Kísérletek VII. (1905). 115.
- Wagner J.: Újabb adatok hazánk flórájához. Természett. Közl. Pótf. 1900. 281.
- Walz L.: Delphinium fissum Kolozsvár vidékén. MNL. I. (1877). 130.
- Wolff G.: Jegyzéke néhány Torda környékén előforduló ritkább növények. MNL. I (1877). 56.
- Pflanzen aus der Umgebung von Klausenburg. VSV. II. (1851). 175.
- Winkler, M.: Reise nach südlichen Ungarn und Siebenbürgen. ÖBZ. XVI. (1866). 20, 44