

AZ ERDÉLYI MEZŐSÉG FLÓRÁJA
PRODROMUS FLORAE REGIONIS MEZŐSÉG
(TRANSILVANIAE CENTRALIS)

AUCTORE

Prof. Dr. R. de SOÓ

EDITIO INSTITUTI BOTANICI
UNIVERSITATIS DEBRECEN

DEBRECEN, 1949

Bevezetés.

A mezőségi flóra kutatásának története nagyrészt egybeesik a terület nyugati szegélyén fekvő nagy kulturális központnak, Erdély fővárosának, Kolozsvárnak botanika-történetével. Bizonnyal az egész világ növénytani irodalmában Kolozsvár és környékéről rendelkezünk a legrészletesebb helyi flóraművel (Nyárády-Sóó), ennek a városnak erdői, mezői majd másfelére virága tették e mű szerzőjét egész életére a virágok kutatójává. A róla írt növényszociológiai monografiában először kíséreltem meg vázolni a flórakutatás történetét (p. 10—14), később Györfi István (Szegedi róvások p. 27—44) és Nyárády E. Gyula (Kolozsvár... flórája p. 1—25), végül újra magam foglaltam össze a botanika 130 évét Kolozsvárott (Kolozsvári Szemle, 1943. 233—243). E helyen épp ezért részleteiben a fenti dolgozatokra utalok, amelyek közül a legutolsó részletes irodalmi utalásokat tartalmaz a Mezőséget kutató floristák életrajzaira vonatkozólag is. A következőkben csak röviden foglalom össze különösen a Mezőség többi részeire vonatkozó kutatások történetét.

Az alapvető első erdélyi flóramű szerzője J. Ch. G. Bauernfeind (1756—1843), a Szászországból jött segesvári orvos 1813 nyarán érinti a Mezőség nyugati szegélyét, ő gyűjt először a Szénafüveken, Kolozs, Désakna és Torda sós talaján.*

Kolozsvár Szénafüveinek páratlan virágompajú kaszálói s a „Koporsók“ keleti sztyepnövényzete a 40-es évektől kezdve a kutatók hosszú sorát vonza ide, így Brassay Sámuel, kézdiszentlélei Kováts Gyula (később geológus professzor), Nagy Péter püspök, bágyi Jóó István orvostanár, Bélteki Ferenc orvos, de maga Haynald Lajos érsek, az erdélyi füvészet nagy mecénása is. Kolozsvár flóráját elsőnek a francia származású Landoz János (1793—1866) írja meg (1844, majd 1862), neki köszönhető a scientia amabilis első felvirágzása Kolozsvárott.

Torda megye flóráját jószándékú, de kezdetleges s ma alig használható flóraműben téglási Ercesei József (1792—1868) erdőmérnök-táblabiró állítja össze (1844), de Torda és környéke virágkincseit igazában Wolff Gábor (1811—1892) gyógyszerész kutatásai tárgyal fel. Míg a közelí Tordai-hasadékban jóformán minden számottevő erdélyi és magyar florista gyűjt s az eredményeket kor-szerű, részletes monográfia foglalja össze (Nyárády 1938),

* Schür idézetei szerint már J. R. v. Lerchenfeld (1753—1813), az Erdélyi flórakutatás úttörője is gyűjtött Kolozsvárott, de erről közelebbi adataink nincsenek.

Kiadásért felelős : Dr. Soó Rezső.

Alföldi Nyomda N. V. Debrecen. 1949-1480.

Műszaki vezető : Kovács Mihály

addig Torda környékéről máig sincs összefoglaló helyi flóránk, bár legutóbb a tordai sósfürdők növényzetéről T o d o r kezdett részletes enumerációt (1946).

K. J. A n d r a e (1816—1885) bonni palaeontológus professzor 1851-ben jár Erdélyben, W o l f f adatai mellett értékes új megfigyeléseket közöl Kolozsvár és Torda környékéről, ugyanott jár, majd Désen át a Radnai-havasok felé veszi útját a hires Rundreisen (1853), a sokat alkotó és sokat támadott F. S c h u r (1799—1878) is. S c h u r elsőnek ismeri fel a Mezőség egykor erdőterület jellegét, de erről senki sem vesz tudomást. Területünk több jellemző, bennszűlött vagy reliktum faját is ő fedez fel. De a Mezőség igazi füvésze bulcsı J a n k a V i k t o r (1837—1890), korábban császári lovas-tiszt, később Budapesten a múzeumi növénytár őre, maga is mezősségi (Vasasszentgothárd) birtokos.* Fiatalkor nagyobb dolgozatában (1839) és később a Mezőség sok keleti virágára hívja fel a figyelmet, vitázó cikkei sok kérdést tisztáznak. M. W i n k l e r látogatásánál (1865) jelentősebb J. F r e y n (1845—1903) — akkor az épülő magyar keleti vasút főmérnöke — rendszeres gyűjtései a 70-es évek elején, neki köszönhetjük a Mezőség nyugati szegélye (Kolozsvártól Tordáig) alapos kikutatását. C z e t z A n t a l (1801—1865) — a botanikának elői egykor kereskedő — adatai máig is jóformán egyedüli források Dés és környéke növényzetéhez.

B a r t h J ó z s e f (1833—1914) hosszúaszói lelkész ez időben jár területünkön, elsőíben futólag B o r b á s V i n c e is, majd S i m o n k a i L a j o s (1851—1910), azidőben nagyváradi, majd aradi tanár, hogy megalapozza élete főművét, Erdély flórájának kritikai feldolgozását (1887). Az első hatvan év gyűjtő tevékenységek megbízható összegezése a jeles mű területünkre vonatkozólag is. Utána egy ideig elcsendesül a mezőségi florisztika — K o v r i g S i m o n és O r n s t e i n J ó z s e f (1829—1912, valódi neve Pappenheim S.) ny. őrnagy szamosújvári enumerációja elavult nomenklaturájával helyi jelentőségű —, hogy R i c h t e r A l a d á r (1868—1927) — a physiologiai anatómia kiváló művelője, egyben nagyszerű szervező, a kolozsvári gyönyörű új botanikus-kert és múzeum megalapítója —, majd még inkább B o r b á s V i n c e (1844—1903) professzurájával (1899, ill. 1903) új életre keljen. Richter munkatársaival (B i h a r i Gy., F u t ó M., G á y e r Gy., G y ö r f f y I., P á p a i J., P é t e r f i M., U z o n y i F., Z s á k Z.) Kolozsvár környékén intenzív gyűjtőmunkába kezd. Borbásnak, a legeredetibb és legmunkásabb magyar füvésznek élte alkonyán már csak két év jut Kolozsvárott, itteni gyűjtései javarészt feldolgozatlanul maradtak s gyűjteményével elpusztultak.

A századfordulón és századunk elején ismét sokan jönnek idegenből is Kolozsvár Szénafüveire (R i c h t e r L a j o r, E n t z G é z a és M a r g i t, W. G u g l e r, A. v. H a y e k, Bécs és F. P a x, Breslau, nagynevű professzorai is). Ez időben kezdi közölni mezősségi adatait a kékesi származású J u l i u P r o d a n (1875—),

* 1944-ben még volt alkalmam látni Vasasszentgothárdon egykor kúriáját s elhanyagolt sírhalmát.

korábban zombori gimn., majd kolozsvári gazdasági akadémiai, ill. egy. tanár, a legtermékenyebb román botanikus, aki később nemcsak Jávorka után készült határozókönyveiben, de terjedelmes mezőségi flórájában nagyszámú, de sokszor bizonytalan adatot sorol fel. P é t e r f i M á r t o n (1875—1922) a Mezőség legszebb endemizmusának (*Astragalus Péterpii*) és Magyarszovát gazdag sztyep-növényzetének felfedezője. A bryologus G y ö r f f y I s t v á n professzort (1880—), Richter utódját, a mohában szegény táj — úgy látszik — kevessé vonzza.

Az I. világháború előtt (1913) jelenik meg N y á r á d y E. G y u l a tanár, marosvásárhelyi határozókönyve, amely — sajnos csonka marad (tavaszi-nyárelői flóra), korábban csak B a r t h és B a r a b á s J ó z s e f ref. lelkész szolgáltatnak a székely főváros flórájához (v. ö. Székelyföld flórája)*

A háborús években, diákkoromban, megkezdett kolozsvári geobotanikai monográfia tartalmazza a Mezőség növényszövetkezeteinek első szociológiai elemzéseit, amelyek ma már meghaladottak. De Kolozsvár flóráját s annak kritikai revízióját nagyszámú adattal gyarapította ezidőbeli (1917—1925) munkám, amelynek további célja lett volna, a városnak és a Mezőségnek florisztikai feldolgozása. Így ennek a munkának első szövege 1927-ben ugyancsak elkészült (az Erdélyi Irodalmi Szemle számára), de nem látott napvilágot.**

Magam 1923 óta több alkallommal kifejtettem a Mezőség növénytakarójának genezisére vonatkozó nézeteimet, hasonlókat vallott A. B o r z a, a kolozsvári egyetem új román professzora is, aki néhány mezősségi erdőt felvitélezett.

B o r z a különben csak a Mezőség déli, erdőtlenebb táját tekinti újabb dolgozataiban növényföldrajzilag Mezőségnak. N y á r á d y nemcsak Kolozsvár térségében kutat, de a terület nyugati és déli felében is gyűjt, adatai nagyrészt itt látnak napvilágot. Kolozsvár környékének florisztikai és geobotanikai megismerését gyarapítják B o r z a munkatársai, mint B u j o r e a n, G h i s a, M o r a r i u, — külölföldi látogatók, különösen H. M e u s e l, H a l l e, aki rövid, de teljáló képet rajzol a Szénafüvek növényzetéről. P r o d a n „Flora Câmpiei Ardelen“ c. könyve nem floramű, hanem a Mezőség „növényformációinak“ a régi ökológiai növényföldrajz szellemében történő leírása, hasonlóak Románia növényföldrajzát tárgyaló utolsó könyvének (1944!) idevonatkozó részletei.

A Mezőség flórájának előmunkálatai a Magyar Floraművek számára az irodalom és saját korábbi gyűjtésem alapján már majdnem nyomdakészen voltak, amidőn 1940—44-ben újra alkalmam nyilt Kolozsvárról a terület kutatására, amiről a Scripta Bot. Mus. Transs. III. (1944) számoltam be. E négy év legfontosabb programja volt Kolozsvár távolabbi környékének és a Mezőségnek korszerű növényszociológiai feldolgozása, amelynek eredményei előzetes közhelyen formájában már megjelentek, valamint az erdők és halophil növényszövetkezetek részletes elemzései, a továbbiak sajtó alatt.

* Jelentéktelenek a szabédi erdészeti kísérleti telepről megjelent közlemények (P é c h, S z a k m á r y).

** A kézirat mint megjelenés alatt álló, idézve Geobot. Mon. p. 143.

kai feldolgozásának első részeként az Erdélyi Medence bennszülött és reliktumjellegű pusztai növényfajainak adatait és areatérképeit állítottam össze (1943), majd — a táj erdős-sztyep jellegének igazolására gazdag bizonyító anyagként — a jellegzetes erdei és részben erdős-sztyep fajok felsorolását közöltem (1946). Ez években munkatársaim, doktorandusaim — különösen U j v á r o s i M i k l ó s és C s ū r ö s I s t v á n (Szamosvölgy növényszociológiai feldolgozása), leginkább pedig H a r g i t a i Z o l t á n, aki a terület északnyugati szegélyén önállóan kutat, gyarapítják a Mezőség flórájának ismeretét is.

A felszabadulás után nemcsak a mintegy 800 szociológiai felvételt dolgoztam fel, de a flóramű korábbi kéziratát teljesen átdolgozva, az újabb irodalommal és saját jegyzeteimmel kiegészítve, immár harmadik szövegezésében bocsátom nyomdába. N y á r á d y és L e n g y e l G é z a — aki még a 10-es években gyűjt Szabéd körül — korábban rendelkezésemre bocsátott jegyzeteit nem teljesen használtam fel, mert a háborús események következtében elvesztek, mielőtt minden adatukat kiértékelhettem volna (az érdekesebbeket már a Scripta 1944 cikk hozta), ugyancsak feldolgozatlan maradtak 1944 augusztusi gyűjtéseink. G h i s a n a k, a Szénafüvek rezervációiról megjelent dolgozata a kézirat lezártáig többszöri kérésemre sem jutott el hozzáim.

Kezdeményezésemre dolgozta fel Kolozsvár környékének moha-vegetációját B o r o s Á d á m (inedit.), egyébként virágosanok szempontjából területünk még — Kolozsvár környékétől eltekintve — elég kevessé ismert.

H e l y k i m é l é s végett két előző (AGH. 1943 és Erd. Kis. 1947) dolgozatomban részletesen tárgyalta fajoknál csak a lelőhelyek felsorolását a dom az idézetek nélküli, amelyek a kérdéses közleményben megtalálhatók, az ott fel nem vett, a terület szegélyére vonatkozó, vagy újabb adatokat itt pótlom.

Mindazokat, akik e munkámban segítségemre voltak, illesse e helyről is őszinte köszönet. Elsősorban kolozsvári munkatársaimat, akitől H a r g i t a i Z o l t á n a fasiszta háborús őrület vitte korai halálba.

A Mezőség kevert lakosságú táj, románok, magyarok, németek lakják. Flórájának kutatásában is kivette részét Erdély három nemzete. Ma ismét román fennhatóság alatt áll. A helyneveket e magyar nyelven írt mű természetesen magyarul közli, de magyar-román helynévtár lehetővé teszi, hogy egyaránt használhassa a közös és egyformán szeretett haza, Erdély, minden kutatója, a természet minden barátja. Miként annyi félreér té és küzdelem után egymásra talált a két szomszéd nemzet a népi demokrácia testvéri szeretetében és együtt épít a szocializmus felé az utat, úgy találjanak egymásra a román és magyar természetbúvárok a tudomány és népeik szolgálatában.

Debrecen, 1949 május.

Dr. Soó Rezső.

A flóra jellemzése.

A mezőségi flóravidék (*Praerossicum*) fogalmát a történelmi Magyarországról készült florisztikai növényföldrajzi beosztásomban (1930) és flóratérképemen (1933) vezettem be. Azota számos dolgozatomban bő vittem és korszerűsítettem azt a jelemzést, amelyet e táj florisztikai, fejlődéstörténeti és szociológiai növényföldrajzáról már első kolozsvári monografiámban (1927) adtam.

A Mezőség az Erdélyi Medence északi felének e r d ő s-s z t y e p t ájá. Földrajzi, történelmi, természettudományi munkák kölönböző területet jeleznek e néven, általában a Kis-Szamos, Nagy-Szamos, Beszterce-Szászrégen, Maros és Aranyos, végül a Torda-Kolozsvár vonalaktól közbezárt mintegy 5000 km² kiterjedésű lankásvidéket nevezik így. A Mezőség határvonalainak kérdéséről ugyancsak több közleményünkben megleküztünk (v. ö. H a r g i t a i Scr. Bot. Mus. Transs. I. 130, II. 64, S o ó ugyanott III. 100, 134, Erdészeti Kis. 1946. 261—2, 1947. 55). A növényföldrajzi Mezőség, a *Praerossicum*, nyugaton átlépi a Kis-Szamost (itt alakult ki egyik legjellegzetesebb és legimerőbb darabja, a Kolozsvári Szénafüvek) Kajántó-Kolozsborsa-Kecsed-Désakna vonaláig, délen a Marost és Aranyost is. Magam flóratérképemen délnyugat felé kiterjesztettem a *Praerossicum* határát, hogy az magába zárja egyes ritka sztyepnövények (mint *Polygala sibirica* (Szászcsanád), *Haplophyllum suaveolens*, *Scutellaria supina* (Csombord) stb.) termőhelyeit is, viszont B o r z a (1944) csak a fentemlített terület déli részét, Apahida-Vasasszentgothárd-Teke-Szabéd-Marosludas-Torda között tekinti annak. Az Erdélyi Medence bennszülött és reliktum jellegű pusztai fajaival és azok elterjedésével fogalkozva (1943), a kapott area térképek alapján nem lehetett kielégítően megrajzolni a *Praerossicum* határát, az ott tárgyal 32 faj közül 13 van olyan, amelyek nem, vagy alig lépik át a *Praerossicum* délfelé általam kiterjesztett határát (a *-gal jelöltek a fent megadott Mezőséget sem): **Colchicum bulbocodium*, *Iris humilis*, **Paeonia tenuifolia*, **Adonis volgensis*, **Potentilla tuberosa*, **Astragalus Péterpii*, *A. transsilvanicus*, *Peucedanum latifolium*, **Ajuga oblongata* (kétes), **Nepeta ucranica*, **Centaurea ruthenica*, *C. trinervia*, **Scorzonera hispanica* ssp. *strictiformis*, a fent jel zett három viszont csak attól délnyugatra él. A többi, tehát a fele másutt is terem az Erdélyi Medencében, főleg a marosvidéki flórájárásból (M a r u s i c u m), köztük több bennszülött vagy subendemikus erdélyi faj (*Salvia transsilvanica*, *Cephaelaria radialis*), vagy jellemző pontusi sztyepnövény (*Crambe tataria*, *Peucedanum lauricum*, *Plantago cornuta*, *Serratula coronata* etc.). Ezzel szemben nagy azoknak a montan vagy zárt erdei (*Fagion* és *Fraxino-Carpinion* fajok) növények száma, amelyek a Mezőségen honosak, ezek elterjedéséről I. Soó 1946. A Mezőség 1275 edényes

fajából 30 fa, 36 cserje, 270 erdei növény, a páfrányok száma 8. Határozottan montan, sőt részben praecalpin jellegűek : *Alnus incana* (a szegélyeken), *Ulmus scabra*, *Sorbus (aucuparia, torminalis)*, *Prunus padus*, *Acer (platanoides, pseudo-platanus)*, *Tilia (argentea, platyphyllos)*, páfrányok (*Cystopteris filix-fragilis*, *Dryopteris Linnaeana*, *D. phegopteris*, *D. filix-mas*, *Athyrium filix-femina*, *Polypodium vulgare*), *Sieblingia decumbens*, *Festuca ovina* ssp. *vulgaris*, *Carex transsilvanica*, *Allium ursinum*, *Orchis maculata*, *Traunsteineria globosa*, *Coeloglossum viride* (egykori), *Aristolochia pallida*, *Polygonum bistorta*, *Scleranthus uncinatus* (*subalpin!*), *Trollius europaeus*, *Cimicifuga europaea*, *Aconitum moldavicum*, *A. variegatum*, *Delphinium Simonkaianum*, *Ranunculus lanuginosus*, *Dentaria glandulosa*, *Alchemilla vulgaris*, *Lathyrus Hallersteinii*, *Oxalis acetosella*, *Daphne cneorum*, *Epilobium palustre*, *Cicuta virosa*, *Pyrola rotundifolia*, *Monotropa hypopithys*, *Gentiana praecox*, *Atropa belladonna*, *Pedicularis palustris*, *Lathraea squamaria*, *Asperula rifulis*, *Adoxa moschatellina*, *Dipsacus pilosus*, *Adenophora liliifolia*, *Phyteuma tetramerum*, *Antennaria dioica*, *Petasites albus*, *Carduus personata*, *Hieracium aurantiacum*, számos Euhieracium és általában sok olyan erdei faj, amelyek pl. a Magyar Alföldön teljesen hiányzanak, vagy nagyon ritkák. Ezek jelentős része ugyan csak a Mezőség északnyugati felénél, tehát a térképen men Praerossicumnak nevezett területen kívül terem, mások azonban — köztük több praecalpin növény — a nyugati (Kolozsvári Szénafüvek) vagy a déli, leginkább erdőtlen tájon, javarészt mint egykori erdők reliktumai.

Maga a bükk mélyen behatol a földrajzi Mezőség területére (Doboka-Füzesmikola-Szék-Gyulatalke-Marokháza-Vajdakamarás-Feketelak-Uzdiszentgyörgy-Teke-Nagyercse-Marosvásárhely vonaláig), viszont jelentős darabon hiányzik a Marostól délre, az Aranyostól és a Kis-Szamostól keletre is (v. ö. F e k e t e — B l a t t n y II. 4. térféle), erdészeti legyel ez a terület volna mezősgéinek tekintendő. Újabban e határvonalon belül Mezősílvásról került elő.

Viszont a jellegzetes sztyepnövények és növényszövetkezetek is tovább terjednek észak felé, túl a bükk határvonalán. Hasonló a gyertyán elterjedése is, de azt a Mezőség nyugati és déli határain túl már mindenfelé megtaláljuk. Ritkák a cser, a hegyi szil, a nyir, a fentemlített juhar és hárás fajok. Az általam bejárt terület (I. Scr. Bot. Mus. Transs. III. 102—3) nagyrészén — eltekintve a Szénafüvektől, amely azonban mesophil kaszálónak gyepjében és cserjesmaradványaiban számos erdei reliktumot őriz, mint az egykori kiirtott erdők hirmondóit — a tetőkön és északi lejtőkön az árnyas-hűvös gyertyános, olykor bükkel kevert tölgysesek (*Querceto-Carpinetum* és *Q. roboris-sessiliiflorae*) — az északnyugati, a Praerossicumhoz már aligha sorozható részen bükkösök is — váltakoznak a déli lejtők sztyeprétejivel és az omlásos-suvalásos oldalak pusztai növényzetével. Ezért nehéz a Mezőség floristikai növényföldrajzi határának pontos megállapítása, s ennek következménye, hogy e flóraműben is megmaradnak a korábbi növényföldrajzi művekben, mint Pax (1908) és Prodán (1931) szereplő határok mellett, saját flóratérképmétől eltérőleg. Felveszem tehát a bükk-határvonaltól északra és észak-

nyugatra Désig és a Nagy-Szamosig terjedő táj adatait, de mellőzöm a Marostól délre fekvő sztyepeket növényzetét.

A mezőségi flóravidék tája egyben az erősen redőzött, gyűrt neogén rétegek területe, szemben a nyugodt településű, javarészt paleogén peremmel a Bihar és előhegyei alján. A Mezőség nyugati határául szolgáló vonal egybeesik a középső miocén mezőségi rétegek határvonalával, viszont a felső miocén rétegekkel borított táj itt már a Meszes-Szamosvidék (M e s z e s i c u m) flórajáráshoz tartozó átmeneti jellegű; a szarmata rétegeket pedig Kolozsvár körül már montan-praealpin erdők fedik, ez már a bihari flórajáráshoz (B i h a r i c u m) tartozik. Viszont a Mezőség déli és keleti felében, egész a Marosig, a szarmata rétegek nagyrészt erdőtlenek, a Maroson — kelet felé — túl már újra átmeneti táj, a Marusicum következik. Délen, a Maros völgyében, a geológiai és növényföldrajzi határ azonos, itt a pliocén kezdődik, a Marostól délre eső szarmata rétegekkel fedett területeket foltonként ismét mezőségi vegetáció borítja, amint arról fentebb megemlékeztem. A mezőségi rétegek — eltekintve az alsó miocén sós és sósagyag talajoktól —, amelyeket a széles völgyek fenekén halophil növényzet borít, hatalmas agyag- és homokkö rétegekből állanak, az ismert dacittufapadokkal, gipszlerakodásokkal. Ezeken a szürkés, elmállva barnás agyagos és meszes márgarétegeken sötét, 3—5% humuszt tartalmazó csernoszjomtalaj alakult ki, amely a beerdősülés folytán degradálódott. Ma a Mezőség legnagyobb részét degradált csernoszjomtalaj borítja, valódi sztyeptalajokat leginkább a suvadásos („Koporsók”) dacittufás részeiken találunk. A löszfoltokon és a pleisztocén folyóterrasszokon erdő alig — majdnem mind kultúrterület —, a folyók alluviumán nyár-fűzligetek alakultak ki.

A Mezőséget a korábbi irodalom természetes, klimatikus sztyepe-nek hirdette. Közismert fáltanságát az erdősülésre kedvezőtlen éghajlat viszonyokra (csapadék hiánya és évszakos eloszlása) — a Mezőség a Bihar esőárnyékában fekszik — vezette vissza. Kolozsvári monografiában már 1926—27-ben kimutattam, hogy a Mezőség klímája kevésbé tér el az Erdélyi Medence többi részétől s általában kedvezőbb az Alföld legtöbb részénél. Újabb (1901—30) adatok alapján közlök itt néhány jellemző és a klimajellegeget meghatározó értéket.

Évi átlagos csapadékmennyisége 520—650 mm (Alföld 490—740 mm). Így Kolozsvár 575, Marosvásárhely 613, v. ö. Debrecen 582, Túrkeve 525. Minimum Mezősílvás 520 mm körül (erdejében bükk!). A nyári csapadékmennyisége 225—250 (kis sávon 200—225), Debrecennél 175—200, az Alföldön ált. 150—175 mm. Erős nyári csapadékmaximum, téli minimum, az ősz szárazabb, mint a tavasz. (Havi csapadékértékek Kolozsvárott : 26—18—25—52—70—94—82—70—45—39—30—25.)

Az évi középhőmérséklet átlagértéke 8—10° (Alföldön 10—11°). Kolozsvárott 8.2°, Marosvásárhelyen 8.9°. A vegetációs időszak (IV—IX) középértékei: Kolozsvár 15.1°, M. vásárhely 15.9° (Alföldön 17—19°). A havi középhőmérséklet átlagértékei I.: — 3.5—3.9° (Alföld: — 0.7—2.2°), IV.: 8.7—9.9° (10.4—10.8°), VII.: 18.8—19.4° (21—22.1°), X.: 8.7—9.7° (10.1—11.3°).

A hőmérséklet évi és haví ingadozásai nagyobbak, mint az Alföldön (Kolozsvárott 22.7°, M.vásárhely 22.9°).

A relativ nedvesség értékei (havi közepek) 67% és 90% között változnak, évi középtéréke: Kolozsvár 78%, M.vásárhely 76%, a minimum áprilisra esik, nyáron minden 70% felett, az Alföldön gyakran 60–65%.

A Mezőség mikroklimatikus szélsőségeire Bujorean mutatott rá. (Saját igen széleskörű, mintegy 30 állomáson egyidőben folytatott mikroklimatikus méréseink adatai elvesztek.) A kolozsvári Nagykoporsó déli (sztyep) és északi (cserjés) oldalán a csapadék évi összege 504, ill. 660 mm, júliusban 75, ill. 98 mm, a párolgás 412, ill. 41 mm, júliusban 97, ill. 5 mm. Hőmérsékleti szélsőségek: évi maximum átlaga 18°, ill. 9°, évi minimum átlaga 0.6, ill. 3.7°. Tényleges szélső értékek T max. 52°, ill. 27°, T min. — 18.5°, ill. — 10.5°. A hótakarás a déli oldalon 84, az északon 127 nap. Mindez a déli lejtők sztyepejének mikroklimatikus jellegét igazolja.

A klimajelleget kifejező képletek adatai: Lang-féle esőfaktor (páraéhség) értékei a vegetációs időszak alatt: Kolozsvár 4.9, M.vásárhely 5.1, Debrecen 3.8, Alföld közepén 3.4. A Köppen-féle klímaformula (Dfbx) azonos a Nyírségével, amelynek klímája valóban legközelebb áll a Mezőséghez, mint hasonló erdős-puszta tájé. Hasonló a Thornthwaite képlet is (CCrb), a csapadék párolgás hánynak értékei 48–52, ami a szavannák és erdős-sztyepek klímáját jellemzi.

A korszerű éghajlati vizsgálatok szerint is tehát a Mezőség semi-humid átmeneti (erdős-sztyep) klímájú táj.

A Mezőség dombjainak egyhangú, kopárnak látszó száraz lejtői a délorosz sztyepekre hasonló növénytákarót hordanak (*Stipion Lessingianae* csoport szövetkezetei).

A kedvezőbb vízellátású lankákon, leginkább egykor erdők helyén, ma dúsfüvű, virágos szénamezők virulnak (*Danthonio-Stipion stenophyllae* csoport rétjei), a völgyek nedves rétjeit az *Agrostidion albae* asszociációi, a sós talajokat hygrophil sósrétek (*Juncion Gerardi* és *Beckmannion eruciformis* szövetkezetek), illetve xerophil sóspuszták (*Festucion pseudoviniae*) borítják. A klimax a kevert tölgyes (*Quercion pubescens-sessiliiflorae*: *Q. roboris-sessiliiflorae*), a Mezőség északi felében gyertyános-tölgyes (*Fraxino-Carpinion*: *Querceto-Carpinetum*), sőt bükkös (*Fagion*) is lehet. Az összes mezősségi növényszövetkezet áttekintése és rövid jellemzése I. AGH. VI. 1947, az erdőké Erd. Kis. 1947, részletes elemzésük Ann. Mus. Nat. Hung. 1947 (1949).

A Mezőségen már a bronzkortól kezdve irtották és felújulásában megakadályozták az erdőt, úgy az ősi települők, mint később a román parasztság, mik a Marostól délre, a szászok földjén, akik kimélték, inkább megmaradt s csak a déli, meredek, nagyon meleg lejtőkön, mint mikroklimatikus-fiziotípikus sztyepeken hiányzik. A Mezőség ősi, postglaciális-boreális korú sztyepei később, az atlantikus periódusban, javarészt beerdősülhetek — bár a sós talajokon és a márgás, suvadó hegyoldalakon erdő meg nem települhetett —, amit bizonyít, hogy a korábban valódi csernoszjomnak minősített (Ballanegger, Timkó—Treitz) uralkodó mezőiségi talajtípus degradált

csernoszjomnak bizonyult (Enculescu, Saidei és Proto-popescu—Pake 1925—27). Az erdőirtásokkal azután széles teren nyílt az ősi pusztai vegetáció megmaradásának és kiterjeszkedésének (Sóó 1927). A Mezőség jelenlegi erdeinek térképe meggyőző arról, hogy azok a dombsorokat valamikor teljes hosszukban borították, ma már szétszakítva, foltokban jelennek meg.

A Mezőség hajdan számos tava és mocsárvilága is eltűnőben. A folyók mentén ligetek alakulnak ki, a nagy ártéri erdők, mint az Alföldön (*Querceto-Fraxineto-Ulmetum*) hiányzanak. A völgyekben sok, valószínűleg bronzkori halastó nyomait (gátak) állapították meg, ezek azokat a völgyeket töltötték ki, ahol most nedves, gyakran sós rétek terülnek el. A biotikus szukcesszió folytán az erdő ma is előnyomulni törekszik. Ahol a kaszálás, legeltetés megszűnik, újból megtelpedik, előbb mint a törpemandula cserjése (*Prunetum tenellae*), majd galagonya-törpemeggy bozót (*Crataegulo-Prunetum fruticosae*), úgy a hajdan kiirtott erdő helyén, a mesterséges, de a természetes sztyepfoltokon is, így a Koporsók lejtőin, mik végre kialakul a tájat jellemző *Quercetum roboris-sessiliiflorae praerossicum* klimax. A kolozsvári Szénafüvek elővölgyi rezervációjában a kaszálás és legeltetés megszűntével a beerdősülés folytán a sztyepnövényzet már háttérbe kezd szorulni, fenntartására mérsékelt kaszálás szükséges.*

A Mezőség jelenlegi arculatát a kultúramodosította: ősi erdő-s-sztyep jellegét a sztyep felé tolta el, mert a természetes, edaphikus- és mikroklimatikus-geomorfológiai sztyepfoltokhoz széles, mesterséges szénamezők és legelők járultak.

A terület edényes virágosan és virágos növényfajainak száma (öshonos, meghonosodott adventív és keverékfajok együttesen) 1375, alfajokkal, polymorph hybridekkel 1440, keverékfajok nélkül 1275. Az átmenetileg fellépő adventíveket, a kétes előfordulású, valamint csak a terület szegélyén kivételesen felbukkanó növényeket nem számoztuk. A flóraelemek megoszlása:

	Fajszám :	Kárpát-medence-aránya :
Kozmopolita elemek	89	6.93 %
Adventív elemek	37	2.80 %
Európai elemcsoport		
Circumpolaris fajok	101	7.87 %
Euráziai fajok	376	29.31 %
Európai fajok	163	12.71 %
Középeurópai elemek	108	8.41 %
Kontinentális elemcsoport		

* A tízes évek végén a Nagykoporsó cserjése, annak északi oldalán még igen korlátozott terjedelmű volt, a románok létesítette rezervációban jelentősen kiterjedt és felnőtt, a negyvenes évek elején, 25 év múlva, más kép fogadtak. A déli meredek lejtőn állandó omlása folytán a befűvesedés is évről-évre újra kezdődik.

	Fajszám :	Százaletkarány :	Kárpát-medence aránya :
Kontinentális fajok			
Pontusi fajok	131	10.21%	6.46%
Pontusi-mediterrán fajok	67	5.22%	3.54%
Mediterrán elemek	51	3.97%	2.44%
Atlanti elemek	92	7.17%	8.04%
Alpin elemcsoport	3	0.23%	2.59%
Balkáni elemcsoport	5	0.38%	11.13%
Balkáni fajok	20	1.57%	4.10%
Dacikus fajok	10	0.80%	4.91%
Endemikus kárpáti-magyar fajok	28	2.18%	9.56%

A kontinentális elemcsoport fajainak magas százalékos aránya kiemelkedő, ami a pusztai növényszövetkezetek változatosságát bizonyítja, természetes az alpin és nyugati elemek jelentéktelen volta, a boreális fajok hiánya, feltűnő azonban az Erdélyre különben jellemző, de inkább montan-alpin balkáni és dacikus fajok kevés száma. Kevés a bennszülött, illetve kárpáti vagy pannóniai faj is.

A Mezőség (ill. a Praerossicum) saját e n d e m i z m u s a i : *Chenopodium Wolffii* (Románia?), *Potentilla recta* ssp. *tuberosa* (az Alföldön és Beszarábiában kétes), *Astragalus Péterpii* (csak Magyarorszáv mellett, pontusi rokonságú, a Mezőség legérdekesebb növénye), *A. exscapus* ssp. *transsilvanicus*. A Praerossicum és a keletkárpáti flórávidék (*Transsilvanicum*), tehát Erdély közös bennszülöttei : *Ruppia rostellata* var. *transsilvanica*, *Rumex patientia* ssp. *recurvatus* (másutt adventív), *Cephalaria radiata*, *Jurinea mollis* ssp. *transsilvanica* (talán még Romániában és Bulgáriában?), *Tragopogon orientalis* ssp. *Hayekii* (Macedonia?). Az Erdélyi Medence és az Alföld bennszülöttei az *Allium ammophilum* (a Delibláton), a *Rorippa Kernerii* (korábban csak a Pannonicumból ismert halophyton, nem azonos a *R. brachycarpa*-val), *Plantago Schwarzenbergiana* (a keleti *P. sibirica* közelű rokona), *Cirsium furiens* (Erdély, Tiszántúl, másutt adventív). Erdélyen kívül a román Alföldön is terem a *Salvia transsilvanica*.

Praeglaciális (resp. tertiaer) vagy glaciális maradványfajokról a Mezőségen nem beszélhetünk, annál jellemzőbbek a postglaciális melegkor klimatikus pusztának reliktumai, ilyen x e r o t h e r m, erősen megfogyatkozott f a j o k :

a) a Kárpátmédencében csak a Mezőségen : *Stipa Lessingiana*, *Iris humilis*, *Peucedanum latifolium*, *P. tauricum*, *Statice tatarica*, *Ajuga oblongata*(?), *Nepeta ucranica*, *Plantago Cornuti*, *Cephalaria uralensis*, *Serratula coronata* (*Wolffii*), *Centaurea ruthenica*, *C. iberica* (másutt adventív), *C. trinervia*, ezekhez járul még további három, a Praerossicum délnyugati folytatásában termő faj : *Polygala sibirica*, *Haplophyllum suaveolens*, *Scutellaria supina* (l. fentebb);

b) a Mezőségen és az Alföldön honosak : *Colchicum bulbocodium* (*Bulb. vernum*), *Adonis volgensis*, *Crambe tataria* (egykor az Alföldön, ma csak a Magyar Középhegységben, így a Balatonnál és Kovács-

patakban), *Salvia nutans*. Az *Ephedra distachya* még a Magyar Középhegységben és a Tordai-hasadékban ;

c) a Mezőségen és a Delibláti homokpusztán teremnek a *Paeonia tenuifolia* és *Scorzonera hispanica* var. *strictiformis*.

A kárpáti és pannóniai endemizmusokból területünkön honosak : *Avenastrum adsurgens*, *Dianthus glabriusculus*, *Gypsophila arenaria*(?), *Helleborus purpurascens*, *Aconitum moldavicum*, *Delphinium Simonkaianum*, *Dentaria glandulosa*, *Trifolium angulatum*, *Astragalus vesicarius* ssp. *albidus*, *Seseli osseum*, *Onosma pseudarenaria*, *Centaurium uliginosum*, *Thymus comosus*, *Th. dacicus*, *Linaria Kocianovichii*, *Melampyrum barbatum*, *Phleuma tetramerum*, *Centaurea pugioniformis*.

Alpin elemek : *Aconitum variegatum*, *Gentiana praecox*, *Hieracium aurantiacum*, *H. fuscum*, *dacicus* fajok : *Juncus Rochelianus*, *Colchicum pannonicum*, *Iris pseudocyperus*, *Dianthus puberulus*, *Thlaspi Kovátsii*, *Rhamnus baphicoccus*, *Lathyrus Hallersteinii*, *Seseli gracile*, *Oenanthe banatica*, *Sympyrum cordatum*, *Melampyrum bihariense*, *Galium pseudoaristatum*.

Az életformák eloszlásában az egyévesek magas arányszáma ugyancsak a sztyepjelleget mutatja :

	Fajszám :	Százaletkarány :	Kárpát-medence aránya :
Phanerophyta	82	6.39	6.4
Epiphyta	4	0.31	—
Chamaephyta	32	2.49	5.7
Hemikryptophyta	662	51.61	56
Geophyta	139	10.83	—
Hydro-Helophyta	67	5.22	13.8
Therophyta	301	23.46	18

A Mezőség florisztikai irodalma.

- Andrae K. J.:** Beiträge zur Kenntnis der Flora des südlichen Banats, der Banater Militärgrenze und Siebenbürgens. — Botanische Zeitung XI. (1853) — XIV. (1855) folytatásokban (Andrae B. Z.)
- Barth I.:** Systematisches Verzeichnis derjenigen Pflanzen, welche der Gefertigte auf mehreren Excursionen in Siebenbürgen im Jahre 1876 gesammelt hat. Archiv d. Ver. f. siebenbürgische Landeskunde. XV. (1879) 105. (Barth.)
- Baumgarten J. Ch. G.:** Enumeratio stirpium Magno Transsilvaniae Principatu praeprimis indigenarum... Wien. I—III. 1816. Nagyszeben IV. 1846. (Bgt.)
- Borbás V.:** Erdély flórájának kis pótléka. M. N. L. X. 1886. 113. — Biológiai Közlemény. Orvos-természett. Ért. Kolozsvár, 1899. 240. (Borbás több monografikus munkája tartalmaz egyes mezősségi adatokat.)
- Borza A.:** Materiale pentru studiul ecologic al Câmpiei. — Bul. Grad. Bot. Cluj. VIII. (1928) 10. (Borza.)
- Botanic excursion through the Câmpie. Guide de la VI. I. P. E. 1931. 196. (Borza Guide.)
- Studiu botanic in Câmpie Ardealului. Transilvania. 1920. 74.
- Câmpia Ardealului. Studiu Geobotanic. (Contr. Botan. din Cluj II. No. 9) 1935.
- Die siebenbürgische Heide. Bibl. rerum Transs. V. 1944. p. 40.
- Brassai S.:** Botanische Miscellen aus Siebenbürgen. Flora XXI. (1838) 305.
- Egy pár kis curiosum. M. N. L. I. (1877) 129.
- Bujorean Gh.:** Zwei extreme Standorte bei Cluj. — Veröff. Geobot. Inst. Rübel X. 145.
- Aegilops ovata si Glaux maritima in flora României. Bul. Grad. Bot. Cluj. XIV. 225.
- Csűrös I.:** Contribuțiuni la cunoașterea vegetației sărăturilor din imprejurimile Clujului. Bul. Grad. Bot. Cluj. XXVII. (1947) 80—85.
- Czetz A.:** Azon növények névlajstroma, amelyeket én kaptam és száritottam 1850-től fogva. Erd. Múz. Egyl. Évk. VI. 10. (Czetz.)
- Ercsei J.:** Nemes Torda vármegye flórája. Kolozsvár, 1844. (Ercsei.)
- Fekete L. és Blatny T.:** Az erdészeti jelentőségű fák és cserjék elterjedése a magyar állam területén. I., II. Selmechbánya, 1913.
- Freyn J.:** Az 1871—73. évben Magyarország keleti részeiben gyűjtött növények jegyzéke. Közli Borbás V. Math. Termtud. Közl. XIII. (1876) 65. (Freyn.)
- Fuss M.:** Flora Transsilvaniae excursio. Nagyszeben, 1866. — → Herbarium normale Transsilvanicum. V. S. V. XIII—XII. 1862—1872.) (Egy-két adat más dolgozataiban is.)
- Györffy I.:** Bokréta erdélyi növénynevekből. Szegedi Füzetek II. 64, 158.
- Ghișa E.:** Cercetări asupra as. Stipetum stenophyllae cu Danthonia calycina în Transilvania centrală. Bul. Grad. Bot. Cluj. XXI. (1941) 56.
- — Stațiunile cu Nepeta ucranica L. in România. Bul. I. c. XXII. (1942) 63.
- Hargitai Z.:** Adatok a Szamosvidék növényzetének ismeretéhez. II. Scripta Bot. Mus. Transs. I. (1942) 122. — III. I. c. II. (1943) 64.
- — Bálványosváralja és környékének növényzetéről. Scripta III. (1944) 122.
- Hayek A.:** Die Pflanzendecke Oesterreich-Ungarns. I. Wien, 1916. (Hayek.)
- Janka V.:** Adnotationes in plantes dacicas nonnullasque alias europaeas. Linnaea XXX. (1859) 549. (Janka.)
- — Adatok Magyarhon délkeleti flórájához. Math. Termtud. Közl. XII. (1876) 153. (Janka MTK. XII.)
- — Correspondenz Ö. B. Z. IV. 188, 403. — V. 229. — VI. 362. — VIII. 365. — XII. 293. — XVIII. 168, 231, 265, 297. (1854—69.)
- — Eine für die Flora von Siebenbürgen neue Pflanze. Ö. B. Z. V. (1855) 60.
- — Anthemis Haynaldi Janka. Ö. B. Z. VI. (1856) 1.
- — Eine für die österreichische Monarchie neues Gras. Ö. B. Z. XIII. (1863) 364.
- — Stipa Lessingiana und S. Grafiana. Ö. B. Z. XVIII. (1868) 339.
- — Iris humilis M. B., Ö. B. Z. XVIII. (1868) 376.
- Jávorka S.:** Magyar Flóra. Budapest, 1924—25.
- Joó I.:** Über eine bis jetzt in der Siebenbürger Flora unbekannte neue Iris Art... V. S. V. II. (1851) 98.
- Keller R.:** Wildrosen aus der Tatra. Bul. Grad. Bot. Cluj. VI. (1926) 1.
- Kovrig S. és Ornstein J.:** Index Flora Szamosujvariensis. Szamosújvár, 1899. p. 31. (K. et O.)
- Landoz J.:** Névsora a Kolozsvárt termő növényeknek, melyeket többévi vizsgálódásai alapján összegyűjtött... Kolozsvár, 1844 p. 18. (Landoz.)
- Morariu I.:** Asociații de plante antropofile din jurul Bucureștilor cu observații asupra raspândirii lor în țara și mai ales în Transilvania. Bul. Grad. Bot. Cluj XXIII. (1943) 131.
- Nyárády E. Gy.:** Marosvásárhely és környékén élő tavaszi és nyáreleji növények határozója. Marosvásárhely, 1914. (Ny. Mv.)

- — A Kolozsvári Szénafüvek suvadásos területeiről. Földr. Közl. 1941. 40. (Ny. F. K.)
- — Kolozsvár környékének mocsárvilága. Erdélyi Múzeum 1941. 105. (Erd. Tud. Füzetek 125. sz.) (Ny. E. M.)
- — Centaurea ruthenica nu a dispărut din flora Transilvaniei. Bul. Grad. Bot. Cluj III. (1923) 85.
- — Új adatok Kolozsvár flórájának bővebb ismeretéhez. Bot. Közl. XXXVIII. (1941) 130.
- — Kolozsvár környékének ibolyái. Borbásia III. (1942) 90.
- — Adatok a hazai Centaureák „Jacea“ és „Phrygia“ csoportjainak bővebb ismeretéhez, különös tekintettel Kolozsvár környékének flórájára. Bot. Közl. XL. (1943.) 16.
(Egyes adatok más, a kolozsvári flóraművel egyidőben megjelent kisebb közleményekben is. Néhány adata a Bul. Grad. Bot. Cluj-ban megjelent dolgozatokban, így :
- — Despre grupa Auricomus a genului Ranunculus. XII. (1932) 85.
- * Nyárády E. Gy. és Soó R.: Kolozsvár és környékének flórája. I—9. Kolozsvár, 1941—1944. (Ny. Kv.)
- Pax F.: Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Karpathen. I., II. 1898., 1908.
- — Die Flora des siebenbürgischen Hochlandes. Englers Bot. Jahrb. L. (1914) 32.
- Péch D.: Adatok az erdélyrészti Mezőség flórájához. Erdészeti Kisérletek I. (1899) 111.
- Péterfi M.: Adatok Erdély flórájához. M. B. L. XVII. (1918) 58.
- Priszter Sz.: A Szamospart hordalék-növényzete Gyalu és Apahida között. Acta Geobotanica Hungarica VI. (1947) 83.
- * Prodan Gy. (J.): Erdélyben, különösen a Mezőségen előforduló néhány ritkább növény lelőhelye. M. B. L. V. (1906) 32.
- — Adatok Magyarország flórájához. M. B. L. XII. (1913) 124.
- — Néhány adat hazánk flórájának ismeretéhez. M. B. L. XV. (1916) 251.
- — A sármási földgázterület és környékének nyári flórája. Földr. Közl. 1914. 312.
- * — — Flora Câmpie Ardelene. Bul. Acad. Agric. No. 2. (1931) Kolozsvár p. 286. (Pr. Cp.)
- — Conspectul sociologic și sistematic al florei aquatice și palustre din România. Bul. Acad. Agric. IV. (1933) 158.
- — Menthae novae Romaniae et Jugoslaviae. Bul. Grad. Bot. Cluj V. (1925) 102.
- — Plante din România. Bul. Grad. Bot. Cluj. XVI. (1936.) (További adatok Achillea, Centaurea és Rosa monográfiáiban.)
- — Flora pentru determinarea și descrierea plantelor ce cresc în România., I. II. Kolozsvár, 1923. 2. kiadás I. 1, 2. Kolozsvár 1939—40. II. 1944. (Pr. Fl.)
- Pop E.: Über die Ephedra distachya von Turda und Suat. Guide VI. I. P. E. (1931) 161.
- Schur F.: Über Bulbocodium edentatum Schur. V. S. V. II. 165, III. 117, V. 84, IV. 53. — Plantago Schwarzenbergiana VI. 3. — Centaurea Schwarzenbergiana VI. 4. (1853—57.)

- X — — Bericht über eine botanische Reise durch Siebenbürgen. V. Klausenburg, vorzüglich die Heuwiese. VI. Die Mezőség. Verh. Sieb. Ver. Natur. X. (1859) 96, 137. (Schur V. S. V.)
- — Beobachtungen in der Flora Siebenbürgens. Ö. B. Z. IX. (1859) 225.
- — Zur Flora Siebenbürgens. Ö. B. Z. X. (1860) 248, 324, 352.
- — Enumeratio plantarum Transsilvaniae. Wien, 1866. (Schur En.)
- — Phytographische Fragmente. Ö. B. Z. XVIII. (1868) — XXI. (1871) pl. loc.
- — Phytographische Mittheilungen. Verh. Naturf. Ver. Brünn XV. (1877) p. 200.
(Egy-két adat az Ö. B. Z. és Verh. Naturf. Ver. Brünn. további köteteiben.)
- Sebők S.:** Honismertetés. Tordai áll. gimn. értesítője. 1909—10. 3—49.
- — A tordai salinus flóra. Természet, 1912.
- X **Simonkai (Simkovies) L.:** Adatok Kolozsvár és Torda vidékének flórájához. M. N. L. II. (1878) 145.—Pótadatok... III. (1879) 49.
- — Descriptiones plantarum novarum. Természetr. Füz. III. (1879.)
- — Erdély edényes flórájának helyesbitett foglalata. (Enumeratio Florae Transsilvaniae critica.) Budapest, 1887. (Simk. En.)
(Adatok egyes monografikus munkáiban is.)
- Soó R.: Kritikai megjegyzések a magyar flóra ismeretéhez. I. Bot. Közl. XXII. (1925) 64., II. XXIII. (1926) 146., III. XXV. (1928) 133.
- — Kolozsvár geobotanikája. Földr. Közl. 1927. 15.
- — Geobotanische Monographie von Klausenburg (Kolozsvár). Debrecen, 1927. (Soó GM.)
- — Beiträge zu einer kritischen Adventivflora des historischen Ungarn. Bot. Archiv. XIX. (1927) 349.
- — Zur Nomenklatur und Methodologie der Pflanzensoziologie. („Gragger-Gedenkbuch, Berlin.“ 1927. 234.) (Soó in Gr.)
- — A magyar vizek virágos vegetációjának rendszertani és szociológiai áttekintése. I—VI. Magy. Biol. Int. Munkái II. 45., VII. 135., VIII. 233., X. 174. Ann. Mus. Nat. XXXIX. 167. Archiva Biolog. XVII. 90.
- — Az Erdélyi Medence endemikus és reliktum növényfajai. Acta Geobot. Hung. V. (1943) 141. (Soó A. G. H.)
- — Kritikai megjegyzések és újabb adatok a Székelyföld flórájához. Scripta Bot. Mus. Transs. I. (1942) 38.
- — Additamenta ad cognitionem generis Hieracium in Hungaria. Scripta Bot. Mus. Transs. II. (1943) 100.
- X — — Adatok a Mezőség növényzetének ismeretéhez. Scripta Bot. Mus. Transs. III. (1944) 100. (Soó.)
- — Az Eurotia ceratoides Erdélyben. Scripta Bot. Mus. Transs. III. (1944) 139.
- — A Székelyföld flórájának előmunkálatai. Magyar Flóraművek, III. 1940. (Soó Szf.)
- — A Székelyföld Flórája. Flora Terrae Siculorum. Supplementum I. Magyar Flóraművek. VI. 1943.

- — Az Erdélyi Mezőség erdei növényfajainak elterjedése. Erdészeti Kisérletek. XLVI. (1946) 261. XLVII. 55. (EK.)
- — Revue systématique des associations végétales des environs de Kolozsvár. Acta Geobot. Hung. VI. (1947) 3—50. (Revue)
- — Conspectus des groupements végétaux dans les Bassins Carpathiques. I. Les associations halophiles. Debrecen, 1947. p. 60. (Consp.)
- — Közép-Erdély erdei növényszövetkezetei és azok jellemző (charakter) fajai. Erdészeti Kisérletek XLVII. (1947.) 1.
- — Les associations végétales de la Moyenne Transylvanie. I. — Annales Musei Nation. Hungarici XLI. (1948) 33. (L. Nyárády E. Gy. Kolozsvár és környékének flórája. A pót-lások (1944 : 643—69) nagyrészt Soó-tól. (Soó Kv.) További adatok monografikus munkáiban : *Melampyrum, Orchideae, Rhinanthus* stb.)
- Sternheim K. : Übersicht der Flora Siebenbürgens... Diss. Wien, 1846.
- Szakmáry F. : Florisztikai tanulmányok a szabédi m. kir. erdészeti kísérleti telepen. Erdészeti Kisérletek. VII. (1905) 115.
- Todor I. : Flora si vegetație dela Baile-Sarate Turda. — Bul. Grad. Bot. Cluj. XXVII. (1947) 1—64.
- Topitz A. : Ungarische Minzen. M. B. L. XV. (1916) 125.
- Wagner J. : Újabb adatok hazánk flórájához. Természett. Közl. Pótf. 1900. 281.
- Walz L. : Delphinium fissum Kolozsvár vidékén. M. N. L. I. (1877) 130.
- Wolff G. : Jegyzéke néhány Torda környékén előforduló ritkább növények. M. N. L. I. (1877) 56. (Wolff.)
- — Pflanzen aus der Umgebung von Klausenburg. V. S. V. II. (1851) 175.
- Winkler M. : Reise nach südlichen Ungarn und Siebenbürgen. Ö. B. Z XVI. (1866) 20, 44. (Winkler.)
- Zahn K. H. : Beiträge zur Kenntnis der Hieracien Ungarns und der Balkanländer. V. Ann. Mus. Nat. Hung. 1910. 34. — VI. M. B. L. X. (1911) 121. — VII. M. B. L. XXV. (1926) 283.

Exsiccata-kiadványok.

- FEH : Flora Exsiccata Hungarica.
- FEAH : Flora Exsiccata Austro-Hungarica.
- Hb. Norm. : Herbarium Normale.
- FER : Flora Exsiccata Romaniae.

Rövidítések.

Az irodalmi források rövidítéseit lásd a címek után. A folyóiratok rövidítése a szokásos, így AGH : Acta Geobotanica Hungarica, BK : Botanikai Közlemények, B. Cl. : Buletinul Grădinii Botanice și al Muzeului Botanic dela Universitatea din Cluj, Bul. Acad. Agr. : Buletinul Academiei de științe agronomice din Cluj. Guide : Guide da la VI. Excursion Phytogeographique Internationale en Roumanie, MBL : Magyar Botanikai Lapok, MBIM : Magyar

Biológiai Intézet Munkái, MNL : Magyar Növénytani Lapok, MTK : Mathematikai és Természettudományi Közlemények, ÖBZ : Österreichische Botanische Zeitschrift, Scr. : Scripta Botanica Musei Transsilvanici, TTK : Természettudományi Közlöny, TF : Természetrajzi Füzetek, VSV : Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins f. Naturwissenschaften, VNVBrünn : Verhandlungen des Naturforscher Vereins in Brünn etc.

A helynevek rövidítései összetételekben : A.: Alsó, Aranyos, B.váralja : Bálványosváralja, F.mikola : Füzesmikola, G.keresztür : Gerendkeresztür, K.: Kis, Kolozs, Kv. : Kolozsvár, M.: Magyar, Maros, Mező, N.: Nagy, Ö.füzes : Ördöngősfüzes, P.kamarás : Pusztakamarás, Sz. : Szamos, Szász, Vszt. : Vasasszent, szt. : szent, h. : hegyl., v. : völgy, f. : fürdő, fa : falva, e. : erdő.

Megjegyzés. Ercsei idézett munkájában részben latin, részben magyar (Diószegi után) növényneveket használ, utóbbiakat Simonkai olykor felvette erdélyi flóraművébe, máskor nem. Én minden megfejthető Ercsei adatot felvettetem, ha közelebbi termőhelyet nem is közölt, Torda jelzéssel, ha csak nem kétségtelenül magashegységi fajról volt szó. Sebők értéktelen komplikációjában Ercsei adatait ismétli (de nem idézi), azokat termőhelyek szerint próbálja csoportosítani, néhány adatát vettem fel csupán, azok is kétesek.

Šafta agrosociológiai dolgozatait, noha mezőségi anyagot is tartalmaznak, nem vettetem fel, mert idézhető adatai nincsenek. (Šafta in Anal. Inst. Cercet. Agr. al României VIII (1936) 299 és Bul. Fac. Agron. Cluj-Timișoara X (1943). 3)

Magyar-román helynévszótár.

Alsózsuk	Jucul-de-Jos	Harasztos	Călărași
Ajton	Aiton	Hesdát =	
Apahida	Apahida	Szamoshesdát	Hășdate
Aranykút	Aruncuta	Iklód = Kis	
Aranyosgyéres	Câmpia-Turzii	íklód	Iclozel
Aranyoslóna	Luna	Kajántó	Chinteni
Aranyosszent-		Kálýán	Câianu
miklós	Sâniocără	Katona	Câlină
Bádok	Bădești	Kecsed	Alunis
Bala	Băla	Kékes	Chiuchiș
Báld	Balta	Kiscég	Tagșoru
Bálványos-		Kissármás	Șarmăselu
váralja	Unguraș	Kolozs	Cojocna
Bazéd	Băzău	Kolozsborsa	Borșa
Berkenyes	Berchieșu	Kolozsbós	Boju
Bethlen	Beclean	Kolozskara	Cara
Bonchida	Bonțida	Kolozskorpád	Corpadea
Boncnyires	Bonț	Kolozspata	Pata
Budatelke	Budești	Kolozsvár	Cluj
Buza	Buza	Szénafű	Fânațele
Cege	Taga	Koppánd	Copăceni
Coptelke	Top	Körtekapu	Poarta
Csehettelke	Visinelu	Magyarfráta	Frata
Denegeleg	Livada	Magyarpalatka	Palatca
Dés	Dej	Magyarszovát	Suatu
Désakna	Ocna-Dejului	Maroskece	Chețani
Dezmér	Desmiru	Maroskeresztúr	Crișești
Doboka	Dabâca	Marosludas	Luduș
Egerbegy	Agârbiciu	Marosszentanna	Sântana-de-Mureș
Faragó	Fărăgău		
Fejérd	Feiurdeni	Marosszent-	Sângeorgiu-de-Mureș
Feketelak	Lacu	györgy	
Füzesmikola	Nicula	Marovásárhely	Târgu-Mureș
Galambod	Porumbeni	Mezőbánd	Band
Gerend	Grind	Mezőbergenye	Bergchia
Gerend-		Mezőbő	Boian
keresztrő	Luncani	Mezőcsán	Ceanul-Mare
Göc	Ghiolt	Mezőcikud =	
Gyeke	Geaca	M. ceked	Valea-Largă
Györgyfalva	Gheorgheni	Mezőcsávás	Ceușul-de-Câmpie
Gyulatelke	Coasta		
Hadrév	Hădăreni	Mezőfele	Câmpenița

Mezőföldvár	Feldioara-de-Câmpie	Pusztakamarás	Cămărașul
Mezőgyéres	Ghireș	Radnót	Iernut
Mezőkapus	Capusul-de-Câmpie	Rőd	Rediu
Mezőkirályfalva	Crăești	Sajgó	Șigău
Mezőkék	Cooc	Sárpatak	Șarpatoc
Mezőméhes	Mileșul-de-Câmpie	Szabéd	Șeusa
Mezőményes	Herghelia	Szamosfalva	Săbed
Mezőmojos	Moisa	Szamosjenő	Somoșeni
Mezőőr	Juriul-de-Câmpie	Szamosszentmiklós	Fundătura
Mezőőrke	Urca	Szamosújvár	Sâniocără
Mezőőrményes	Urmeniș	Szászlekence	Gherla
Mezőpagocsa	Pagăceană	Szászszentencs	Mintiul-Gherlei
Mezőszabad	Voiniceni	Szásznyires =	Lechința
Mezőszava	Sava	Nyires	Enciu
Mezőszengyel	Sânger	Szászrégen	Nires
Mezősentmihály	Sânmihaiul-de-Câmpie	Szászujfalu	Reghin
Mezőszilvás	Silvasul-de-Câmpie	Szék	Noul
Mezőszombat-		Szekelykocsárd	Sic
telke	Sâmboleni	Szekelyuraly	Lunca-Mures-șului
Mezőtöhát	Tăureni	Szentbenedek	Oroiu
Mezőzák	Zaul-de-Câmpie	Szentmáthé	Mânăstirea
Mikola	Micula	Szentmihály	Mateiu
Mócs	Mociu	Teke	Mihai-Viteazul
Mojos = Mező-		Torda	Teaca
mojos	Mojos = Mező-	Sósfürdő	Turda
Monosfalu	Monosfalu	Toldalag	Baile Sărate
Moró	Morău	Tötör	Toldal
Nagycég	Tagu	Uzdiszentgyörgy	Teoltiur
Nagycsere	Ercea	Vajdakamarás	Sângeorgiu-de-Câmpie
NagyNyulas	Milaș	Vajdaszentiván	Vaida-Cămăras
Nagysármás	Șarmășul	Vajdaszentiván	Voivodeni
Noszoly	Năsal	Vásaszentegyed	Riscruci
Novoly	Năoiu	Vásasszentiván	Sântejude
Omlásalja	Măluț	Vásasszent-	Sântioanna
Omboztelke	Mureșenii-de-Câmpie	gothárd	Sucutard
Ördöngősfüzes	Fizeșul-Gherlei	Virágosvölgy	Valea Florilor
Pata = Kolozspata		Vízszilvás	Silivas
Pogácsa =		Zsuk = Alsózsuk	
Mezőpagocsa			
Pókakeresztúr			
Pujon	Păcureni		
	Puini		

PTÉRIDOPHYTA.

Polyopodiaceae.

1. *Cystopteris filix-fragilis* (L.) Borb. — (EK. 270) — Bonchida (Soó 103), B.váralja (Hg. III. 126)
2. *Dryopteris Linnaeana* Christens. — (EK. 270—1) — F.mikola (Hg. II. 65), Szu.németi, Coptelke (Hg. III. 129—30)
3. *D. phegopteris* (L.) Christens. — (EK. 271) — Coptelke (Hg. III. 130)
4. *D. filix-mas* (L.) Schott — (EK. 271) — Kv. Szénafű, Fejér, Bonchida, Iklód, F.mikola, B.váralja, Szu.németi, Coptelke.
5. *D. thelypteris* (L.) A. Gray — (EK. 271) — Kv. Szénafű, Apahida, Szék, Sz.nyires, Coptelke. — Torda (Pr. Cp. 54, FER. 2147, Borza BCI. XIV. 102, Todor 43)
6. *Athyrium filix-femina* (L.) Roth — (EK. 271) — Bonchida (Soó 103), F.mikola (Hg. II. 65), Szu.németi, Coptelke (Hg. III. 129—30)
7. *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn — (EK. 271) — Kv. — Fejér, Kolozs, Cege-Pujon, B.váralja, Szu.németi, M.vásárhely.
8. *Polypodium vulgare* L. — (EK. 271) — F.mikola (Hg. II. 65), B.váralja, Szu.németi (Hg. III. 128—9)

Marsiliaceae.

Dubia : *Marsilia quadrifolia* L. — Mezőség (Schur ap. Soó Ann. XXXIX. 183) : Vszt.iván (Bgt. IV. 8)

Equisetaceae.

9. *Equisetum arvense* L. — Frequens. In silvis b. nemorosum A. Br. (sic : Désakna Hg. II. 71)
10. *E. maximum* Lam. — Kv. Szénafű (Ny. Kv. 40, FK. 1941. 43, Ujv. Kv. 644, Soó AGH. VI. 33, Pop BCI. XIII. 78—85 : et b. humile Milde, c. minus Lang, d. densum Wirtg, f. minus Lange), Ajton (Ny. I. c.), K.bós (Pr. Cp. 99), Fejér, Szék, Cege (Soó 103), Doboka-Moró-Tötör (Hg. I. 128—9), M.vásárh. (Ny. Mv. XL.)
11. *E. palustre* L. — Frequens, in formis pluribus.
12. *E. ramosissimum* Desf. — Kv. Morgó (Soó Kv. 644 b. pannonicum (Kit.) Borb.), Feketelak (Soó 103)
13. *E. fluviatile* L. — Vszt. gothárd(!) b. *limosum* (L.) — Kajántó (Ny. Kv. 39, EM. 106)
E. hiemale L. Ad limites : Bethlen (Reithoffer FER. 326b.)

Isoetaceae.

Delenda : *Isoetes lacustris* L. (resp. *I. echinospora* Durieu) — Vszt.iván (Bgt. IV. 8)

GYMNOSPERMAE.

Pinaceae.

Cultae : *Pinus silvestris* L., *P. nigricans* Host, *Picea excelsa* (Lam.) Lk., *Juniperus communis* L. Ad limites : Bethlen (Pr. Cp. 187)

Gnetaceae.

14. *Ephedra distachya* L. — M.szovát (Péterfi MBL. XVII. 58, FEH. 736 III, FER. 213)

MONOCOTYLEDONES.

Typhaceae.

15. *Typha angustifolia* L. — Frequens, f. *inacqualis* Kronf. et f. *Sonderi* Kronf. Kv. Szénafű (Soó Kv. 44)

16. *T. latifolia* L. — Frequens.

Sparganiaceae.

17. *Sparganium erectum* L. — Frequens, certe etiam ssp. *neglectum* (Beeby) Sch. et Th.

18. *S. simplex* Huds. — Torda (Wolff 65), Vszt.iván (Pr. MBL. V. 33)

Potamogetonaceae.

19. *Potamogeton natans* L. — Kv. Szénafű (Soó GM. 97), Szamosfa (Soó in Gr. 251), Torda (Bgt. I. 104) — Sósfa. (Todor 44 f. *pygmaeus* Gand.), Dés (Czetz ap. Soó Arch. Biol. XVII. 99), Cege : Hodostó (!Györffy MBL. III. 165, Pr. Cp. 221, ap. Soó l. c. b. *prolixus* Koch), Noszoly. (Pr. ap. Soó l. c. f. *ovalifolius* Fieb.), Coptelke (Pr. MBL. XV. 252), Vszt.iván (Bgt. I. c.), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Székelyf. 7. et l. c. b.)

20. *P. lucens* L. — Szamosfa (Simk. MNL. II. 152), Cege : Hodostó (Pr. MBL. V. 33, Cp. 223, ap. Soó Arch. l. c.), Kékes (Pr. ap. Soó l. c.), Dés (Czetz ap. Soó l. c.), M.vásárh. (Ny. Mv. l. ap. Soó l. c.)

21. *P. perfoliatus* L. — Mezőség, in lacubus (Pr. MBL. V. 33, Bul. Acad. Agric. IV. 196 f. *densifolius* Meyer), Cege (Györffy l. c., Pr. ap. Soó MBIM. VIII. 225 b. *cordatolanceolatus* M. et K.)

22. *P. erispus* L. — Mezőség, in lacubus (Pr. MBL. V. 33), Szamosfa-Szszt.miklós (Soó GM. 99, in Gr. 251, Consp. 10, Pápai ap. Soó MBIM. VIII. 227), Apahida(!), Cege (!Pr. Cp. 222, ap. Soó l. c.), Katona (Pr. BC1. XVI. 86), Gyeke (Péterfi ap. Soó Arch. l. c. f. *sinuatus* Fr.), M.méhes (Borza FER. 2703a), M.záh (Nyár.), M.vásárh. (Bgt. I. 106, Ny. ap. Soó l. c.), Torda (Ghiuta FER. 2703a), A.gyéres (Ny. ap. Soó l. c. f. *planifolius* Meyer), Noszoly (Pr. MBL. l. c.)

23. *P. pusillus* L. — Torda (Bgt. I. 107, Richt. ap. Soó MBIM. VIII. 231) — Sósfürdő (Todor 45), Apahida (Soó), Mezőség, in lacubus (Pr. MBL. V. 33) : Cege (!Pr. Cp. 221 cum b. *tenuissimus* M. et K. : Pr. MBL. V. 33), Noszoly (Pr. ap. Soó Arch. l. c.), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Arch. l. c.)

24. *P. acutifolius* Lk. — M.vásárhely (Ny. FER. 215)

25. *P. pectinatus* L. — Kv. Melegv. (Soó Consp. 10), Szamosfa (Soó BK. XXIII. 146, GM. 99, MBIM. VI. 237, Consp. l. c. a. *vulgaris* Cham. et Schlechtd. pt. sub „*P. interrupto*“ Bélteki ap. Soó Arch. Biol. XVII. 100), Apahida (Ujv. Kv. 644 ap. Soó Arch. l. c.), Mezőség tavai (Pr. MBL. V. 33) : Cege-Hodostó (Pr. Cp. 222, ap. Soó MBIM. l. c. b. *Vaillantii* (R. et Sch. Soó), Kékes, Noszoly (Pr. ap. Soó Arch. l. c. b.-c. *scoparius* Wallr.), M.szengyel (Csató ap. Soó l. c. b.), Torda (Wolff 65. Bernátsky, Borza ap. Soó l. c., Todor 44, FER. 1423 sub *scopario* = b. Wolff ap. Soó Arch. l. c.)

Dubiae : *P. fluitans* Roth = *P. nodosus* Pers. — Kolozs, Torda (Bgt. I. 104)

P. densus L. — Mezőség (Schur ÖBZ. XX. 283), Torda (Bgt. I. c.)

26. *Zannichellia palustris* L. b. *pedicellata* Wahlbg. et Rosén et e. *aculeata* (Schur) A. et G. — Kv. Szénafű (Ny. FER. 922, FK. 43, Kv. 47, Pr. Bul. Acad. IV. 203, Soó MBIM. X. 176 Consp. 10 partim e.), Melegv. (Soó Consp. 10), Szamosfa (Landoz Kv. I. 15 sec Simk. En. 512 e., Soó Consp. 10), Apahida (Soó Kv. 644, Consp. 10 Arch. l. c.), Szék (Soó 103, Consp. 10 Arch. l. c.), Mezőbő (Simk. l. c.), Radnót (Pávai ap. Pr. l. c. 200), Torda (Barth ap. Schur ÖBZ. XX. 203 ap. Prod. l. c. Soó in Gr. 251, Barth, Janka ap. Soó MBIM. l. c. e.)

27. *Ruppia maritima* L. ssp. *rostellata* (Koch) Asch. var. *transsilvanica* (Schur) Soó — Szamosfa (Bielz Landkunde 84, Schur VSV. X. 112, Simk. En. 512., Soó in Gr. 251, Consp. 10, Istvánffy ap. Soó MBIM. X. 177, Chetianu Dissert. et ap. Ny. Kv. 46, Pápai ap. Ny. l. c., Soó Arch. l. c., Pr. Bul. Acad. IV. 199), Kv. Melegv. (Soó AGH. VI. 6, Consp. 10, Arch. l. c.), Torda-Sósfa. (Bielz l. c., Barth 116, Wolff 65, Borza FER. 22, Pr. l. c., Cp. 54, Barth, Freyn, Wolff ap. Soó MBIM. l. c. Péterfi, Ny. ap. Soó Arch. l. c.)

Najadaceae.

28. *Najas marina* L. — Cege-Hodostó (! Bgt. Mant. I. Pr. MBL. V. 33, Cp. 222, Györffy MBL. III. 164, ap. Soó MBIM. X. 179), M.tóhát (Csató ap. Soó l. c.)

28a. *N. minor* All. — Ad limites : M. vásárhely (Ny. ap. Soó Szf. 8 Arch. l. c.)

Juncaginaceae.

29. *Triglochin palustris* L. — Kv. Szénafű (! Ny. FK. 46, Kv. 47, Butujás, ap. Ny. Kv. 47), Szamosfa (Ny. Kv. 47, 644), Dezmér-Györgyfa (Ny. EM. 115), Hesdát (Pr. Fl. II. 297), Désakna (Hg. II. 70), Vszt.gothárd-Pujon (Janka 608), M.záh, M.cikud (Simk. En. 510), Szabéd (Lengy.), M.ludas (Ny.), Torda (Ercsei 76)

30. *T. maritima* L. — In pratis humidis salinis frequens. (cf. Bgt. Ia 314, Ercsei 76, Schur VSV. X. 80, Janka 608, Freyn 76, Simk. En. 510, K. et O. 25, Hayek 466—7, Soó GM. 99, in Gr. 250, Consp. 13, 28—30, 32—34, 43—45, Pr. FK. 1914. 312, Cp. 79, 230, 242, 246, Ny. Mv. I, Kv. 47, 644, FK. 48 EM. 1941. pl. loc., Pr. Fl. II. 292—298, Hg. II. 69—70, Borza et Pop FER. 334, Todor 46) — f. *elata* Nutt. Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 155)

Alismataceae.

31. *Alisma plantago-aquatica* L. — Frequens.

32. *A. lanceolatum* With. — Kv. Szénafű (Land. Kv. II. 37), Szamosfa (Csürös BCL. XXVII. 80), Szszt.miklós-Apahida (Csürös ap. Soó 103), Bonchida, Szék-Gyulatelke (Soó 103)

Dubia : *A. gramineum* Gmel. — Vszt.iván (Bgt. En. I. 317 sub „*A. natante*“)

33. *Sagittaria sagittifolia* L. — Ad limites, Torda (Ercsei 115, Sebők 34), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 8)

Butomaceae.

34. *Butomus umbellatus* L. — Frequens.

Hydrocharitaceae.

35. *Hydrocharis morsus-ranae* L. — Sz. kocsárd (Csató ap. Soó MBM. X. 183)

Dubia : *Stratiotes aloides* L. — Dés (Fuss Trans. 607)

Gramineae

Zea mays L. — Subspont. Szamosfa-Apahida (Priszter 84)

36. *Andropogon ischaemum* L. = *Botriochloa* i. Keng — Frequens.

Dubiae : *Chrysopogon gryllus* (Torn.) Trin. — Kv. Szénafű (Schur En. 271)

Tragus racemosus (L.) All. — Mezőség, Kv. (Bgt. III. 216)

37. *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. — Frequens.
ssp. *peetiniformis* Henrard (*ciliaris* auct. eur.) — M.kece (Ny.), Dés, M.bánd (Lengy.)

38. *D. ischaemum* (Schreb.) Mühlbg. — Dés, Dengeleg, Katona, Sz.lekence (Lengy.)

39. *Echinochloa crus-galli* (L.) P. B. et b. *oryzoides* (A.)

Fritsch — Frequentes.

40. *Setaria verticillata* (L.) P. B. — Frequens.

41. *S. glauca* (L.) P. B. = *S. pumila* (Poir.) R. et Sch.? — Frequens.

42. *S. viridis* (L.) P. B. — Frequens. — b. *Weinmanni* (R. et Sch.) — Torda (Todor 46)

42a. *Leersia oryzoides* (L.) Sw. — Ad limites : M.vásárhely (Ny. ap. Soó Szf. 9)

43. *Baldingera arundinacea* (L.) Dum. — Kv. Szénafű (!Schur VSV. X. 110, Ny. FK. 44—51, Kv. 53, Bélteki ap. Ny. I. c.), Kajántó (Ny. I. c.), Szújvár, N.iklód (K. et O. 5, Pr. Cp. 74), Bonchida (!Pr. Fl. II. 340), Szamosfa-Apahida, Szék-Gyulatelke(!), Désakna (Hg. II. 71), M.örményes (Pr. Cp. 95), M.méhes (Borza FER. 724), Torda (Pr. BCL. XVI. 87, Todor 46), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 9)

44. *Anthoxanthum odoratum* L. — Frequens.

b. *glabreseens* Cel. cum typo. — e. *tenerum* A. et G. — Kv. Szénafű (Ny. Kv. 53), Torda-Sósfurdo (Todor 46)

45. *Hieroehloë odorata* (L.) Wahlbg. (EK. 271) — Kv. Szénafű Apahida, Dezmér, Kolozs, K.kara, Dezmér-Pata, Mócs. — Torda (Ercsei 34, Freyn 71, Wolff 68)

46. *H. australis* (Schrad.) R. et Sch. (EK. 271) — Kv. Szénafű, Apahida, Örd.füzes, Coptelke, Mócs, M.szovát, Katona-Kiscég, Vszt.gothárd-Gyeke, Móró-Tötör. — Dés (Pr. BCL. XVI. 87), Torda (Fuss Trans. 703)

47. *Stipa capillata* L. — Kv. Szénafű (Soó GM. 83, AGH. V. 146, Ujv. Kv. 645, Meusel 201, 302), Szamosfa-Dezmér (Ny. Kv. 54), Apahida(!), K.bós, Berkenyes, Virágosv. (Freyn 71), Kolozs (Schur En. 742, Fr. I. c.), -Apahida (Hayek 465, Pr. Fl. II. 294), Zsuk (Pr. Cp. 152), K.horsa(!), Szújvár (K. et O. 24), B.váralja (Hg. III. 127), Szt.gothárd (Janka ap. Simk. 568), Feketelak (Janka ap. Fuss Trans. 715), Szék, Pujon-Ombozelke, Kályán(!), N.sármás-Báld (Pr. FK. 1914 313, Cp. 146), Kékes, A.sztmiklós, Sz.ens, Mócs (Pr. Cp. 92—94), M.szovát (Pr. Cp. 94, Borza-Pop Guide 165, 208), Sós-patak (Pr. Cp. 153), Teke-M.királyfa, M.sztmihály (Pr. BCL. XVI. 87), Szabéd (Lengy.), M.záh (Wolff 68, Pr. Cp. 93), Gerend-Egerbegy (Wolff I. c.), Torda (Freyn I. c., Todor 46), M.kece (Ny.)

48. *S. Lessingiana* Trin. et Rupr. — Kv. Szénafű (Freyn 71, Simk. MNL. III. 91, Soó GM. 98, Kv. 645, AGH. V. 147, VI. 32, Pr. Cp. 95, 134—141, Fl. II. 204—212, Meusel 301, Ny. Kv. 54), Apahida (Janka ÖBZ. XVIII. 340) -K.kara, Telekfarka (Soó 103, Kv. 645), Kolozs (Janka I. c. 267, Freyn I. c., Soó Kv. 645), K.bós, Virágosv. (Freyn I. c.), Zsuk (Ny. Kv. 54), K.borsa-Válaszút (Soó AGH. V. 144), Kályán, Cege, Feketelak-Vszt.gothárd-Ombozelke (Soó 104, AGH. I. c.), Katona-Kiscég, M.palatka, Vszt.gothárd (Janka ÖBZ. XIII. 364, XVIII. 232, 340, MTK. XII. 169), Novaly-Gyeke (Janka ap. Simk. En. 568), F.mikola (Hg. II. 68), Buza (Porec ap. Soó 103), M.szovát (Péterfi MBL. XVII. 59, Pr. FER. 107, BCL. XVI. 87, Borza-Pop Guide 165, 207), M.bánd-M.bergenye (Pr. Cp. 153), M.sztmihály (Pr. BCL. I. c.), M.záh, M.csávás, Sóspatak, M.ludas

(Ny. ap. Soó 103), Szabéd (Lengy. ap. Soó l. c.), Gerend, Egerbegy (Wolff 68, Barth 117), Torda-Sósf. (Todor 46) — cf. Soó Scripta III. 103—4.

49. *S. stenophylla* Czern. — Kv. Szénafű (Simk. MNL. III. 91, Borb. MNL. X. 117, Soó BK. XXII. 71, GM. 97, Kv. 645, AGH. VI. 29, V. 143—4, Pr. Cp. 133, BCl. XVI. 87, Ny. FER. 1430, Kv. 55, Meusel 201, Ghisa BCl. XXI. 60, Pr. Fl. II. 214—8), Kolozs (Janka MTK. XII. 169), K.bós (Pr. Fl. l. c.), Egerbegy, Mórke (Ghisa l. c.), Fejérd-Telekfarka-Apahida, Bonchida-Szék (Soó AGH. VI. 29), Gyeke-Csehtelke (Janka l. c.), Mócs, Szombattelke-Novaly (Janka ap. Simk. En. 568), Faragó-N.nyulas (Ny.), Torda (Janka MTK. l. c., Todor 46)

50. *S. pulcherrima* C. Koch — Kv. Szénafű (Soó BK. XXII. 71, GM. 98, Kv. 645, AGH. VI. 30, V. 149, Pr. Cp. 134, BCl. XVI. 87, Ghisa FER. 1855, auct. multi ap. Ny. Kv. 54, 645, Meusel 301, Pr. Fl. II. 220), K.bós (Pr. Fl. II. 202), Szék (Soó 103), Katona-Kiscég (Janka ÖBZ. XVIII. 232, MTK. XII. 169), Vsztgothárd (Janka ap. Soó 103), M.szovát (Borza Guide 208, Pr. Fl. II. 212, Ny. ap. Soó 103), M.bánd (Pr. BCl. XVI. 87), Gerend (Simk. En. 568), M.záh, A.gyéres, Egerbegy (Ny. l. c.), Torda (Wolff FEAH. 3987, Todor 46) — cf. Soó Scripta III. 103.

51. *S. pennata* L. (*S. Joannis* Cel.) — Kv. Szénafű (Soó GM. 89, Pr. Cp. 95, Bélteki, Ujv. ap. Ny. Kv. 55, 645, Meusel 201, 301, Pr. Fl. II. 220), Kolozs, K.bós, Virágosv., Ajton, Berkenyes (Freyn 71 anne p. p.?), Szújvár (K. et O. 24, Pr. Cp. 264), M.sztmihály (Pr. BCl. XVI. 87), Sóspatak (Pr. Cp. 153), Szabéd (Szakmáry 117)?, M.csávás, M.vásárhely (Ny. Mv. 4), M.záh (Ny.), Egerbegy, Gerend (Wolff 68), A.gyéres (Ercsei 71), Torda (Freyn 71, Sebők 44)

52. *Milium effusum* L. — (EK. 271) — Fejérd, Ajton, Szújvár, F.mikola, Szu.németi, Coptelke, Bonchida-Szék, N.sármás, Báld, P.kamarás, B azéd, M.vásárhely, Doboka-Móró-Tötör.

53. *Crypsis aculeata* (L.) Ait. — Kv. Szénafű (Landoz EM. II. 39, Pr. Cp. 140) -Fejérd (Ny. Kv. 645), Szamosfa (Csürös BCl. XXVII. 80), Kolozs (Schur En. 730, Freyn 71), Zsuk, Szújvár-Szék (Pr. BCl. XVI. 87), Hesdát (Pr. Cp. 246, Fl. II. 296), Szújvár-Dés, Vsztgothárd (Janka 614, MTK. XII. 168), Vszt.iván (Bgt. III. 201), K.sármás (Ny.), M.záh (Simk. En. 562), Virágosv. (Wolff 68)

54 *Heleochnloa schoenoides* (L.) Host — Kv. Melegv. (Ny. Kv. 645), Szamosfa, Apahida (Landoz Em. II. 39, Soó GM. 100, in Gr. 449, Kv. 645, Pr. BCl. XVI. 87, Priszter 84), Kolozs (Bgt. III. 200, Freyn 71, ap. Ny. Kv. 55), Virágosv. (Wolff 68), Szújvár-Szék (Janka 614, Pr. Cp. 246), Vsztgothárd (Janka MTK. XII. 168), M.bő, M.cikud, M.záh (Simk. En. 562), K.sármás, M.ludas (Ny.)

55. *H. alopecuroides* (Pill. et Mitterp.) Host — Vsztgothárd-Pujon (Janka 614, MTK. XII. 168)

56. *Phleum pratense* L. incl. *b. nodosum* (L.) Schreb. — Frequens.

57. *Ph. phleoides* (L.) Karsten. — Frequens, sed hinc-inde sequenti rarior.

58. *Ph. montanum* C. Koch — Kv. Szénafű (Simk. MNL. II. 153, Soó GM. 89, Pr. Cp. 135, BCl. XVI. 87, Meusel 201, 301, auct. multi ap. Ny. Kv. 55—56, 645, Soó AGH. V. 144—9), Dezmér, Apahida (Ny. l. c., Soó AGH. V. 144), M.szovát-M.gyéres (Péterfi MBL. XVII. 60), Kecsed (Hg. I. 126), Désakna (Hg. II. 71), B.váralja (Hg. III. 128), K.borsa (Soó AGH. V. 144), Bonchida-Szék, Bonchida-K.iklód, Cege, Pujon (Soó 104), Szújvár(!), Vszt.gothárd (Janka ap. Simk. En. 563), Szabéd (Lengy. ap. Soó l. c.), M.vásárh. (Ny. Mv. 9), Torda-Sósf. (Todor 46 sub „*Ph. hirsuto*“)

59. *Alopeurus pratensis* L. — Frequens. — *f. glaucus* Sond. Torda (Todor 47)

60. *A. geniculatus* L. — Loca natalia certa : Szamosfa (Borb. ap. Ny. et Ny. Kv. 57), Apahida (Ny. l. c.), M.vásárh., M.ludas (Ny.), Torda (Ercsei 46)?

61. *A. aequalis* Sobol. (*A. geniculatus* auct. e terr. p. p.) — Frequens.

62. *Agrostis canina* L. — Kv. Szénafű (Soó, Ujv. Kv. 645), Torda-Sósfürdő (Todor 47), Cege (Soó 104), Apahida-Kályán(?)

63. *A. capillaris* L. (*A. tenuis* Sibth.) — Frequens.

b. dubia (Lam. et DC.) A. et G. — K.bós-Virágos v. (Ny. Kv. 58)

64. *A. alba* L. emend. resp. *A. gigantea* Roth (*A. alba genuina* et *gigantea*) Frequens in formis multis (*f. gigantea* (Gaud.) Mey., *f. diffusa* (Host) A. et G., *f. flavidia* (Schur) A. et G.) etc. *b. compressa* (Willd.) A. et G. — Kv. Szénafű (Soó BK. XXV. 143)

64a. *A. alba* ssp. resp. *A. stolonifera* L. (*A. alba prorepens et maritima*) — anne in territorio ?

65. *Calamagrostis epigeios* (L.) Roth — Frequens.

66. *C. arundinacea* (L.) Roth — (EK. 271) — Kv. Szénafű, Doboka-Móró.

67. *C. canescens* (Web.) Roth — Kv. Szénafű : Harmadv. (Nyár. FK. 50, Kv. 59), Szújvár, Vszt.iván (Bgt. III. 211)

68. *C. pseudophragmites* (Hall. f.) Koel. — Kv. Szamospart (Ny. Kv. 58), Bonchida (Soó 104), M.szovát (Pop Guide 165)?

69. *Holeus lanatus* L. — Frequens.

70. *Deschampsia caespitosa* (L.) P. B. — Frequens, in formis multis ; etiam *b. parviflora* (Thuill.), Kv. Szénafű (Ujv. Kv. 645), Kecsed (Hg. I. 126) — *e. varia* (W. et Gr.) Volk. — Kv. Szénafű (Soó BK. XXV. 143)

71. *D. flexuosa* (L.) Trin. — Kv. Szénafű (Schur ÖBZ. IX. 327)?, Ajton (Freyn 72), M.sztmihály (Pr. BCl. XVI. 88), an vero?, M.vásárh. (Ny. Mv. 9)

71a. *Aira caryophyllea* L. — Ad limites : Teke-M.királyfalva (Pr. Fl. I. 72)

72. *Trisetum flavescens* (L.) P. B. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 109, Pr. Cp. 137, Borb. ap. Ny. et Ny. Kv. 60), Kolozs (Bgt. III. 263), Szék (Soó 104 cum *f. variegatum* (M. et K.) Asch.), Szújvár (K. et O. 25), F.mikola (Hg. II. 66), Kecsed-Doboka-Móró (Hg. I. 126—130), M.szovát (Pr. BCl. XVI. 88), Torda, Sósf. (Todor 47), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 10)

73. *Ventenata dubia* (Leers) F. Schultz — Kv. Szénafű (Soó GM. 89, Pr. Cp. 140, Ny. FER. 343, Kv. 60), Buza (Pr. Cp. 145), Cege (Soó 104)
74. *Avena fatua* L. — Kv. Szénafű (Ny. Ujv. Kv. 646), Kolozs (Brassai ap. Ny. l. c.), Dengeleg (Lengy.), Gyulatelke (Morariu 191) — *b. glabrata* Peterm. Kv. Szénafű: Kuph. (Ny. l. c.) — *f. flavescens* Schur — Kv (Schur ÖBZ. X. 71)
- *A. sativa* L. — Subspont. Apahida (!Priszter 85)
75. *Avenastrum pubescens* (Huds.) Jess. — Kv. Szénafű (Soó GM. 82—89, AGH. V. 143, 148, Pr. Cp. 134—142, Ny. Kv. 61), Apahida (Pr. Cp. 143), Kolozs, K.bós (Freyn 72), Kékes, Buza (Pr. Cp. 144—5), Sz.újvár (K. et O. 5, Hg. II. 68), K.borsa(!), M.záh (Ny.) Torda (Freyn 72, Todor 47)
76. *A. pratense* (L.) Jess. *praecipue b. megastachyum* (Borb.) Soó — Kv. Szénafű (Soó GM. 89, Pr. Cp. 136, BCl. XVI. 88, Ny. Kv. 61, Meusel 300—1), Kolozs (Freyn 72, Meusel 301), K.bós, Virágosv. (Freyn 72) — *f. pubescensiforme* Nyár. — Apahida-K.kara (Soó Kv. 645)
77. *A. adsurgens* (Schur) Jav. — Kv. Szénafű (Land., Borb., Ny. Kv. 61, Soó Kv. 645, AGH. VI. 29, Pr. Fl. II. 444), Sz.újvár (Hg. II. 68)
78. *Arrhenatherum elatius* (L.) Presl. Frequens. — *b. biaristatum* Peterm. — Torda-Sósf. (Todor 47)
79. *Danthonia provincialis* Lam. et DC. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 109, En. 764, Janka 621, Soó GM. 89, AGH. V. 144, VI. 25—6, Pr. Cp. 135—6, auct. multi ap. Ny. Kv. 62, 646, Ghisa BCl. XXI. 60, Borza etc. FER. 344), Fejér (Ny. l. c., Soó AGH. VI. 25) Apahida (Ny. l. c., Soó AGH. V. 153, VI. 25—6), Kolozs, Virágosv. (Freyn 72), K.bós (Freyn l. c., Ghisa l. c. 65), Ajton (Ny. l. c.), Sz.újvár (Pr. Cp. 143, Hg. II. 68, Soó AGH. VI. 26), F.mikola (Hg. II. 66), Aranykút, Mócs (Ghisal. c. 65), Bonchida, Szék, Cege, Kályán(!), K.borsa (Soó AGH. V. 25), Doboka-Moró-Tötör-Kecsed (Hg. I. 126—130), Torda (Wolff 68, Todor 47)
80. *Sieblingia decumbens* (L.) Bernh. — Kv. Szénafű-Fejér (Ny. Kv. 62), Sz.újvár (Harg. II. 68), Cege (Soó 104)
81. *Cynodon daetylon* (L.) Pers. — Frequens, sed hinc-inde deest.
82. *Sesleria Heufleriana* Schur — Apahida „Csuhá“ (Pr. Cp. 18, 99, 142, Ny. Kv. 62, Soó AGH. VI. 25), Kolozs (Janka ap. Ny. l. c., Meusel 301), K.bós (Freyn 72), Katona-Kiscég (Janka ÖBZ. XVIII. 23), Budatelke (Pr. Cp. 184), F.mikola (Hg. II. 68), Bonchida, K.borsa (Soó 104, AGH. VI. 25)
83. *Phragmites communis* Trin. incl. *b. flavescens* Cust. — Frequens.
84. *Diplachne serotina* (L.) Lk. — Kv. Szénafű, Melegv., (Janka 621, Soó GM. 97, Kv. 646, Wolff, Ny. ap. Ny. Kv. 63), M.szovát (Ny. l. c.), Kolozs, K.bós (Freyn 73), Vszt.-gothárd (Janka ap. Fuss VSV. XX. 179), M.záh, Gerend (Simk. En. 582), Torda (Wolff 68), Bazéd (Lengy.)
85. *Molinia coerulea* (L.) Mönch — Kv. Szénafű, (Ny. FK. 46,

- Kv. 646), Ajton (Freyn 73), Buza (Pr. Cp. 145), Teke-M.királyfa (Pr. BCl. XVI. 88), Szabéd, Bazéd (Lengy.) — *b. arundinacea* (Schrink) Asch. — Kv. Szénafű (Ny. FK. 63, Soó Kv. 646), Kályán (Soó 104)
86. *Eragrostis pilosa* (L.) P. B. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 110), Szszt.miklós-Apahida(!), Kolozs (Ujv. Kv. 646), Sz.újvár (K. et O. 11), M.kece (Nyár.)
87. *E. poaeoides* P. B. (*E. minor* Host) — Sz.újvár (K. et O. 11), Kékes (Pr. Cp. 165), M.kece (Ny.).
E. megastachya (Koel.) Lk. Ad limites : Szamosfa (Landoz EM. II. 39)?
88. *Koeleria glauca* (Schk.) DC. resp. *b. Rochelii* (Schur) Dom. — Kv. Szénafű (Schur ÖBZ. VII. 321 (?), Simk. En. 571, Soó GM. 89), Apahida-Kolozs (Hayek 465), Kolozs-Torda (Janka MTK. XII. 169), Gerend (Simk. En. 571)
89. *K. splendens* Presl *b. rigidula* (Simk.) Dom. — M.szovát, Torda (Pr. BCl. XVI. 88)
90. *K. gracilis* Pers. — Frequens, in formis multis : *b. glabra* Janka — Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 147, Ny. Kv. 64), Szabéd (Lengy.) — *c. Borbásii* Dom. — Ky. Szénafű (Soó l. c.) — *d. flexilis* Janka (*flaccida* Dom.) — Mezőség (Domin Mon. Koel. 188, 192), Vszt.-gothárd (Janka 619, ÖBZ. VIII. 93), Torda-Sósf. (Todor 48) — Formae : *f. rubicunda* (Schur) Kolozs (Schur En. 751), *f. violascens* Üchtr Torda (Todor l. c.)
91. *K. pyramidata* (Lam.) Dom. — Kv. Szénafű (Pr. Cp. 135—7), Apahida (Pr. Cp. 143)
92. *K. glauca* × *gracilis* (*hungarica* Domin) — M.szovát (Pop Guide 165, Pr. Fl. I. 1232)
93. *Catabrosa aquatica* (L.) P. B. — Kv. Szénafű (Schur VSV. 110, Soó GM. 94, AGH. VI. 7, Pr. Cp. 137, 140, Ny. EM. 15, FK. 52, Kv. 65, Ujv. Kv. 646, Péterfi FER. 129 etiam *b. uniflora* SFGray), Szamosfa-Apahida (Schur VSV. X. 113, En. 779 *f. salina*, Soó GM. 100, in Gr. 251, Prister 85), Kolozs (Schur l. c. 112, Hayek 465), Ajton (Ny. Kv. 65), P.kamarás (Pr. BCl. XVI. 88), Sz.újvár (Hg. II. 69), Bonchida, Szék, Cege, K.borsa(!), M.szabad, M.vásárh. (Ny. Mv. 6), Torda (Schur VSV. X. 112, Todor 48)
94. *Melica ciliata* L. incl. *b. flavescens* Schur — Frequens.
95. *M. transsilvanica* Schur — Kv. Szénafű (Schur ÖBZ. IX. 328, Soó GM. 89, 97, Ny. Kv. 66), Apahida (Soó Kv. 646), Szék (Soó 104), Torda-Sósf. (Todor 48), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. Suppl. 10) — *b. Holubyana* Schur Ombozelke (Soó 104)
96. *M. altissima* L. — Cege (Soó 104)
97. *M. uniflora* Retz — (EK. 271) — Apahida, Cege-Pujon-Vszt.-egyed, B.váralja, Bál, M.ménes, Teke, Mojos
98. *M. nutans* L. — (EK. 271) — Kolozs, Sz.újvár, F.mikola, B.váralja, Coptelke, Szék, Pujon, Vszt.-gothárd, Korpád, Dezmér, Mócs, M.szovát, Kékes, M.bánd, M.szilvás, Bál, Mojos, Bazéd, M.vásárh., Doboka-Moró-Tötör, Torda(!)
99. *M. pietra* C. Koch (EK. 271—2) — Dezmér, Kolozs, F.mikola, Vszt.-gothárd-Gyeke, M.záh saepe *f. rubriflora* Seemen.
100. *Briza media* L. — Frequens.

101. *Dactylis glomerata* L. — Frequens. — **b. abbreviata** (Bernh.) Drej. — Szamosfa, Apahida (Soó BK. XXIII. 147, GM. 101, Borb. ap. Ny. Kv. 67), Torda-Sósf. (Todor 48) — **c. ciliata** Peterm. Torda (Todor 48)

ssp. *Aschersoniana* Graebn. incl. *pendula* Dum. (EK. 272) — Dezmér, Sz.újvár, B.váralja, Zsuk, Kékes, N.sármás, Teke, M.vásrh.-Torda (Todor 48)

102. *Cynosurus cristatus* L. — Kv. Szénafű (Soó GM. 86—9, Kv. 646, Pr. Cp. 136, Ny. Kv. 68), Apahida (Soó AGH. V. 153), Kolozs (Pr. BCI. XVI. 89), Ajton (Freyn 73, Ny. l. c.), Bonchida-Szék-Sz.újvár (K. et O. 9, Pr. Cp. 143), F.mikola (Hg. II. 66), Doboka-Kecsed (Hg. I. 130), Cege, Vszt.gothárd-Feketelak, Kályán(!), Buza (Pr. Cp. 145), Bazéd, Sárpatak (Lengy.), M.vásrh. (Ny. Mv. 6), Torda (Todor 48)

103. *Sclerochloa dura* (L.) P. B. — Frequens.

104. *Poa pratensis* L. *praecipue* var. (ssp.) *angustifolia* (L.) Sm. (Lindbg. f. p. ssp.) Frequentes. — **e. setacea** (Hoffm.) Döll. — Bonchida-Szék (Soó 104)

105. *P. trivialis* L. — Frequens, in formis multis : *f. multiflora* Rchb. — Szamosfa (Ujv. Kv. 646), — *f. stricta* Döll. et *f. effusa* A. et G. — Torda-Sósf. (Todor 48)

106. *P. annua* L. — Frequens.

107. *P. compressa* L. — Frequens. — *f. picta* Beck et *f. umbrosa* Junge — Torda-Sósf. (Todor 48) — **b. Langeana** (Rchb.) Koch Ad fines : Diós (Ny. Kv. 70)

108. *P. bulbosa* L. incl. *m. crispa* (Thuill.) — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 110, Soó GM. 86—9, Pr. Cp. 95, Ny. Kv. 69), Apahida (Ny. l. c.), K.borsa(!), Sz.újvár (K. et O. 19), Torda (Ercsei 122, Schur En. 772, Todor 46)

109. *P. nemoralis* L. **a. vulgaris** Gaud. et **b. tenella** Rchb. (EK. 272) — In silvis frequens

c. firmula Gaud. — Fejér (Ujv. Kv. 646) — **d. rigidula** M. et K. — Kv. Szénafű (Ny. Kv. 70) — **e. agrostoides** A. et G. (verg.) Doboka-Moró (Hg. I. 128)

110. *P. palustris* L. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 110, Soó GM. 92, Ny. FK. 43), Kajántó, Apahida (Ny. Kv. 70), Kolozs, Berkenyes (Freyn 73), Bonchida(!), Sz.újvár (K. et O. 19, Pr. Cp. 74), Szabéd (Lengy.), Torda (**b. effusa** Rchb. Todor 46)

111. *Glyceria maxima* (Hartm.) Holmbg. — Frequens. — **b. arundinacea** (M. B.) Asch. — Apahida (Ny. Kv. 71)

112. *G. fluitans* (L.) R. Br. — Frequens. — **b. loliaeae** (Huds.) Asch. — Kajántó (Ny. l. c.)

113. *G. plicata* Fr. — Kv. Szénafű (Ny. FK. 47, 50, Kv. 72, Soó Kv. 646, Pr. Fl. II. 343), Szamosfa(!), Dezmér-Pata (Ny. l. c.), P.kamarás (Pr. BCI. XVI. 89), Sz.újvár (Hg. II. 69), K.borsa-Válaszút, Bonchida, Cege-Hodostó(!), M.szabad (Ny. Mv. 7), Szabéd (Lengy.)

114. *Puccinellia distans* (L.) Parl. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 110, Soó GM. 100, BK. XXII. 71, Pr. Cp. 140, Ny. Ujv. Kv. 647), Szamosfa (Soó l. c. in Gr. 250, Consp. 32), Apahida, K.kara, K.bós, Virágosv. (Freyn 73), sed loca natalia p. p. dubia.

ssp. *limosa* (Schur) Játv. — In pratis humidis salinis frequens. (cf. Bgt. III. 232, Ercsei 107, Schur VSV. l. c., ÖBZ. X. 249, Janka ÖBZ. XII. 170, MTK. XII. 170, Simk. En. 585, Soó GM. 100, Kv. 647, AGH. V. 152—3 sub *P. distantii* s. l., VI. 19, in Gr. 248, Consp. 28—34, 50—1, Pr. Cp. 79, 96, 140—1, 227, Ny. EM. 110—3, Kv. 72, Ujv. Kv. 647, Péterfi FER. 28a-c, Pr. Fl. II. 273, 294—8, Todor 49) ssp. *transsilvanica* (Schur) Soó — (*f. violacea*, *variegata*, *viridis* Nyár.) — Kv. Szénafű (Simk. En. 586, Hayek 466, Soó BK. XXII. 147, Kv. 647, Consp. 32—4, Ny. Kv. 72, Ujv. Kv. 647), Szamosfa-Szszt.miklós-Apahida-K.kara (Schur VSV. 113, Soó BK. l. c., GM. 99, AGH. V. 143, Kv. 647, Consp. l. c., Borb., Szabó ap. Ny. Kv. 72, Ny. Ujv. Kv. 647), Dezmér (Pr. Fl. II. 292), Kolozs (Bgt. III. 232, Schur l. c. 112, Én. 790, Hayek 465, Soó Consp. l. c.), Torda (Bgt. l. c., Schur VSV. X. 81, ÖBZ. X. 249, Hayek 467, Pr. Cp. 226, Todor 49, Degen FEAH. 3960), M.záh (Simk. En. 586), Désakna (Pr. Fl. II. 298 sub „*P. Peisonis*“)

115. *Festuca ovina* L. ssp. *vulgaris* (Koch) Sch. et K. — (EK. 272) — Kv. Szénafű „Tekintő“, Ajton (Ny. Kv. 74), M.szovát (Borza Guide 208)?

116. *F. sulcata* (Hack.) Nym. = *F. rupicola* Heuff. emend. — Frequens, in formis multis : sic **a. sulcata** (Hack.) Soó, **b. eurupicola** Soó. — **c. hirsuta** (Host) Soó Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 147, Pr. Cp. 135, Ny. Kv. 75), Sz.újvár (K. et O. 12)?, Torda (Todor 50) — *f. strictiflora* Nyár. Kv. Szénafű (Ny. l. c.)

117. *F. valesiaca* Schleich. — Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 147, GM. 89, AGH. V. 143, Ny. Kv. 75, Meusel 201, 301), Szamosfa (Soó Kv. 647), Apahida (Ny. l. c., Soó AGH. V. 143, 151), Torda-Sósf. (Todor 49)

b. banatica Deg. — Kv. Szénafű-Fejér (Ny. l. c.), Torda (Todor 49) — **c. angustiflora** Hack. — Kv. Szénafű (Pr. BCI. XVI. 90), Apahida (Soó Kv. 647), K.borsa (Soó AGH. l. c.), F.mikola (Hg. II. 68) — **d. tenuis** Hack (*meredisensis* Nyár.) — Kv. Szénafű (Soó BK. l. c., Kv. 647, Ny. l. c.), Apahida (Ny. FER. 730a), Torda (Todor 49), Sz.újvár (Soó AGH. l. c.), F.mikola, B.váralja (Hg. II. 68, III. 127 ad ssp. *pseudodalmaticam* verg.)

ssp. *pseudodalmatica* (Krajina) Soó — Sz.újvár (Hg. II. 67), Torda-Sósf. (Todor 50)

Dubiae : *F. stricta* Host — Mezőség (Schur En. 789 sub *F. panonica* sec. Simk. En. 589), Kolozs, Torda (Bgt. III. 243)

F. vaginalis W. et K. — Kolozs (Schur En. 790, cf. Simk. En. 588)

118. *F. pseudovina* Hack (ap. Wiesb. 1880). — Frequens, in formis multis, extra typum (*parviflora* Hack.) etiam **b. salina** (Kern.) Hack in stepposis salinis (cf. Soó BK. XXIII. 147, GM. 101, Kv. 647, Consp. 49—55, Ny. Kv. 76, Todor 50, Csürös BCI. XXVII. 80—2) — **e. hirtiflora** Borb. Kv. Szénafű (Ny. l. c.) — **d. subpruinosa** Borb. — B.váralja (Hg. III. 127) Transit in *F. sulcatam* (cf. Ny. l. c., Soó Kv. 647 : Kv. Szénafű, Szamosfa-Apahida etc.) et in *F. valesiacam* (Hg. I. 127)

119. *F. rubra* L. ssp. *vulgaris* (Gaud.) Hay. — Kv. Szénafű

(Soó GM. 86, Pr. Cp. 135, Ny. Kv. 76), Fejérd (Ny. I. c.), Sz.újvár (Pr. Cp. 143), M.szovát (Pr. BCl. XVI. 90), M.szilvás, Kékes, Buza (Pr. Cp. 102, 108, 145), Bazéd (Lengy.), M.vásrhely (Ny. Kv. 12), Cege, K.borsa(!), Doboka-Kecsed (Hg. I. 130), B.váralja (Hg. III. 126)

ssp. *fallax* (Thuill.) Hack. — Kv. Szénafű-Fejérd (Ny. Kv. 77, Soó, Ujv. Kv. 648), Sz.újvár (Hg. II. 67)

120. *F. heterophylla* Lam. — (EK. 272). — Ajton, Aranykút, Berkenyes, Teke-M.királyfa, Apahida, Korpád, Pujon-Ombozelke, Vszt.gothárd, B.váralja, Coptelke. — M.vásrhely (Ny. ap. Soó Szf. Suppl. 12)

121. *F. gigantea* (L.) Vill. — (EK. 272) — Fejérd, Sz.újvár, Bonchida, Szék, Kékes, P.kamarás, Bazéd, M.vásárh.

122. *F. arundinacea* Schreb. — Kv. Szénafű (Soó GM. 95, Pr. Cp. 137, BCl. XVI. 91, Ny. FK. 48, EM. 109, Kv. 78), Melegv. (Pr. Fl. II. 291), Szamosfa (Soó AGH. V. 152, Csűrös BCl. XXVII. 81), Apahida, Ajton (Ny. I. c.), K.borsa(!), Bonchida (!Pr. Fl. II. 340), Szék (!), Torda-Sósf. (Todor 50)

b. *orientalis* (Kern.) Hack* — Apahida (Ny. FER. 1869), Torda (Todor 50), Kecsed (Hg. I. 126)

123. *F. pratensis* Huds. — Frequens. — b. *subspicata* (Mey.) A. et G. — Kv. Szénafű-Melegv. (Ny. Ujv. Kv. 647)

124. *F. pratensis* × *rubra* (*hojensis* Prod.) — Apahida (Csűrös ap. Ny. Kv. 640 f. *Csűrösii* Nyár.)

Dubia: *Vulpia bromoides* (L.) Gray. — Sz.újvár (K. et O. 27) anne introducta?

125. *Bromus secalinus* L. — Kv. Szénafű (Ny. Kv. 80), Szamosfa (Borb. ap. Ny. I. c.), Kolozs-K.bós (Ny. I. c. b. *submuticus* Rchb.), Sz.újvár (K. et O. 6), Dés, Sz.lekence (Lengy.), Kékes (Pr. Cp. 144), M.sztmihály (Pr. BCl. XVI. 92), M.ludas, M.kece (Ny.), B.váralja (Hg. III. 125 et e. *elongatus* (Gaud.) A. et G.), Torda (Todor 50)

126. *B. arvensis* L. — Kv. Szénafű (Pr. Cp. 168), Melegv. (Pr. Fl. II. 291), Sármás-Báld (Pr. FK. 1914. 313, Cp. 78), Szabéd (Szakmáry EK. VII. 117), Gyulatelke (Morariu 191), Désakna (Pr. Fl. II. 298), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 15)

ssp. *hyalinus* (Schur) Domin — Kolozs (Ny. FER. 1181)

127. *B. mollis* L. — Frequens. — b. *Bujoreani* Borza et Buia — Torda-Sósf. (Todor 50)

128. *B. commutatus* Schrad. — Frequens. — b. *apricorum* Simk. — Apahida (Soó BK. XXV. 143)

c. *depauperatus* Úchtr. — Dezmér (Ny. Kv. 647), Torda-Sósf. (Todor 50)

129. *B. japonicus* Thunbg. — Kv. Szénafű (Pr. Cp. 135, Ny. Kv. 81), Szamosfa (Ujv. Kv. 647), Apahida (Ny. I. c.), M.szovát, Kékes (Pr. BCl. XVI. 93), Torda (!Todor 50)

b. *subsquarrosum* Borb. — Kv. Szénafű (Pr. Cp. 136, 168, Soó Kv. 647), Apahida, Kolozs, K.bós (Ny. Kv. 81), K.borsa(!), Kékes (Pr. BCl. XVI. 93), Torda (Hackel MBL. II. 60, Todor 50)

* v. *aristata* Schur (Ny. Kv. 78) ad *F. pratense* pertinet.

130. ***B. ramosus*** Huds. — (EK. 272) — Ajton, M.szilvás, N.sármás. ssp. ***Benekenii*** (Lange) Sch. et Th. — Fejérd, Szabéd.

131. ***B. inermis*** Leyss. — Frequens. — b. *villosus* (M. et K.) Beck — M.vásárh. (Ny. Mv. 11)

132. ***B. erectus*** Huds. — Kv. Szénafű (Pr. BCl. XVI. 93, Meusel 300), Kolozs (Pr. I. c.), Torda-Sósf. (Todor 50) — b. *Hackelii* Borb. Kv. Szénafű (Ujv. Kv. 647)

133. ***B. sterilis*** L. — Frequens. — b. *lanuginosus* Rohl. Torda-Sósf. (Todor 50)

134. ***B. teetorum*** L. — Frequens. — b. *longipilus* (Kumm. et Sendtn.) Borb. Torda-Sósf. (Todor 50)

135. ***Bromofestuea*** (*B. erectus* × *Festuca arundinacea*) *cojocenensis* Prod. — Kolozs (Pr. BCl. XVI. 95), Cf. Ny. Kv. 83. 647—8.

135a. ***Braehypodium pinnatum*** (L.) P. B. — Frequens. — b. *loliaceum* (Ten.) A. et G. — Kv. Szénafű, Apahida (Kv. Ny. 84)

136. ***B. silvaticum*** (Huds.) P. B. — (EK. 272) — Kv. Szénafű-Fejérd, Sz.jenő, Iklód, Bonchida-Szék, Szék, Vszt.egyed, Pujon, Vszt.gothárd, Feketelak, Kályán, Kékes, M.sztmihály, Bazéd, Szabéd, Sz.újvár, B.váralja, K.borsa, Doboka-Moró, Torda (Todor 51)

137. ***Lolium perenne*** L. — Frequens. — b. *tenue* L. M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 15)

138. ***L. temulentum*** L. — Torda (Wolff 68, ap. Ny. Kv. 84)

139. ***L. remotum*** Schrank — Sz.újvár „Kovrig-kert“ (K. et O. 16, an vero?) Quid sit „*L. rigidum*“ Gaud. Sz.újvár (I. c.)?

140. ***Agropyrum cristatum*** (L.) R. et Sch. — Kv. (?) Kolozs (Schur En. 807), Virágosv. (Freyn 74), Egerbegy (Wolff 68), Kiscég (Janka MTK. XII. 170), M.záh (Pr. Cp. 93), M.sztmihály, Teke-M.királyfa (Prod. BCl. XVI. 96), Szabéd (Szakmáry 117), Gerend, M.ludas (Ny.)

141. ***A. intermedium*** (Host) P. B. — Frequens. — b. *arenicola* (Kern.) Jav. Kv. Szénafű (Soó BK. XXII. 71, Ny. Kv. 85, 648), Apahida (Ny. Kv. 85), Cege(!), Torda-Sósf. (Todor 51)

ssp. *trichophorum* (Lk.) Volk. (*villosum* (Sadl.) Jav.) — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 109, Soó GM. 89, BK. XXII. 71, Pr. Cp. 137, Ny. Kv. 85, Görtler FER. 1185), Melegv.(!), Apahida, Ajton (Ny. I. c.), Kolozs (Schur I. c. 112), Cege(!), Szabéd (Lengy.)

b. *villiferum* (Borb.) Jav. — Kv. Szénafű (Pr. Cp. 137, Soó Kv. 648), Cege (Soó 104), Szabéd (Lengy. ap. Soó I. c.) — f. *fluminense* Deg. — Apahida (Ny. Kv. 85) — c. *pilosulum* (Borb.) — Kv. Szénafű (Soó Kv. 648)

142. ***A. repens*** (L.) P. B. — Frequens. — b. *subulatum* (Schreb.) Rchb. — Apahida (Ny. Kv. 86), Kv. Szénafű, Szamosfa (Ny. Ujv. Kv. 648), Torda (Todor 51) — e. *aristatum* (Neilr.) Hay, — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 109), Apahida (Soó Kv. 648), Bazéd (Lengy. f. *Vaillantianum* Rchb.) — d. *pubescens* Döll. — Szabéd (Lengy.)

e. *glaucum* (Host.) Hay. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 109, Winkl. 60) — f. *caesium* (Presl) Beck — Torda-Sósf. (Todor 51) — *trichosum* Morariu — Torda-Sósf. (Todor 51)

143. ***A. caninum*** (L.) P. B. — Bonchida (Soó 104), Teke-M.királyfa (Pr. BCl. XVI. 96)

144. *A. intermedium* × *repens* (*apielatum* Tschermak) — K.bós-Virágosv. (Ny. Kv. 86)
Dubia : *Haynaldia villosa* (L.) Schur — Kolozs-Torda (Bgt. III. 270, Schur En. 807)
Secale cereale L. — Subspont. Kv. Szénafű (Ny. Kv. 87), Szamosfa (Borb. ap. Ny. I. c.), Torda (Todor 51)
Triticum aestivum L. — Subspont. Apahida (Priszter 85)
145. *Hordeum murinum* L. — Frequens.
146. *H. hystrix* Roth. — Kv. Szénafű (Winkler 50, Wolff, Béltkei ap. Ny. Kv. 88) Kolozs (Schur En. 812, Hayek 465), Torda (Schur I. c.), Désakna (Pr. Fl. II. 298), Szék (Soó 105)
H. distichon L. — Subspont. Apahida (Priszter 85)
Dubia : *H. bulbosum* L. — Apahida (Schur En. 812)

Cyperaceae.

147. *Pycreus flavescens* (L.) Rchb. — Torda (Wolff 67), Hesdát (Pr. Fl. II. 296)
Dubia : *Acorellus pannonicus* (Jacq.) Palla — Torda (Ercsei 120, Pr. Cp. 247) cf. Todor 54
148. *Cyperus fuscus* L. — Frequens, sed hinc-inde deest. —
b. virescens (Hoffm.) Koch Kolozs (Schur En. 588), Teke-M.királyfa (Pr. BCl. XVI. 96), M.vásárh. (Nagy ap. Soó Szf. Suppl. 12)
148a. *Chlorocyperus glomeratus* (Torn.) Palla — Apahida (Priszter AGH. VI. 85)
149. *Eriophorum gracile* Koch — Torda-Sósfürdő (Wolff 67, Todor 51)
150. *E. latifolium* Hoppe — Kv. Szénafű (Soó GM. 94 sub *E. polystachyo*!, Ny. FK. 51—2, 43, Kv. 90), Apahida (Péterfi ap. Ny. I. c.), M.csávás (Ny.)
151. *E. angustifolium* Honckeney (*E. polystachyon* L. p. p.) — Torda-Sósf. (Todor 51, FER. 2185), Ajton (Freyn 75, Ny. EM. 130)
E. vaginatum L. — Mezőség (Schur VSV. X. 119) certe delendum.
152. *Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla — Diós, Ajton (Ny. Kv. 90, EM. 107, 129), Sz.újvár (K. et O. 22, Pr. Cp. 74), N.sármás (Pr. FK. 312, Cp. 231), Cege (Pr. Cp. 221), Szabéd (Lengy.), Sz-kocsárd (Ny.), Torda (Ercsei 77, Todor 51)
153. *Sch. Tabernaemontani* (Gmel.) Palla — Frequens. —
b. capitatus (Hausskn.) Volk. — Kv. Szénafű (Soó BK. XXV. 143)
Dubiae : *Sch. triquetus* (L.) Palla — Sz.újvár (K. et O. 13), Torda (Ercsei 77)
Sch. setaceus (L.) Palla — Torda (Ercsei 77)
Holoschoenus vulgaris Lk. — Kolozs, M.újvár (Schur En. 694), Torda (Ercsei 77).
Dichostylis Micheliana (L.) Ness (Pr. MBL. V. 33, Cp. 78) : *Juncus articulatus* ! (Soó 105) Delenda.
154. *Scirpus silvaticus* L. — Frequens.
Dubia : *S. radicans* Schkuhr — Sz.újvár (K. et O. 22), ad fl. Szamos et Maros (Bgt. III. 322), Torda (Ercsei 77)

155. *Blysmus compressus* (L.) Panz. — Ad limites : Szamosfa (Ny. Kv. 91), Soó Consp. 44)
156. *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla — Frequens, in formis multis : typus (Kv. Szénafű : Ny. Kv. 91, Torda : Todor 51), **b. digynus** (Godr.) Ját. (vulgaris, cf. Todor 51), *f. compactus* (Hoffm.) Kv. Szénafű, Szamosfa (Ny. I. c. Soó Kv. 648), Torda (Todor 51) etc. — *f. monostachys* (Mey.), *f. macrostachys* (Willd.) Kneuck. cum typo (Soó BK. XXIII. 147, Todor 51)
157. *Eleocharis pauciflora* (Lighf.) Lk. — Ad limites : Szamosfa (Ny. Kv. 92)
158. *E. palustris* (L.) R. et Sch. — Frequens. — *f. minor* (Bgt.) Schur — Kv. Szénafű (Ny. I. c.), Kolozs (Schur En. 690) — *f. salina* Schur — Szamosfa, Apahida (Soó in Gr. 251, GM. 100)
ssp. mamillata (Lindb. f.) Podp. — Kv. Szénafű, Szamosfa-Szszt.miklós (Soó Kv. 648), K.borsa(!), Tötör-Moró-Kecsed (Hg. I. 126—8), Cege, Kályán (Soó 105)
159. *E. uniglumis* (Lk.) Schult. — Kv. Szénafű, Szszt.miklós-Apahida (Ny. Kv. 648), Torda-Sósf. (Todor 52)
Delenda : *E. acicularis* (L.) R. Br. — (Ercsei 77)
160. *Cladium mariseus* (L.) Pohl. — Ad limites : Szamosfa (Bujorean BCl. XIV. 227, Ny. EM. 113)
161. *Carex diandra* Schrank — Torda-Sósf. (Todor BCl. XXII. 201, FER. 1873, ap. Ny. Kv. 105, Todor 51), Sz.újvár (K. et O. 7)?
162. *C. paniculata* Juslen — Kv. Szénafű, Melegv. (Pr. Cp. 141, 233, BCl. XVI. 97), Ajton (Ny. EM. 30), Torda (Ercsei 133), cf. Soó 105.
Dubiae : *C. divisa* Huds. — Kv. Szénafű (Pr. Cp. 233), Apahida (Schur En. 699), Torda (Ercsei 133)
C. appropinquata Schum. — Kv. Szénafű (Pr. Cp. 233)
Delenda : *C. stenophylla* Wahlbg. — Torda (Sebők 44)
163. *C. vulpina* L. — Frequens. — **b. bracteata** CAMey. Kv. Szénafű, Szamosfa (Soó Kv. 648) — **c. erassinervis** (Schur) Kükenth. — Kv. Melegv., Szamosfa (Soó I. c., Consp. 28—9, 43—5), Szék-Gyulatölke (Soó Consp. 43—5)
164. *C. muricata* L. — (EK. 272) — Szamosfa-Apahida, Bonchida, Sz.jenő, Pujon, Sz.újvár, B.váralja, Vszt.iván, M.szilvás, Báld, N.sármás, Teke, M.szabad, M.vásárhely, Szászrégen. Torda (Ercsei 133, Sebők 42 „*C. nemorosa*“), Sósfürdő (Todor 51) etiam **b. remota** F. Schultz.
165. *C. divulsa* Stokes — Cege (Soó 105), Moró-Tötör (Hg. I. 127)
166. *C. praecox* Schreb. — Frequens. — **b. pallida** Peterm. — Kv. Szénafű (Soó Kv. 648)
167. *C. leporina* L. — Kv. Szénafű (Soó GM. 86, Ny. FK. 43), Szamosfa (Soó AGH. V. 142), Sz.újvár (K. et O. 26), F.mikola(!), Bazéd (Lengy.), M.vásárh. (Bgt. III. 287), Torda (Ercsei 133, Todor 52)
168. *C. disticha* Huds. — Kv. Szénafű (Pr. BCl. XVI. 97)?, Bánd (Pr. Cp. 233), M.szabad-M.vásárh. (Ny. Mv. 15)
169. *C. gracilis* Curt. — Kv. Szénafű (Soó GM. 95, Pr. Cp.

- 140—1, Ny. Kv. 97), Kajántó (Ny. Kv. 649), Sz.újvár, N.iklód (K. et O. 26)
- 169a. *C. caespitosa* L. — Ad limites : Ajton (Ny. Kv. 96, EM. 130), Torda (Ercsei 133)
170. *C. Buekii* W. et Gr. — Kv. Szénafű (Simk. MBL. II. 153, Soó GM. 95, Pr. Cp. 140—1, Ny. FK. 46, Kv. 96), K.bós (Pr. Cp. 139), Ajton (Ny. Kv. 96, EM. 137), Kolozsi-alagút (Ny. Kv. 96, f. *membranacea* Nyár.), Sz.nyires (Pr. Cp. 228), Bonchida (!), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. Suppl. 14) — f. *areticulosa* Nyár. Kv. Szénafű, Pata (Ny. BK. XXXVIII. 132)
171. *C. elata* All. — Torda (Ercsei 133), Sósfürdő (Todor 52)
172. *C. pallescens* L. — (EK. 272) — Kv. Szénafű, Ajton, Korpád, Sz.jenő, Sz.újvár, B.váralja, Báld, Szabéd, Bazéd, Galambod, Szászrégen — Torda (Sebők 39)
173. *C. tomentosa* L. — Frequens. — b. *globifera* Schur — Tötör-Moró (Hg. I. 128)
174. *C. montana* L. — Frequens.
175. *C. earyophyllea* Latour — Frequens.
- Dubia : *C. liparicarpos* Gaud. (*C. nitida* Host) Kv. (cf. Ny. BCI. IV. 96, BK. XXXVIII. 132, Kv. 100, 649), Mezőség (Schur En. 713)
176. *C. transsilvanica* Schur — (EK. 273) — Szabéd, Bazéd, Dés, M.vásárh. (Ny. Mv. 15)
177. *C. humilis* Leyss. — Frequens.
178. *C. digitata* L. — (EK. 273) — Kv. Szénafű, Bonchida-Szék, Sz.újvár, F.mikola, B.váralja, Szu.németi, Coptelke, Kékes, M.szilvás, Doboka-Moró — Torda (Ercsei 133)
179. *C. panicea* L. — Kv. Szénafű (Pr. Cp. 233, BCI. XVI. 98, Soó, Ujv. Kv. 649)
180. *C. silvatica* Huds. — (EK. 273) — Kv. Szénafű, Fejérd, Szék, B.váralja, Coptelke, Kékes, Bánd, M.vásárh., Doboka.
181. *C. Michelii* Host — (EK. 273) — Kv. Szénafű, Fejérd, Apahida, Kolozs, K.bós, Virágosv., Bonchida-Szék, Cege-Pujon, Vszt.goáthárd, F.mikola, Sz.újvár, M.szovát, Bánd, Kékes, Báld, Szabéd, Mojos, M.vásárh., Kecsed, Torda-Sósf. (Freyn 75, Todor 53)
182. *C. pilosa* Scop. — (EK. 273) — Kv. Szénafű, Fejérd, Dezmér, Kolozs-Ajton, Kolozs, Apahida-Kályán, Korpád, Iklód, Szék, Vszt.-egyed, Szék-Ombozelke-Pujon-Cege, Sz.újvár, F.mikola, B.váralja, Szu.németi, Coptelke, Kékes, Bánd, M.szilvás, Báld, M.vásárh., Moró-Tötör.
- Dubia : *C. depauperata* Good. — Kiscég (Janka 612)
183. *C. distans* L. — Frequens. — f. *rubra* et f. *maxima* Todor — Torda-Sósf. (Todor 53)
184. *C. flava* L. ssp. *lepidocarpa* (Tausch) Hegi — Kv. Szénafű (Pr. Cp. 138, BCI. XVI. 98, Ny. Kv. 103, FK. 52, etiam Pr. Cp. 233 sub „*C. flava*“ et „*Oederi*“) Saepe transitum praebet ad typum (*C. Rüdtii* Kneuck., f. *latifrons* Ny.) cf. Soó Kv. 649.
185. *C. secalina* Wahlbg. — Kv. Jósikatanya-Melegv. (Soó, Ujv. Kv. 640, Soó Consp. 32)
186. *C. hordeistichos* Vill. — Kv. Szénafű (Land. Kv. I. 16 sec.

Simk. En. 554, Janka 613, Soó GM. 93, Kv. 640, Pr. Cp. 140, BCI. XVI. 98, Ny. Kv. 102—3, EM, 115), Fejérd (Ny. I. c.), Kolozs (Freyn 75, Pr. Fl. I. 140), K.bós, Virágosv. (Freyn 75), Szék, Vszt.goáthárd, Cege (Soó 105), Tötör-Moró (Hg. I. 128), Torda (Todor 53), M.vásárh. (Ny. Mv. 17)

189. *C. flacea* Schreb. — Torda (Ercsei 133)? — var. *dinarica* Heuff. — Fejérd, Sz.jenő (Soó 105)

190. *C. hirta* L. — Frequens. — b. *sublaevis* Horn. Szamosfa-Apahida (Soó Kv. 649) etc. — e. *major* Peterm. — Kv. Szénafű (Todor FER. 1880)

191. *C. acutiformis* Ehrh. — Frequens. — b. *spadicea* (Roth) A. et G. — Kv. Szénafű (Bélteki ap. Ny. Kv. 102, Soó, Ujv. Kv. 649), K.borsa(!) — e. *minor* Peterm. — Ajton (Ny. I. c., EM. 130)

192. *C. riparia* Curt. — Kv. Szénafű (Soó GM. 94, Pr. Cp. 140, BCI. XVI. 98, Ny. FK. 43—51, Kv. 102, FER. 361b), Kajántó (Ny. I. c., EM. 117), Szamosfa, Dezmér, Apahida (Ny. I. c. Soó Kv. 649), Mócs, Bánd (Pr. BCI. XVI. 98), K.sármás (Pr. Cp. 231), K.borsa, Cege, Vszt.goáthárd(!), Sz.újvár (Hg. II. 69), Szabéd (Lengy.), M.vásárh. (Ny. Mv. 17, FER. 361), Torda (Todor 53),

b. *gracilescens* (Hartm.) A. et G. — Kv. Szénafű (Soó Kv. 649)

193. *C. melanostachys* Willd. — Kv. Szénafű (Pr. Cp. 141, Ny. Kv. 101), Melegv. (Soó Consp. 29, 43), Szamosfa, Dezmér (Ny. I. c., Soó AGH. V. 152, Consp. 29, 45), Apahida (Ny. Pop FER. 526), Virágosv. (Freyn 75), Sz.újvár (K. et O. 7), Torda (Todor 53), Szabéd (Lengy.), M.vásárh.-Remeteszeg (Ny. Mv. 17)

194. *C. pseudocyperus* L. — Kv. Szénafű (!Ny. FK. 47, 50, Kv. 104), Apahida (Soó GM. 84, Pr. Cp. 225, BCI. XVI. 98, Ny. EM. 117 — Prod. FER. 530), Ajton (Ny. Kv. 104), Torda-Sósf. (Todor 54)

195. *C. inflata* Huds. — Kv. Szénafű (Pr. Cp. 233, BCI. XVI. 98)? — b. *utriculata* (Boot) Bailey — Kv. Szénafű (Pr. I. c.), Vszt.-goáthárd (Janka 614)

196. *C. vesicaria* L. — Kv. Szénafű (Soó GM. 95, Pr. Cp. 140, Bélteki ap. Ny. Kv. 101), Kajántó (Ny. I. c., EM. 107), Vajdasztián (Ny.), Bonchida (Soó 105), Szabéd (Lengy.), Sz.újvár, *F.mikola (Hg. II. 66, 69), Torda (Ercsei 133), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 22) (Pr. Cp. 140)

197. *C. graeilis* × *Buekii* (*vratislaviensis* Fig.) — Kv. Szénafű (Pr. Cp. 140)

198. *C. riparia* × *vesicaria* (*esomádensis* Simk) — Kv. Szénafű, Melegv. (Pr. BCI. XVI. 98)

Lemnaceae.

199. *Lemna minor* L. — Frequens.

200. *L. gibba* L. — Kolozs, K.bós, Virágosv. (Fr. 80), Dezmér (Soó Arch. Biol. XVII. 100)

201. *L. trisulea* L. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 10, Soó GM. 97, Ny. FK. 47—9, Kv. 106, Soó MBIM. X. 191), Kajántó (Ny. EM. 107, Kv. 106), Szamosfa (A. Richt. ap. Soó Arch. I. c.), Apahida (Ny. I. c. Soó Kv. 106), Kolozs, K.bós, Virágosv. (Freyn 80), M.záh

- (Simk. En. 513), Szék(!), Vszt.iván (Györffy MBL. II. 211), Torda (Wiňkl. ÖBZ. XVI. 49, ap. Soó MBIM. X. 191, Todor 54)
202. *Arum maculatum* L. var. *intermedium* Schur — (EK. 273) — Bonchida, Sz.jenő, Iklód, Bonchida-Szék, B.váralja, Torda (Ercsei 85)

Juncaceae.

203. *Juneus atratus* Krock. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 108, Soó GM. 93, Ny. FK. 43, Pr. BCl. XVI. 98, Ujv. Kv. 649), Fejérd (!Ny. Kv. 108), Ajton (Freyn 76), Vszt.gothárd-Feketelak, Kályán(!), M.vásárh. (Nagy ap. Soó Szf. Suppl. 15)
204. *J. articulatus* L. — Frequens. — *f. pallidiflorus* (Becker) A. et G. — Szamosfa (Soó BK. XXIII. 155, in Gr. 250)
205. *J. Rochelianus* R. et Sch. — (EK. 273) — Kv. Szénafű, Fejérd, Ajton, Korpád, Feketelak, Bazéd, Szabéd, M.bánd, M.szabad. Torda-Sósf. (Todor 54)
206. *J. inflexus* L. — Frequens.
207. *J. effusus* L. — Frequens. — *b. compaetus* Lej. et Court. Kv. Szénafű (Soó BK. I. c.), Torda (Todor 54) — *c. prolifer* Sond. Kv. Szénafű (Soó I. c.) — *f. atratus* A. et G. Torda (Todor 54)
208. *J. conglomeratus* L. — Kv. Szénafű (Soó GM. 95, Ny. FK. 43, Kv. 107, Harg. Kv. 649), Ajton (Freyn 76), Cege-Pujon(!), Kékes (Pr. Cp. 145), Bazéd (Lengy.), Kecsed-Tötör-Moró (Hg. I. 126—8), Torda (Ercsei 149),
209. *J. maeer* S. F. Gray — Torda-Sósf. (Todor 54) (M.vásárh.: Soó Szf. Suppl. 15)
210. *J. compressus* Jacq. — Frequens. — *f. salinus* Schur — Kv. Torda (Schur En. 687)
211. *J. Gerardi* Lois. — In pratis humidis salinis frequens (cf. Schur VSV. X. 80, 112, Freyn 76, Simk. En. 537, K. et O. 15, Hayek 467, Soó GM. 100—1, in Gr. 248—9, Consp. 14, 28—29, 32—4, 43—4, 50—1, 55, Pr. FK. 312, Cp. 230, Ny. Kv. 108, 649, Pr. Fl. II. 289—297, FER. 1892a, Todor 54)
212. *J. bufonius* L. — Frequens, in formis multis (sic *f. scoparius* A. et G. et *f. giganteus* A. et G.) — Szamosfa (Soó BK. XXIII. 155)
213. *Luzula pilosa* (L.) Willd. (EK. 273) — Kv. Szénafű (?), Sz.újvár, Kékes, M.ménes, M.vásárhely (Ny. Mv. 18), Dés (Pr. B. Cl. XVI. 99)
214. *L. luzuloides* (Lam.) Dandy et Willmott. — Ajton, Berkenyes, Kékes, Báld, M.vásárh.
215. *L. campestris* (L.) DC. — Frequens. Nonnunquam ad *ssp. multifloram* (Retz.) Lej. verg. (cf. Todor 55)
216. *L. pallescens* (Wahlbg.) Bess. — Galambod „Nyírmege“ (Ny. Mv. 19)

Liliaceae.

217. *Veratrum album* L. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 10, Soó Kv. GM. 93, Ny. FK. 52, Kv. 112), Fejérd (! Ny. I. c.), Ajton

- (Freyn 77, Ny. I. c., EM. 129—130), K.bós (Freyn 77, Pr. Cp. 99, 139), Apahida-Kályán (!), Sz.újvár (Pr. Cp. 18), M.ménes (Borza BCl. VIII. 25), Torda (Ercsei 167, Wolff 67)
218. *V. nigrum* L. — (EK. 273) — Kv. Szénafű, Fejérd, Dezmér, Kolozs, Apahida, K.bós, Ajton, Berkenyes, Aranykút, Korpád, Kályán, Bonchida-Szék, Sz.jenő, Sz.újvár, Buza, N.sármás, Bala-Nercse, Szabéd, P.kamarás.
219. *Colehicium autumnale* L. ssp. *pannonicum* (Gr. et Sch.) A. et G. — Frequens. — *b. transsilvanicum* (Schur) Domin — Sz.újvár-Dés (Janka ap. Domin MBL. VIII. 327) — *f. elatius* Simk. — Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 147) — *f. albiflorum* Opiz — Kv. Szénafű (Wolff ap. Ny. Kv. 114)
220. *C. bulbocodium* Ker.-Gawl. = *Bulboecdium vernum* L. (AGH. V. 155) — Kv. Szénafű, Melegv., Kolozs, K.bós, Virágosv., Torda. — *f. Diószegianum* (Rapcs.) Soó — Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 155)
221. *Anthericum ramosum* L. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 107, Soó GM. 88, 90, AGH. V. 149, Pr. Cp. 141, Méusel 201, 300, Ny. Kv. 114, Ujv. Kv. 650, Ghisa BCl. XXI. 60), Fejérd (Soó Kv. 114), Apahida, Kolozs, K.bós (Freyn 78, Ny. Kv. 114, FER. 1646), Ajton (Ny. I. c.), K.borsa, Szék, Cege, Pujon-Omboztelek, Kályán(!), Kecsed (Hg. I. 126), Vszt.iván (K. et O. 5), Báld (Pr. FK. 1914. 313), M.záh, Kékes (Pr. Cp. 93, 144), Gerend (Simk. 525), Berkenyes, Torda (Freyn 76), Bala-P.almás (Nyár.), Bazéd, Szabéd (Lengy.), M.vásárh. (Ny. Mv. 21)
222. *Gagea pratensis* (Pers.) Dum. — (EK. 274) — Kv. Szénafű, Szszt.miklós-Apahida, Sz.jenő, Szék, Kékes, Feketelak, M.kece. — Torda (Wolff 67, Todor 55), M.vásárh. (Ny. Mv. 22)
223. *G. silvatica* (Pers.) Loud. = *G. lutea* (L.) Ker-Gawl. — (EK. 273—4) — Kv. Szénafű, Fejérd, Szamosfa, Kolozs, Berkenyes, Dezmér, Sz.újvár, Kékes, G.keresztur, M.sztmihály, Vszt.gothárd, Szabéd, Doboka-Moró. — Dés (Czetz 15, Pr. BCl. XVI. 99), M.vásárh. (Ny. Mv. 22), Torda (Ercsei 132, Freyn 77, Wolff 67)
224. *G. arvensis* (Pers.) Dum. — Kv. Szénafű (Pr. Cp. 168, BCl. XVI. 99, Györffy ap. Ny. Kv. 114), Szamosfa (Ny. I. c.), Torda (Ercsei 132, Wolff 67, Todor 55)
225. *G. minima* (L.) Ker-Gawl. — (EK. 272) — Vszt.gothárd (Janka MTK. XII. 170), Kékes (Pr. Cp. 101), Torda (Ercsei 132, Wolff ap. Freyn 77)
226. *Allium vineale* L. — Kv. Szénafű (Wolff ap. Andrae B. Z. XIV. 114, sic *b. compactum* (Thuill.) Asch. — Soó BK. XXIII. 147, Ny. Kv. 115), Szszt.miklós (Pr. ap. Ny. I. c.), Dezmér (Pr. Fl. II. 456)
227. *A. sphaerocephalum* L. — Mezőség (Bgt. I. 288), Kv., Kolozs, K.bós (Freyn 78), Sz.újvár (K. et O. 20, Pr. Cp. 264), Szabéd (Lengy.), Torda (Freyn 78, Wolff 67)
228. *A. scorodoprasum* L. — Frequens. — *b. arenarium* (L.) Rehb. Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 108) — *c. ananthum* Beck Torda (Todor 55)

229. **A. rotundum** L. — Kv. Szénafű (Butujás ap. Ny. Kv. 115, Ujv. Kv. 650), Apahida (Borb. ap. Ny. I. c.)-Kályán, Feketelak (Soó 105), Torda (Schur En. 670, Freyn 78, Todor 55), Szújvár, Mócs (Pr. BCI. XVI. 99), Szabéd (Lengy. ap. Soó I. c.)
230. **A. ursinum** L. — Ördöngősfüzes (K. et O. 4, Pr. Cp. 108), Szújvár (Butujás exs!)
231. **A. atropurpureum** W. et K. — Kv. Szénafű (Schur VSV. II. 167, X. 108, Wolff ap. Andrae B. Z. XIV. 112, Pr. Cp. 167, Ny. Kv. 116), Kistaresa (Butujás ap. Ny. I. c.), Apahida, Szszt.miklós (Freyn 78, Borb. ap. Ny. I. c.), Kolozs (Bgt. I. 290, Schur En. 674, Wolff ap. Ny. I. c.), K.kara (Richt. ap. Ny. I. c.), Szújvár (K. et O. 4), Szabéd (Szakmány 117), Torda (Schur I. c., Freyn 78, Wolff 67)
232. **A. ammophilum** Heuff. — (AGH. II. 71—2, 121) — Mezőség (Bgt. I. 290), Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 108, Nagy ap. Andrae B. Z. XIV. 112, Winkler 50, Soó GM. 97, AGH. V. 146, Pr. Cp. 142, Ny. Kv. 116, Péterfi FEH. 696, Borza—Gürtler FER. 369, etc.), Apahida (Schur VSV. X. 119, Pr. BCI. XVI. 99), Kolozs (Schur En. 674, Freyn 78), K.bós, Virágosv. (Freyn 78), Telekfarka, Szék, Feketelak (Soó 106), Szújvár (K. et O. 4, Pr. BCI. I. c.), Vszt.gothárd (Janka ÖBZ. XVIII. 298), Kályán (Janka ÖBZ. VI. 195), Sz.éncs (Pr. Cp. 94), Kékes (Borb. ap. Tatár AGH. II. 73), M.őr (FER. 369), M.záh, Gerend, Mohács (Simk. En. 530), Szabéd (Lengy. ap. Soó 106), M.kece (Ny. ap. Soó 106), Báld (Pr. FK. 1914. 313), Torda (Ercsei 69, Wolff 67)
233. **A. angulosum** L. — Gerend (Wolff MNL. I. 67), Egerszeg (Barth 116), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 25)
234. **A. oleraceum** L. — (EK. 274) — Kv. Szénafű(?), Kolozs, Aranykút, Berkenyes, K.bós, Korpád, Torda (Schur En. 671), Szamosfa, Melegv. (Soó Consp. 55), Bonchida(!)
235. **A. flavum** L. — Mezőség (Bgt. I. 288), Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 108, Andrae B. Z. XIV. 114, Pr. Cp. 142), Kolozs, K.bós, Berkenyes, Virágosv. (Freyn 78), Torda (Sebők 44), M.záh (Pr. Cp. 95), Báld (Pr. FK. 1914. 313), Szabéd (Szakmány 117), Sz.éncs (Pr. Cp. 94)
236. **A. paniculatum** L. — Mezőség (Bgt. I. 288), Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 147, Wolff, Ny. Kv. 116), Szék (!), Gerend, M.záh (Simk. En. 533), Kékes, Báld (Pr. Cp. 96, 146, MBL. V. 33 sub „A. moschata“), Bazéd, Szabéd (Lengy.), Torda (Ercsei 69)
- b. marginatum** (Janka) Jav. — Kv. Szénafű (Soó GM. 97, Kv. 650), Apahida (Schur En. 672) Vszt.gothárd (Janka Termr. Füz. VIII. 29)
- A. sativum** L. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 108) subspont.?
- A. fistulosum** L. — Subspont Apahida (Priszter 85)
237. **Lilium martagon** L. praecipue **b. pubescens** Borb. — (EK. 274) — Kv. Szénafű, Fejér, Dezmér, Apahida, Kolozs, K.bós, Ajton, Gerend, G.keresztur, Szújvár, Gyulatelke, F.mikola, B.váralja, Szu.németi, Sz.jenő, Iklód, Bonchida-Szék-Vszt.egyed-Ombozelke-Pujon-Cege, Vszt.gothárd, Apahida-Kályán, Korpád, P.kamarás, M.szilvás, Teke, Kékes, M.bánd, Bazéd, Szabéd, Doboka-Moró-Tötör. — Dés (Czetz 32), Torda (Ercsei 95, Wolff 67, Freyn 77)

238. **Fritillaria montana** Hoppe — (EK. 274) — Kv. Szénafű, Melegv., Dezmér, Korpád, Iklód, Vszt.gothárd, Feketelak, M.záh, G.keresztur, M.gerebenes, M.ménes, M.bánd.
- 238a. **F. meleagris** L. — Ad limites: Szászrégen (Müller ap. Soó Suppl. 16, Ungár Fl. v. Siebenb. 105), Radnótfája (Ny. ap. Soó I. c.)
239. **Erythronium dens-canis** L. — (EK. 274) — Kv. Szénafű, Fejér, Szújvár, F.mikola, Sz.jenő, Szék, Kékes, M.bánd, M.záh, Vszt.gothárd, Sárpatak, Pókakeresztur, M.vásárh. — Dés (Czetz 14), Torda (Wolff 67)
240. **Scilla bifolia** L. — (EK. 274) — Kv. Szénafű, Fejér (et b. **subtriphylla** (Schur) Domin) Szamosfa, Kolozs, K.bós, Berkenyes, Sz.jenő, Iklód, Szék, Szújvár, B.váralja, Kékes, M.záh, Pujon, Feketelak, Vszt.gothárd, Sárpatak. Dés (Czetz 21), Torda (Freyn 77) cf. Janka 602.
241. **Ornithogalum pyramidale** L. — Frequens.
242. **O. umbellatum** L. — Frequens.
243. **O. Gussonei** Ten. — Kv. Szénafű (Soó GM. 89, AGH. V. 149, auct. pl. ap. Ny. Kv. 120), Melegv. (Soó Consp. 55), Apahida, Dezmér-Pata (Ny. Kv. 120), Kolozs (Soó Kv. 650), Vszt.gothárd (Janka 603 sub „O. umbellato“), Torda (Todor 55), K.borsa (Soó) certe magis distributa.
244. **O. Boucheanum** (Kunth) Asch. — Kv. Szénafű(!), Kistaresa (Schmidt ap. Ny. Kv. 119), K.kara (Freyn 77), Szújvár (K. et O. 3), Dés (Czetz 10), Torda (Bgt. I. 96)
245. **Muscaria comosum** (L.) Mill. — In agris frequens, a cl. Simonkai e Transsilvania erroneo deleta. (Cf. Soó BK. XXIII. 147, Pr. Cp. 95, 111, 166, BCI. XVI. 100, Ny. Kv. 120, Mv. 23, K. et O. 17, Szakmány 117, Wolff 67, Todor 55 etc.)
246. **M. tenuiflorum** Tausch — In stepposis frequens.
247. **M. botryoides** (L.) Mill. (*M. racemosum* auct?) — Kv. Szénafű (Wolff ap. Andrae B. Z. XIV. 114, Soó Kv. GM. 83, 89, Kv. 650, Pr. Cp. 132—3, auct. multi ap. Ny. Kv. 120, FER. 35, etc.), Fejér (!Ny. I. c.), Apahida (Pr. Cp. 143), M.bánd-M.bergenye (Pr. Cp. 153), Torda (Ercsei 171, Fuss Transs. 656, Wolff 67, FEAH. 1042, Freyn 77), Bonchida (Györffy Szegedi F. II. 162?)
248. **Asparagus officinalis** L. — Frequens.
- b. pseudotenuifolius** Polgár (*collinus* A. et G. an Schur?) — Szszt.miklós-Apahida (Csürös ap. Ny. Kv. 641 sub „A. tenuifolio“ cf. Soó 106)
249. **Majanthemum bifolium** (L.) Schm. — (EK. 174) — Fejér, Sz.jenő, Szék-Ombozelke, Cege-Pujon, Kályán, Ajton, Szújvár, F.mikola, B.váralja, Szu.németi, Coptelke, Vszt.gothárd, M.szilvás, Teke, M.vásárh., Doboka-Moró-Tötör. — Dés (Czetz 17), Torda (Ercsei 103)
250. **Polygonatum latifolium** (Jacq.) Desf. — (EK. 275) — Kv. Szénafű, Fejér, Dezmér, Kolozs, Korpád, Sz.jenő, Cege, Pujon, Bonchida-Szék, Iklód, Szék-Ombozelke-Vszt.egyed, Apahida-Kályán, Szújvár, F.mikola, B.váralja, Szu.németi, M.ménes, M.vásárh.,

Galambod, Szabéd, M. fele, Moró-Tötör. — Dés (Czetz 17), Torda (!Todor 55) — **b. angustatum** Schur — Pujon-Vszt.egyed (Soó 106)

251. **P. odoratum** (Mill.) Druce — (EK. 275) — Kv. Szénafű, Kolozs, Dezmér, Apahida, Kályán, Bonchida-Szék, Sz.jenő, Iklód, Szék-Ombozelke-Vszt.egyed-Pujon, Vszt.gothárd, Feketelak etc., F.mikola, B.váralja, Szu.németi, P.kamarás, N.sármás, Kékes, Berkenyes, M.bánd, M.vásárh., Moró-Tötör. — Dés (Czetz l. c.), Torda (Freyn 78)

252. **P. multiflorum** (L.) All. — (EK. 275) — Fejérd, Kolozs, Dezmér, Korpád, Sz.jenő, Iklód, Vszt.gothárd, F.mikola, M.szovát (et **b. intermedium** (Bor.) Baker), M.szilvás, Báld, Teke, Bala-N.ercse, Szabéd. — Dés (Czetz l. c.), M.vásárh. (Ny. Mv. 22)

253. **Convallaria majalis** L. — (EK. 275) — Kv. Szénafű, Fejérd, Kolozs, Apahida, Korpád, Kályán, Bonchida-Szék, Sz.jenő, Iklód, Szék-Cege-Pujon, Vszt.egyed, Vszt.gothárd etc., F.mikola, Szu.németi, Sz.újvár, P.kamarás, M.szilvás, Báld, M.ménes, Berkenyes, M.bánd, Bazéd, Szabéd, Mojos, M.vásárh., Doboka-Moró-Tötör. — Torda (Wolff 67, Freyn 78) Dés (!)

254. **Paris quadrifolia** L. — (EK. 275) — Sz.újvár, Vízszilvás, F.mikola, B.váralja, Szu.németi, Coptelke, Sz.jenő, Iklód, Szék. — Dés (Czetz 18), Torda (Ercsei 35)

Amaryllidaceae.

255. **Galanthus nivalis** L. — (EK. 275) — Fejérd (et **b. major** Ten. cf. Soó Kv. 650, Soó 106); Bonchida-Szék, Kolozs, K.bós, Berkenyes, Sz.újvár, B.váralja, Vszt.gothárd, Doboka-Moró-Tötör. — Dés (Czetz l. c.)

256. **Narcissus stellaris** Haworth — Kv. Szénafű (Landoz Kv. I. 15 sub *N. poeticus*, Schur VSV. X. 108, Janka 608, Nagy ap. Andrae B. Z. XIV. 111, Soó GM. 88, Kv. 650, AGH. VI. 28, Pr. Cp. 133, Ny. Kv. 123, Bogsch FER. 622), — etiam *f. dianthus* Schur (Soó BK. XXIII. 155), *f. flavicans* Ujv. (Kv. 650) — M.csávás (Ny. Mv. 23), Dés (Czetz 17)

Iridaceae.

Crocus Heuffelianus Herbert. — Ad limites: Dés (Czetz 13, Andrae B. Z. XIV. 68 sub „*C. banaticus*“, Pr. Cp. 187, BCI. XVI. 124), Ajton (Ny. Kv. 124)

257. **Iris pumila** L. — (incl. *I. transsilvanica* Schur) — Kv. Szénafű (Wolff ap. Andrae B. Z. XIV. 68, Schur VSV. II. 167, Hayek 466, Soó GM. 90, Pr. Iris 119 — *f. atroviolacea* Schur et *f. lutea* Ker-Gawl. cf. Soó BK. XXIII. 147), Melegv. (Pr. Fl. II. 292), Apahida (Pr. Cp. 142, Iris 119), Kolozs (Bgt. I. 61, Freyn 79), K.bós (Freyn 79, Ny. Kv. 126), Virágosv., Ördöngősv. (Freyn 79), M.szovát (Péterfi MBL. XVII. 59, Pop. Guide 165), Báld (Pr. FK. 1914. 313, Cp. 146), Vszt.gothárd (Janka 550), Gerend (Nyár.), Szabéd (Lengy.), Torda (Bgt. l. c., Ercsei 111, Wolff 66)

258. **I. aphylla** L. (incl. *I. hungarica* W. et K.) — Kv. Szénafű (Landoz Kv. I. 15, Joó ap. Schur VSV. II. 167, Wolff ap. Andrae B. Z. XIV. 68, Simk. En. 517, Soó GM. 90, AGH. V. 144—147, Pr. Cp. 95, 132—4, BCI. XVI. 70, Iris 163, Meusel 301, auct. multi ap. Ny. Kv. 126, Ghisa FER. 2183), Melegv. (Pr. l. c.), Apahida (Ny. l. c.), Kolozs, K.bós (Freyn 78), Sz.újvár (Richt. ap Bernátsky MTK. XXI 2. 88, Hg. II. 66), Kecsed (Hg. I. 126), Szék(l), Torda (Wolff 66) — **b. minor** Simk. (*I. furcata* auct.) — Kv. Szénafű (Simk. En. 517, Soó BK. XXIII. 155, Pr. Iris 164), Gerend (Simk. l. c.), M.záh (Janka 606, ÖBZ. VI. 194)

259. **I. variegata** L. — (EK. 276) — Kv. Szénafű, Kolozs, K.bós, Virágosv., Kályán, Pujon, Gerend, Monosf., Sóspatak, M.vásárh. — Torda (Wolff 66) — **b. longifolia** Prod. — A.zsuk (Pr. Fl. I. 185)

260. **I. pseudacorus** L. — Frequens.

261. **I. spuria** L. (incl. *I. subbarbata* Joó) — K. Szénafű (Landoz Kv. I. 15, Wolff ap. Andrae B. Z. XIV. 69, Joó ap. Schur VSV. II. 98, 167, Schur VSV. X. 107, Soó GM. 93, Pr. Cp. 142, Iris 70, Ny. FK. 43—4, auct. multi ap. Ny. Kv. 127), Melegv. (Ny. l. c.), Zsuk (Pr. Cp. 87), Apahida (Soó AGH. V. 148 —?), Virágosv. (Freyn 79), Ajton (Ny. l. c. EM. 130), M.csávás (Ny. Mv. 24), Torda (Bgt. Mant. 6, Schur VSV. X. 80, Wolf 66 Hayek 467)

262. **I. sibirica** L. — Kv. Szénafű (Wolff ap. Andrae B. Z. XIV. 69, Simk. En. 518, Soó GM. 93, Kv. 651, Pr. Iris 110, Ny. FK. 44, Kv. 127), Apahida, Zsuk (Pr. Cp. 87, Iris 110), Sz.újvár-Ö.füzes-Vszt.iván (Janka MTK. XII. 175), Bazéd (Lengy.), M.vásárh. (Barabás ap. Pr. Iris 110), M.csávás (Ny. ap. Pr. l. c.), Torda (Ercsei 111), A.polyán (Wolff 66 cf. Pr. Fl. I. 185) — *f. microcarpa* Prod. Zsuk (Melzer ap. Pr. Iris 112)

263. **I. ruthenica** Ker-Gawl. — (EK. 275) — Kv. Szénafű, Ajton, M.panit, Szabéd, Bazéd, Mojos, Monosf.-Sóspatak, Kékes-udvarhely, M.vásárh.—Torda (Wolff 66)

264. **I. humilis** M. B. — (AGH. V. 155) — Kv. Szénafű, Apahida, Kolozs, K.bós, Kolozs-Torda, M.szovát-M.gyéres, Torda, Gerend, G.keresztür, Gerend-Egerbegy, Vszt.gothárd-Pujon, Katona-Kiscég, Pujon, Noszoly, Gyeke-Mócs, M.záh.

265. **I. graminea** L. ssp. *pseudocyperus* (Schur) Soó — (EK. 275) — Kv. Szénafű, Fejérd, Dezmér, Apahida-Kályán, Kolozs, K.bós, Korpád, Sz.jenő, Szék, G.keresztür, Katona-Kiscég-N.cég, Mszt.mihály, Báld, M.bánd. — M.vásárh.-Torda (Unverricht ap. Fuss VSV. XV. 105, Todor 56)

266. **Gladiolus imbricatus** L. — (EK. 276) — Kv. Szénafű, Fejérd, K.borsa, Ajton, Kolozs, Korpád, Cege, Pujon, Feketelak, Palatka, Vszt.gothárd, Kékes, Szabéd, Bazéd, Bala-N.ercse-Torda (Wolff 66), M.vásárh. (Bgt. I. 61, Ny. ap. Máthé BK. XXXI. 268)

Orchidaceae.

267. **Cypripedium calceolus** L. — (EK. 276) — Kv. Szénafű (olim), Sz.újvár, Ördöngősfüzes, Vízszilvás. — Dés (Czetz 13)

268. **Orchis morio** L. — Frequens, in formis pluribus. — **b. sub-**

laxiflorus Schur — Kv. Szénafű (Borb., Richt. ap Soó BK. XXIII. 156, Orchid. 139), Sz.újvár (Richt. ap. Soó l. c.), Sz.uraly-M.bergenye (Ny. ap. Soó l. c.) — *Lusus albus* (*albiflorus*, *albicans*) Koch — Kv. Szénafű (Ujv. Kv. 651), Torda (Todor 56) — *f. parvulus* Dorak. Kv. Szénafű (Priszter 91)

269. ***O. coriophora*** L. — (EK. 276) — Kv. Szénafű, Fejérd, Kajántó, Kolozs, K.bós, Virágosv., Sz.újvár, Cege, Pujon, Omboztelek, Vszt.gothárd, Feketelak, Bala-P.almás, Bazéd, M.vásárh., K.borsa, Doboka, Kecsed. — Torda-Szt.mihályfa (Wolff 66) Saepe *f. rosiana* Soó (*strypiensis* Zapal.?)

270. ***O. ustulata*** L. — (EK. 276) — Kv. Szénafű, Kolozs, Sz.újvár, Bonchida-Szék, Sz.jenő-Hársastető, Cege, Kékes, M.csávás, M.záh, Mojos, K.borsa, Moró. — Torda-Szt.mihályfa (Wolff 65)

271. ***O. militaris*** L. — (EK. 276) — Kv. Szénafű, — et *f. subsimia* Hausskn. et *f. intercedens* Beck —, Kolozs, Sz.újvár, B.váralja, Bazéd, K.borsa, M.vásárh.-Torda.

272. ***O. purpurea*** Huds. — Dés (Czetz 18), M.vásárh. „Besehegy“ (Ny. Mv. 25)

273. ***O. laxiflora*** Lam. ssp. *elegans* (Heuff.) Soó — Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 156, GM. 93, Orchid. 155, Ny. Kv. 131, FK. 51 pt. b.), Szamosfa-Szszt.miklós-Apahida (Soó l. c., Consp. 30, 33, Richt. Hb. Norm. 5176, FER. 1661a, auct. multi ap. Ny. Kv. 131 pt. b.), Kolozs, K.bós, Virágosv. (Freyn 79), Sz.újvár (K. et O. 18, Hg. II. 69), V.kamarás (pt. b.), Büdösök (Richt., Pr. ap. Soó Orchid. 155), Szék, Cege-Ménlő, Vszt.iván-Göc, Fejérd-K.borsa (Soó 107 partim b.), Szék-Gyulatelke (Soó 107, Consp. 43), Bala-P.almás (Ny. ap. Soó Orch. 155 b.), Bazéd, Szabéd, Mojos (Lengy. ap. Soó 107), Torda-Szt.mihály (Wolff 66, ap. Soó l. c.), Radnót (Ny. ap. Soó l. c.), Doboka-Moró-Tötör-Kecsed (Hg. I. 127—9) — *f. Lengyeli* Soó cum typo, sic Kv. Szénafű (Ny. Ujv. Kv. 132, 651), Apahida (Richt. ap. Soó l. c.) — *f. Móthei* Soó — Szamosfa-Apahida (Csürös ap. Ny. Kv. 651)

b. tr. *Jávorkae* Soó (*ssp. elegans* — *ssp. paluster*) cum typo immixte.

274. ***O. incarnata*** L. saepius *f. macrophylla* Schur — Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 156, GM. 93, Orchid. 159, Kv. 651, Ny. FK. 43—6, 51, Kv. 133), Fejérd (Soó Kv. 651), K.borsa (!), Kékes (Pr. ap. Soó Orchid. 159), Torda-Szt.mihályfa (Wolff 66)

ssp. *haematodes* (Rehb. f.) emend. Soó (an ssp. *propria*?) — Kv. Szénafű „Tekató, Elővölgy, Morgó“ (Soó, Ny. Kv. 133, 651)

275. ***O. maculata*** L. — Kolozs, K.bós (Freyn 79)
Dubia : *O. mascula* L. ssp. *signifera* (Vest) Soó — Kv. Szénafű (Wolff ap. Soó Orch. 152)

276. ***Traunsteinera globosa*** (L.) Rehb. f. — Kv. Szénafű „Morgó“ (Soó Orchid. 166, GM. 130)

277. ***Anacamptis pyramidalis*** (L.) Rich. — Egerbegy, Gerend (Wolff 66)

278. ***Coeloglossum viride*** (L.) Hartm. — Kv. Szénafű (Landoz Kv. I. 15) olim!, Kolozs, K.bós (Freyn 80)

279. ***Gymnadenia conopea*** (L.) R. Br. — Kv. Szénafű (Soó GM.

93, Orchid. 175, auct. multi ap. Ny. Kv. 135), Kolozs, K.bós (Freyn 79), Buza (Pr. ap. Soó Orch. 175), Torda (Wolff 66, Freyn 79)

b. densiflora Fr. — Kv. Szénafű (Soó l. c., BK. XXV. 138, etiam *f. serotina* Schönh. cf. Soó l. c. et BK. XXIII. 156)

Dubia : *G. odoratissima* (L.) Rich. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 107)

280. ***Platanthera bifolia*** (L.) Rich. — (EK. 276) — Kv. Szénafű Fejérd, Szék, Cege-Pujon, Vízszilvás, Sz.újvár, F.mikola, B.váralja, Szu.németi, Buza, M.szilvás, Szabéd, Doboka. — Ajton (Ny. Kv. 137), Torda (Wolff 67, Freyn 79), Dés (Czetz 18, ap. Soó Orchid. 179) — ***b. densiflora*** (Drej.) A. et G. — Kv. Szénafű (Wolff ap. Soó l. c., Kv. 136), Dés (Czetz ap. Soó l. c.), Torda (Barth ap. Soó l. c., Kv. 136), Cephalanthera rubra (L.) Rich. — (EK. 276—7) — Sz.újvár, Ördöngősfüzes, M.szilvás, Sárpatak, Vszt.iván.

282. ***C. damascinum*** (Mill.) Druce — Sz.újvár (K. et O. 9, Pr. Cp. 100, Richt. ap. Soó Orch. 187), B.váralja (Hg. III. 125)

283. ***C. longifolia*** (L.) Fritsch — Kékes (Pr. Cp. 101)

284. ***Epipactis helleborine*** (L.) Cr. — Sz.jenő (Soó 107)

Dubia : *E. palustris* (Mill.) Cr. — M.záh (Ercsei 26)

285. ***Listera ovata*** (L.) R. Br. — Vszt.iván (Nagy ap. Ercsei 26), Torda (Wolff 66, Todor 56), M.vásárh. (Barabás ap. Soó Orchid. 182)

286. ***Neottia nidus-avis*** (L.) Rich. — (EK. 277) — Fejérd, Dezmér, Ajton, Apahida, Bonchida-Szék, F.mikola, B.váralja, M.szilvás, Vszt.iván, M.vásárh., Doboka-Moró-Tötör. — Torda (Wolff 60)

287. ***Liparis Loeselii*** (L.) Rich. — Torda-Sósf. (Todor 56)

DICOTYLEDONES.

Salicaceae.

288. ***Populus alba*** L. — (EK. 267) — Valles fluviorum Szamos, Aranyos, Maros.

289. ***P. nigra*** L. — (EK. 267) — Ibidem : Kv. — Apahida, Sz.újvár, Bonchida, Omlásalja, Bethlen, Hadrév, Vajdasztiván, M.vásárh., Torda (Ercsei 114)

290. ***P. tremula*** L. — (EK. 267) — Frequens.

291. ***P. alba*** × ***tremula*** (eaneseens Sm. ssp. *Gomboczii* (Polgár) Nyár.) — (EK. 267) — Szszt.miklós-Apahida (*f. apahidensis* Nyár.), Sz.újvár.

292. ***Salix alba*** L. — Frequens.

293. ***S. fragilis*** L. — Frequens. Etiam *f. latijolia* Anderss. et *f. discolor* Kern. (sic : Szamosfa-Apahida : Ny. Kv. 150)

294. ***S. triandra*** L. incl. *b. discolor* W. et Gr. (*amygdalina* L.) — Frequentes.

195. ***S. purpurea*** L. — Frequens. — *b. Lambertiana* (Sm.) Koch-Szamosfa-Apahida (Ny. Kv. 133)

296. ***S. viminalis*** L. — (EK. 267) — Szszt.miklós-Apahida, Kájántó, A.gyéres, Alóna, M.csán, M.szabad, Egerbegy, Vszt.gothárd, M.vásárh.-Torda (Ercsei 50, Freyn 82)

297. *S. repens* L. ssp. *rosmarinifolia* (L.) Hartm. — Kv. Szénafű (!Pr. Cp. 20, Ny. Kv. 151), Sz.újvár (K. et O. 22), Torda (Ercsei 58)
 298. *S. cinerea* L. — (EK. 267) — Kv. Szénafű, Fejérd — etiam *f. spuria* Wimm. — Kajántó, K.borsa, Apahida, Ajton, Sz.újvár, F.mikola, M.szilvás, Vszt.gothárd, Cege, Kályán, M.vásárh.-Torda (Ercsei 58)

299. *S. caprea* L. — (EK. 267) — Kv. Szénafű, Fejérd, Ajton, Sz.újvár, B.váralja, Szu.németi, Bonchida-Szék, Sz.jenő, Vszt.gothárd, Báld, M.bánd, Mojos, M.vásárh.-Torda (Ercsei 58)

300. *S. alba* × *fragilis* (*rubens* Schrank) — (EK. 267) — Kv. Szénafű (cum *b. viridis* (Wahlbg.) A. et G.), Szamosfa-Apahida (*a. excelsior* (Host) et *e. palustris* (Host) A. et G., *f. latifolia* Nyár.), Bonchida, M.vásárh.

301. *S. fragilis* × *triandra* (*alopecuroides* Tausch) — Szszt.miklós-Apahida (Ny. Kv. 155, BK. XXVIII. 143 *f. latifolia* Nyár.)

302. *S. caprea* × *cinerea* (Reichardtii Kern.) — Szamosfa (Ny. Kv. 155)

Betulaceae.

303. *Carpinus betulus* L. — (EK. 266) — Frequens, limes inferior australem versus determinanda.

304. *Corylus avellana* L. — Frequens.

305. *Betula pendula* Roth. — (EK. 267) — Kv. Szénafű, Szu.németi, M.ménes, Mojos, Sárpatak—Torda (Ercsei 116, Todor 57)

306. *Alnus incana* (L.) Mönch — vall. Szamos : Kv.-Apahida (Ny. Kv. 157, EM. 110, Soó et Ujv. Kv. 652), Sz.újvár (K. et O. 4 culta?), Bethlen, vall. Aranyos : Hadrév (Fekete-Blattny 689), Torda (Ercsei 44), Szt.mihályfa (Simk. En. 492)

307. *A. glutinosa* (L.) Gärtn. — (EK. 267) — Valles fluviorum Szamos, Aranyos, Maros.

Fagaceae.

308. *Fagus silvatica* L. — (EK. 266) — Limes interior centrum territorii versus : Doboka-Sajgó-F.mikola-Szék-Gyulatelke-V.kamarás-Feketelak-Uzdiszt.györgy-Teke-N.ercse-Sárpatak-M.vásárh., sed etiam : Kisiklód „Hársastető“ (Soó 101), M.szilvás (Borza BCI. VIII. 16), Cf. Fekete-Blattny 82, Pr. Cp. 99—100, Fl. II. 146, Soó 101 etc.

309. *Quercus cerris* L. incl. *b. austriaca* (Willd.) Loud. — (EK. 266) — Limes interior australem versus : Dés-Szt.benedek-Szu.németi-F.mikola - Boncnyires - Vszt.egyed - Cege - Kékes - Szászújfalu, porro Iklód, Cege-Pujon, Sz.újvár, Coptelke, Mohaj, Dezmér, Doboka.

310. *Q. pubescens* Willd. — Vice, Vszt.egyed (Fekete-Blattny 688), F.mikola (Hg. II. 68), Szék (Soó 102)

311. *Q. petraea* (Mattuschka) Lieblein (*Q. sessiliflora* Salisb.) — (EK. 266) — Doboka, Fejérd, Dezmér, Ajton, Kolozs, Aranykút, Berkenyes, Apahida, Sz.újvár, F.mikola, B.váralja, Szu.németi,

Coptelke, Sz.jenő, Szék, Cege-Pujon, Korpád, M.szilvás, Báld, Teke, Kékes, Bazéd, M.vásárh.-Dés (Pr. Cp. 21), Torda (Freyn 81)

311a. *Q. (ssp.) Dalechampii* Ten. (*Q. aurea* Wierzb.) — Pujon (Janka ap. Schwarz Mon. Querc. 83) sed loca natalia supra enumerata magis ad hanc ssp. pertinere videntur.

312. *Q. robur* L. — (EK. 266) — Frequens, in formis multis. (Typus : *ssp. pedunculata* (Ehrh.) DC. var *glabra* (Gord.) Schw.) *f. tricuspidata* Janka : Cege-Vszt.gothárd (Janka 600); *f. brevipedunculata* (Lasch) = *f. brevipes* (Heuff.), *f. longipedunculata* (Lasch.), *f. heterophylla* (Loud.) : Torda (Todor 57), *f. cuneifolia* Vuk. : Sármás (Borza BCI. VIII. 20)

b. puberula (Lasch.) Schw. (*pilosa* Schur), Sármás (Borza I. c.), P.kamarás (Borza I. c. 23 — *f. pubipes* Borb. et Csató)

313. *Q. pubescens* × *petraea* (*calvescens* Vukot.) — F.mikola (Hg. II. 68)

Ulmaceae.

314. *Ulmus laevis* Pall. — M.szengyel, M.őr, M.bánd, M.ölyves (Fekete-Blattny 689), Torda (Ercsei 147, Wolff 65, Freyn 82, Todor 57)

315. *U. campestris* L. (*U. glabra* Mill., *U. carpinifolia* Gleditsch) — (EK. 268) — Sat frequens. — *b. suberosa* (Mönch) Wahlbg. — Bonchida (Soó 107), Kékes, P.kamarás, M.záh (Pr. Cp. 92, 101, 104), Torda (Ercsei 147, Todor 57) — *c. glandulosa* Lindl. — Torda-Sósfürdő (Todor 57)

316. *U. seabra* Mill. = *U. glabra* Huds. — Bonchida (Soó 107), K.borsa (Soó EK. 268), P.kamarás (Pr. Cp. 101), Torda (Todor 58)

Moraceae.

317. *Humulus lupulus* L. — Frequens.

318. *Cannabis sativa* L. — Subspontanea, frequens.

Urticaceae.

319. *Urtica urens* L. — Frequens.

320. *U. dioica* L. — Frequens.

320a. *Parietaria officinalis* L. Ad limites : Torda (Ercsei 48)

Loranthaceae.

321. *Loranthus europaeus* Jacq. — (EK. 270) — Kolozs, Berkenyes, Cege, M.szilvás, M.bánd. — Dés (Czetz 17), Vszt.gothárd (Janka 574), Sz.jenő (!)

322. *Viscum album* L. — Dés (Czetz I. c.), Bethlen, Teké (Roth EK. 1926. 48), M.vásárhely (Ny. Mv. 31), Torda (Roth I. c.)

Santalaceae.

323. *Thesium linophyllum* L. — Frequens. — **b. transsilvanicum** (Schur) A. et G. Kv. Szénafű (Soó XXIII. 147) — **e. latifolium** (Wimm.) — Kv. Szénafű (Ny. Kv. 162, cf. Schur VSV. X. 107) — **f. collinum** (Schur) Gürke — Kolozs (Soó 652)

324. *Th. bavarum* Schrank — Kv. Szénafű (Richt. ap. Ny. Kv. 163, Soó Kv. 652), Sz.újvár (K. et O. 24 an vero?)

325. *Th. ramosum* Hayne — Kv. Szénafű-Kistarcsa (Pr. Cp. 134, auct. multi ap. Ny. Kv. 163, Soó AGH. V. 146, Kv. 652), Dez-mér (Soó et Ujv. Kv. 652), Kolozs, K.bós, Berkenyes, Virágosv. (Freyn 84), Torda (Todor 58), Sóspatak (Nyár. ap. Soó 107), Feketelak (Soó 107)

326. *Th. Dollineri* Murb. — Kv. Szénafű (Andrae B. Z. XIII. 900, Pr. Cp. 134, Fl. II. 444), Feketelak (Janka 660), Torda (Wolff 65, ap. Simk. En. 478, Fuss Transs. 566) — **b. (ssp.) simplex** (Velen.) Kv. Szénafű (Soó GM. 90, Landoz, Péterfi, Soó in Kv. 163), Melegv. (Soó et Ujv. Kv. 652, Consp. 56), M.szovát-M.gyéres (Péterfi MBL. XVII. 60)

Aristolochiaceae.

327. *Aristolochia clematitis* L. — Sat frequens, sed hinc-inde deest.

328. *A. pallida* Willd. — Kolozs, K.bós (Freyn 85), Vszt.gothárd-Feketelak (Soó 107)

329. *Asarum europaeum* L. — (EK. 277) — Kv. Szénafű, Fejér, Dez-mér, Sz.újvár, F.mikola, B.váralja, Szu.németi, Coptelke, Bonchida, Szék-Vszt.egyed-Ombozelke-Pujon-Cege, Vszt.gothárd, Apahida-Kályán, Korpád etc., P.kamarás, M.szilvás, N.sármás, M.ménes, Teke, Kékes, Berkenyes, M.bánd, G.keresztur, Mojos, Sárpatak, M.vásárh., K.borsa, Doboka-Moró-Tötör.

Polygonaceae.

330. *Rumex maritimus* L. — Kv. Szénafű (Soó BK. XXII. 71, Richt. ap. Ny. Kv. 167, Szamosfa (Soó in Gr. 250), Kolozs (Schur VSV. X. 112, Freyn 84), Virágosv. (Freyn 84), Torda (Bgt. I. 314, Schur En. 578, Freyn 84, Todor 58), M.záh (Simk. En. 471)

331. *R. paluster* Sm. — Szamosfa (Borb. ap. Ny. Kv. 167), Apahida (Priszter 85), Kolozs (Schur VSV. X. 112), Bonchida(!), Cege (Pr. Cp. 50), Szék (Soó 107), M.ludas (Ny.), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 36)

332. *R. conglomeratus* L. — Frequens.

333. *R. sanguineus* L. **b. viridis** (Sm.) Koch — Bonchida (Soó 107), M.vásárh. (Ny. l. c.), Torda (Ercsei 99)

334. *R. obtusifolius* L. ssp. *silvester* (Lam.) Rech. — Szamosfa, Apahida, Kolozs (Soó Kv. 652, Priszter 85), Virágosv. (Ny.), Sz.újvár (Pr. Cp. 74), M.ludas (Ny.) Torda (Ercsei 99),

ssp. transiens (Simk.) Rech. — M.szovát (Bihari ap. Rech. f. Beih. BCbl. XLIX. 54), F.mikola (Hg. II. 65)

ssp. subalpinus (Schur) Rech. f. — M.szovát (Bihari l. c.)

335. *R. stenophyllum* Led. — Kv. Szénafű (Bihari ap. Ny. Kv. 168), Szamosfa (Pr. FER. 141, Priszter 85, Borb., Richt. ex Ny. Kv. l. c., Soó BK. XXIII. 147, in Gr. 250, Consp. 50), Apahida (Soó l. c.), Gerend (Simk. En. 472) — **b. mierovalvis** Bihari — Szamosfa (Bihari MBL. XXVI. 82)

336. *R. hydrolapathum* L. (*R. sinuatus* auct.) — Apahida (Schur En. 581), Cege (Soó 107), M.vásárh. (Ny. Mv. 33), M.ludas, Sz.kocsárd (Ny.), M.vásárh. (Ny. 33)

337. *R. crispus* L. — Frequens.

338. *R. patientia* L. — Kv. Szénafű (Ny. Kv. 166), Bonchida (Soó), M.szovát (Bihari ap. Rech. f. Rep. XXXI. 249), Kolozs-Virágosv., M.ludas (Ny.) Torda (Winkler 48, Todor 58), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 37)

ssp. recurvatus (Rech.) Rech. f. — (AGH. V. 156) — Kv. Szénafű, Apahida, Mócs, M.szovát. Cf. Rech. f. Rep. XXXI. 253, Bihari MBL. XXVII. 82, Pr. Fl. I. 249.

ssp. orientalis (Bernh.) Danser incl. **b. transsilvanicus** Rech. f. — Kv. Szénafű (Borb. ap. Rech. l. c. 255, Ny. Kv. 166), Szamosfa (Simk. ap. Rech. f. l. c.), Apahida-Mócs (Bihari ap. Rech. f. l. c.), M.szovát (Richt. ap. Rech. f. l. c.)

339. *R. crispus* × *obtusifolius* (*aeutus* L.) — Szamosfa (Simk. En. 472, Borb. ap. Rech. f. Beih. BCbl. XLIX. 97), M.őr (Richt. ap. Rech. f. l. c.), M.ludas (Ny.), Torda (Ercsei 99)?

340. *R. crispus* × *patientia* (*confusus* Simk.) — Kv. Szénafű (Simk. MNL. II. 152, Ny. Kv. 169), Szamosfa (Borb., Gusuleac ap. Rech. Rep. XXXI. 272., M.szovát (Richt. ap. Rech. f. l. c.), Bonchida (Soó 107), Apahida-Mócs, M.őr (Bihari ap. Rech. f. l. c.), Torda (Todor 58)

341. *R. crispus* × *recurvatus* (*Hayekii* Rech. f.) — Kv. Szénafű (Hayek ap. Rech. Ann. Wien, 1924. 151)

342. *R. obtusifolius* × *patientia* (*erubescens* Simk.) — Kv. Szénafű (Ny. Kv. 169 et **b. Simonkaii** Danser, Soó ap. Ny. l. c.), Szamosfa (Borb. ap. Rech. f. l. Beih. c. 107)

343. *R. obtusifolius* × *stenophyllum* (Wachteri Danser) — M.őr (Bihari ap. Rech. f. l. c. 111—?)

344. *R. acetosella* L. — Frequens, in formis multis, sic : **b. tenuifolius** Wallr. et **c. multifidus** (L.) Lam. et DC.

345. *R. acetosa* L. — Frequens. — **b. hirtulus** Freyn Kv. Szénafű (Ny. Kv. 165. *f. porrectus* Nyár.)

ssp. auriculatus (Wallr.) Dahl. (*R. thrysiflorus* Fingerh.) — Apahida „Csikosh.“ (Ny. Kv. 652)

346. *Polygonum bistorta* L. — Kv. Szénafű, Fejér (Ny., Soó Kv. 170), Ajton (Freyn 83), Torda, A.polyán (Ercsei 35, Wolff 65)

347. *P. amphibium* L. in formis : **a. aquatile** Leyss, **b. terreste** Leyss, **c. decumbens** Kl. et Richt. — Kv. Szénafű (Soó GM. 94, BK. XXIII. 147 **a. b. c.**, Ny. FK. 52, Kv. 170), K.borsa-Válaszút (! **b.**), Szék (! **a.**), Vszt.iván (K. et O. 20 **b.**), Cege (!Pr. Cp. 50), M.záh

(Ercsei 35, Ny. a. b.) Torda (Ercsei 35, Todor 58 b.) Ny. a. b.), M.kapus (Ercsei 35), Szamosfa-Apahida (Soó Kv. 652 a. c! Priszter 85)

348. *P. persicaria* L. — Frequens, in formis pluribus, sic : *f. albidum* et *rubellum* A. Br.

349. *P. lapathifolium* L. — Frequens, in formis multis, sic a. *ovatum* A. Br., b. *lanceolatum* A. Br., c. *nodosum* Beck (Kv. Szénafű : Ny. Kv. 170), resp. *f. rubrum* SFGrey et *f. viride* A. Br.

ssp. *tomentosum* (Schrank) Danser = *pallidum* (With.) Fr. — Szamosfa-Apahida (Soó), Szszt.miklós (Priszter 85), Bonchida (Soó 107), Torda (Todor 59), M.vásárh. (Ny. Mv. 92)

350. *P. hydropiper* L. — Frequens, in formis pluribus, sic a. *obtusifolium* A. Br., b. *acutifolium* A. Br., c. *angustifolium* A. Br. (Kv. Szénafű : Soó BK. XXIII. 156)

351. *P. minus* Huds. — Kv. Szénafű, Szamosfa (Soó GM. 95, 100, in Gr. 250), Torda-Sósf. (Todor 59), M.vásárh. (Bgt. I. 342)

352. *P. mite* Schrank — Kv. Szénafű (Soó GM. 94, Ny. Kv. 172), Sz.kocsárd (Ny.), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Székelyf. 38), Dés (Morariu t. IX.)

353. *P. patulum* MB. — Kv. Szénafű (Bgt. I. 343, Wolff VSV. II. 175, Nagy ap. Andrae B. Z. XIII. 900, Schur VSV. X. 107, ÖBZ. X. 353, Pr. FER. 1918, Fl. II. 291), Melegv. (Soó GM. 101, Cons. 55, Pr. Cp. 141), Apahida „Büdöstő“ (Ujv. Kv. 652, f. *multiflorum* Ny. Kv. 172), Kolozs (Bgt. I. c., Freyn 84, Ny., Soó Kv. 652, Pr. Fl. II. 295, cf. Hayek 465), K.bós (Freyn ap. Ny. Kv. 172), Korpád (Richt. ap. Ny. I. c.), Virágosv. (Freyn 84), Torda (Bgt. I. c., Ercsei 35, Wolff 65, Pr. Fl. II. 290), Sz.újvár (K. et O. 19), Feketelak (Janka MTK. XII. 176), Vszt.iván (K. et O. 20 sub *P. maritimum*?), Vszt.-gothárd (Janka ap. Fuss VSV. XX. 168), M.csán, M.záh, M.pagocsa (Ercsei 35), ssp. v. var. *Kitabielianum* (Sadler) Jav. — Torda-Sósf. (Winkler ÖBZ. XVI. 49, Wolff, Barth ap. Ny. Kv. 172)

354. *P. aviculare* L. Frequens, in formis multis : a. *triviale* Rchb., b. *procumbens* (Gilib.) Hayne (sic Kv. Szénafű : Soó BK. XXIII. 156, Ujk. Kv. 652), e. *virgatum* Peterm. (sic Kv. Szénafű, Dezmér, Apahida : Soó I. c., Ny. Ujv. Kv. 652), Torda (Todor 59), d. *aphyllum* Hayne (sic Szamosfa, Apahida, Kolozs, Torda : Soó I. c., GM. 101, in Gr. 248—9), e. *rotundifolium* Schur (sic Kv. Szénafű, Szamosfa : Richt., Borb. ap. Ny. Kv. 173), f. *condensatum* Becker (sic Szamosfa : Ny. Kv. 173 f. *exaltatum* Nyár., Torda : Todor 59), g. *erectum* (Roth) Hayne — frequens —, h. *diversifolium* Schur (sic Melegv. : Ny. Kv. 652), i. *monspeliense* (Thiéb.) Pers. (sic Kv. Szénafű : Soó I. c., Ny. Kv. 173)

ssp. *caleatum* (Lindm.) A. et G. — Kv. Szénafű, Szamosfa (Bélteki, Joó, Richt. ap. Ny. Kv. 173)

355. *P. convolvulus* L. — Frequens.

356. *P. dumetorum* L. — (EK. 267) — Kv. Szénafű, Fejérd, Bonchida, Cege-Pujon, Vszt.gothingárd, Feketelak, Apahida, Kolozs, Sz.újvár, Bazéd, Szabéd. — M.vásárh.-Torda (Ercsei 35, Todor 59), Szamosfa-Apahida (Priszter AGH. VI. 85)

357. *P. convolvulus* × *dumetorum* (*heterocarpum* Beck) — Kolozs-K.bós (Ny. Kv. 174, BK. XXXVII. 134)

Chenopodiaceae.

358. *Polyenemum arvense* L. var. *majus* (A. Br.) Döll — resp. ssp. *majus* Briq. — Kolozs (Soó Kv. 652), Torda (Freyn 83, Wolff MNL. I. 65), Szszt.miklós-Apahida (!Priszter 85)

359. *Chenopodium botrys* L. — Szamosfa-Apahida (!Priszter l. c.), Torda (Ercsei 95)

360. Ch. *Schraderianum* Schult. — M.vásárh. (Ny. Mv. 33 ex BK. XIII. 330)

Dubiae : Ch. *ambrosioides* L. — Torda (Ercsei 95)

Ch. *bonus-Henricus* L. — Torda (Ercsei 95)

361. Ch. *vulvaria* L. — Kv. Szénafű : Melegv.(!), Kolozs (Freyn 83), Torda (Ercsei 95, Freyn 33), M.vásárh. (Ny. ap. Soó 38)

362. Ch. *polyspermum* L. et b. *acutifolium* (Sm.) Becker — Frequens.

363. Ch. *hybridum* L. — Frequens, in formis pluribus, sic a. *cymigerum* Neilr. b. *spicatum* Beck (e. g. Kv. Szénafű : Soó BK. XXIII. 157)

364. Ch. *murale* L. — Kv. Szénafű (Soó Kv. 181), Szamosfa (Richt., Ny. in Ny. Kv. 181), Sz.újvár (K. et O. 8), Torda (Ercsei 95), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 39)

365. Ch. *urbicum* L. — Frequens. — b. *intermedium* (M. et K.) Koch. Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 157, Kv. 653, Ny. Kv. 653), Kolozs (Ujv. Ny. I. c.), Torda (Freyn 83, Sebők 33, Todor 59)

366. Ch. *glaucum* L. — Frequens. — Formae rariores : f. *angustifolium* Zap. (*angustatum* Nyár.) Szamosfa (Soó ap. Ny. Kv. 181), Torda (Todor 59), f. *humile* Peterm.

367. Ch. *Wolfii* Simk. — Torda-Sz.t.mihály (Wolff. ap. Simk. Term. r. Füz. III. 164, Wolff FEAH. 1017, Wolff-Borza FEH. 134, FER. 230, Hayek 466, Richt., Simk. ap. Soó AGH. V. 156, Barth, Borza, Ny. ap. Todor 60). E Torda-Sósf. erroneo indicata (Pax, Pr. Fl. II. 280, cf. Todor I. c.)

368. Ch. *botryodes* Sm. (*Ch. crassifolium*, *blitoides* auct.) — In formis a. *Degenianum* et b. *Lengyelianum* Aellen Kv. Szénafű (Ny. FK. 48—49, FER. 1927, Soó Kv. 180, a. b.), Szamosfa (Soó GM. 100, in Gr. 249, Priszter 86 b.), Torda (Schur VSV. X. 78, Soó in Gr. I. c., Todor 60) NB. Ch. *chenopodioides* (L.) Aellen, nomen dubium

369. Ch. *rubrum* L. — Kolozs (Bgt. I. 199, Soó Consp. 50), Désakna (Czetz 11), Torda (Bgt. I. c., Ercsei 95, Todor 60), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Scr. I. 43)

370. Ch. *album* L. — Frequens, in formis permultis :

A. a. *spicatum* Koch (*Linnaeanum* Beck, huc : f. *ovalifolium* Ludwig, f. *laceratum* Ludwig Kv. Szénafű : Soó, Ny. Kv. 183), b. *glomerulosum* (Rchb.) Peterm., e. *lanceolatum* (Mühlbg.) Coss. et Germ. (Kv. Szénafű : Soó Kv. 184, Szamosfa : Soó BK. XXIII. 157, Torda : Todor 59), d. *lanceolatiforme* Murr (Kv. Szénafű : Soó I. c.), e. *subfiliiforme* Murr (Szamosfa : Soó Kv. 184), f. *viridescens* (St. Amans) Moq. (Kv. Szénafű, Szamosfa : Soó BK. I. c., Ny. Kv. 184) Huc : f. *oblongum* Neilr., f. *laciniatum* Murr, f. *vivax* Murr, f. *subhasiatum*

- Krasan e Kv. Szénafű (Ny. Kv. 184), **g. pseudo-Borbásii** Murr (Kv. Szénafű : Soó l. c.)
- B. j. pseudopolyspermum** (Murr) Beck (Kv.-Szamosfa : Ny. l. c.), **h. viride** (L.) Wahlbg. (*cymigerum* Koch), Kv.-Szamosfa (Soó, Ny. Kv. 184, huc *f. integrum* Beck : Szamosfa Ny. l. c.), Torda (Ercsei 95), **i. rhombeum** Peterm. (Kv. Szénafű : Ny. l. c.), Torda (Todor 59), **l. paucidens** Murr (Kv.-Szamosfa : Ny. l. c.)
- C. (ssp.) pseudoopulifolium** Scholz — Kv. Szénafű (Soó l. c.)
- D. (ssp.) concatenateum** (Thuill.) Gräbn — Kv. Szénafű (Soó l. c.)
371. **Ch. strictum** Roth — Kv. Szénafű, Apahida (Ny. Kv. 182) — **b. erosum** Murr Kv. Szénafű (Ny. l. c.) — Torda (Todor 59)
372. **Ch. fieifolium** Sm. — M.vásárh. (Pr. Fl. I. 270). An vero?
373. **Ch. opulifolium** Schrad. — Szamosfa, Apahida (Ny. Kv. 181), Sz.újvár (K. et O. 8), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Scr. I. 43)
374. **Ch. album × opulifolium** (Borbásii Murr) — Kv. Szénafű (Soó Ny. Kv. 185)
375. **Ch. album × strictum** (pseudostriatum Zschacke) — Kv. Szénafű (Ny. BK. XXXVIII. 135, Soó Kv. 185) — **b. semilanceolatum** Nyár. — Apahida (Buia ap. Ny. l. c.)
376. **Ch. foliosum** (Mönch) Asch. — Sz.újvár (K. et O. 6), Désakna (Czetz 11), Torda (Schur VSV. X. 80), Vajda szt. iván (Ercsei 103) — **Ch. capitatum** (L.) Asch. Torda (Ercsei 103, Sebők 43) Adventiva.
377. **Atriplex nitens** Schk. — Kv. Szénafű (Soó GM. 98—100, Ny. Kv. 186), Szamosfa (Ny. l. c., EM. 109—110), Szamosfa, Apahida Soó in Gr. 249), Kolozs (Soó Kv. 653), Torda (Ercsei 188, Pr. Cp. 226? in p. 54 : *A. rosea*)
378. **A. hortensis** L. — Subspontanea. Szamosfa (Soó BK. XXIII. 147, Priszter 86)
379. **A. rosea** L. — Kv., Kolozs (Freyn 82), Torda (Ercsei 101, Freyn 82, Pr. Cp. 54), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 39 *f. virens* Peterm.), Désakna (Czetz 11)
380. **A. tatarica** L. Frequens, in formis multis : *f. incisa* (MB) Gürke (typus), *f. obtusiloba* Beck, *f. integra* (Moq.) Gürke (omnes : Szamosfa, Apahida (Soó BK. XXV. 143, Bujorean FER. 1677, Ny. Kv. 187), Torda (Todor 61, cf. Schur En. 577), — *f. diffusa* (Ten.) Gürke, *f. bracteata* Waisb. Szamosfa, Apahida (Soó l. c.), — *f. parvifolia* Schur Kolozs (Schur En. 578), Désakna (Hg. II. 70)
381. **A. hastata** L. praecipue **b. merotheea** Schum. (*ba. ruderalis*) Kv. Szénafű (Soó Kv. 188), Szamosfa (Simk. En. 470, Soó BK. XXIII. 157, GM. 100—1, Pr. Fl. II. 299, Priszter 86, Csürös BCl. XXVII. 80), Apahida (Soó in Gr. 247), Kolozs (Bgt. I. 205, Schur En. 577, Freyn 73, Pr. l. c. 244), Désakna (Bgt. l. c., Czetz 11), Dés, Sz.nyires (Pr. MBL. XV. 254), M.vásárh. (Bgt. l. c.), Torda (Bgt. l. c., Ercsei 101, Schur En. 577, Freyn 83, Todor 62), Telekfarka, Szék (Soó Consp. 32), Melegv. (Pr. Fl. II. 292), M.záh (Pr. Cp. 224), Báld-N.sármás (Pr. FK. 312, Cp. 230) — **bb. salina** Wallr. — Szamosfa, Apahida, Kolozs (Soó BK. l. c., Gr. 247, 250, Gm. 100), Torda (Soó in Gr. 250)
- e. heterosperma** Gr. et Godr. — Szamosfa, Apahida-K.kara (Ny. Kv. 188), Dezmér (Todor FER. 2750), Torda (Todor 61)
- d. triangularis** (Willd.) Moq. (*dehastata* Borb.) — Kv. Szénafű

- (Ny. FK. 49, Kv. 187), Szamosfa, Dezmér (Ny. Kv. 187, cf. EM. 110, 114), Szamosfa (Soó XXIII. 157, Bujorean BCl. XIV. 227)
- e. nitentiformis** Nyár.? — Kv. Szénafű-Szamosfa (Ny. Kv. 187 anne *hastata* × *nitens*)
- f. longicornis** Csürös et Nyár. — Apahida-Szszt.miklós (Csürös in Ny. 653)
382. **A. oblongifolia** W. et K. — Kv. Szénafű (Ny. Kv. 188), Melegv. (Pr. Fl. II. 291), Kv.-Szamosfa (Ny. EM. 109), Apahida (Soó l. c.), Kolozs (Ny. l. c.), K.borsa(l), Torda (Todor 62), Dés (Morariu 178) — *f. robusta* Beck — Kv.-Szamosfa (Ny. Kv. 188, FER. 2748), — **b. odontotheca** Borb. — Kv. Szénafű (Ny. l. c.)
383. **A. patula** L. Frequens, in formis multis : **a. erecta** (Huds.) Lange et **b. angustifolia** (Sm.) Lange. Szamosfa (Soó BK. XXIII. 157) — *f. angustissima* Gr. et Godr. Torda (Todor 62) — *f. tridentata* Beck Kolozs (Ny. Kv. 653)
384. **A. litoralis** L. (*a. angustissima* Moq.) — Kv. Szénafű-Szamosfa (Wolff, Ny. Kv. 186, EM. 110), Melegv. (Andrae B. Z. XIII. 899, Simk. En. 470, Pr. Cp. 141, Fl. II. 291, Soó Consp. 32), Telekfarka (Soó l. c.), Szamosfa (Schur VSV. X. 107, Soó GM. 101, in Gr. 247, Consp. 32, Simk. l. c. Priszter 86, Csürös l. c.), Dezmér (Ny. l. c.), Apahida (Ny. l. c.), Kolozs (Bgt. I. 202, Soó l. c. Pr. Fl. II. 264), Désakna (Bgt. I. 206, Pr. l. c. 297), Szék (Soó Consp. 50), Szék-Sz.újvár (Janka ÖBZ. VI. 363), Torda (Bgt. l. c. Ercsei 101, Winkler 49, FER. 1678, Soó in Gr. 247)
- b. serrata** (Huds.) Sm. — (incl. *dentata* Huds.) Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 107), Telekfarka-Apahida (Soó 108), Szamosfa (Schur En. 576, Soó BK. XXIII. 157), Dezmér (Ny. Kv. 186), Torda (Todor 61)
385. **Kochia prostrata** (L.) Schrad. — Kv. Szénafű : Melegv. (Janka MTK. XII. 176, Simk. En. 467, Soó GM. 102, Consp. 50, Ny. Kv. 176, Pr. Cp. 141, Fl. II. 292), Apahida-K.kara (Ny. Kv. 652), Sz.újvár (Pr. Cp. 248), Désakna (Bgt. I. 202), Torda (Bgt. l. c., Ercsei 133, Schur VSV. X. 80, Soó in Gr. 248, Pr. Fl. I. 276), M.ludas (Wolff 65)
386. **K. scoparia** (L.) Schrad. Subspontanea. — Szamosfa-Dezmér (Soó BK. XXIII. 157, Bot. Arch. XVII. 359), Sz.újvár (K. et O. 15), Torda (Freyn 83, Ercsei 95)
387. **Salicornia europaea** L. — Kv. Szénafű : Melegv. (Hayek 466, Ujv. Kv. 652, Soó Consp. 14, 50, Pr. Fl. II. 201), Szamosfa (Landoz EM. II. 36, Simk. En. 467, Freyn 83, Soó GM. 102, in Gr. 248, Consp. 14, 32—4, auct. multi ap. Ny. Kv. 176, Ny. EM. 113—4, Csürös BCl. XXVII. 82), Dezmér (Ny. l. c., Pr. Fl. II. 293), Apahida (Freyn 83, Ujv. l. c., Soó Consp. 33, Pr. Fl. II. 293), Kolozs (Bgt. I. 5, Schur En. 569, Soó in Gr. 248, Consp. 14, 33, Pr. Fl. II. 294), K.kara, K.bós, Virágosv. (Freyn 83), Hesdát (Pr. l. c. 296), Bonchyires (K. et O. 22, Pr. 54), Sz.újvár (Janka 599), Szék, Szék-Gyulatelke (Soó 108, Consp. 14, 32—4), Dés (Czetz 20), Désakna (Pr. Fl. II. 297), Torda (Bgt. I. 5, Ercsei 138, Schur VSV. X. 80, Winkler 49, Freyn 83, Hayek 467, Soó in Gr. 248, Pr. Cp. 53, Fl. II. 290, Borza FER. 395, Todor 62) — **b. striata** (Willd.) FGWMey. — Torda (Todor 62)

388. *Suaeda maritima* (L.) Dun. in formis : **a.** *vulgaris* Moq. et **b.** *salinaria* (Schur) Simk. — Kv. Szénafű, Melegv. (Andrae B. Z. XIII. 899, Wolff ap. Ny. Kv. 175, Janka 599, Soó Consp. 14, 50, Pr. Fl. II. 191), Szamosfa-Dezmér-Apahida (Landoz Kv. I. 13, Schur VSV. X. 112, En. 568, Freyn 83, Soó GM. 102, in Gr. 247, BK. XXIII. 147, Consp. 14, 33—4, Ny. Kv. 175, EM. 114, auct. pl. ap. Ny. I. c., Pr. Fl. II. 293 **a.** **b.** Csűrös), K.kara, K.bós, Virágosv. (Freyn 83), Kolozs (Bgt. I. 202, Schur En. 568, Janka 599, Freyn 83, Soó Kv. 652, Pr. I. c. 294 **a.** **b.**), Telekfarka-Apahida, Szék, Szék-Gyulatelke (Soó 108, Consp. 14, 33), Sz.újvár (Janka 599), Désakna (Bgt. I. c., Czetz 20, Pr. I. c. 298), M.záh (Simk. En. 466), Torda (Bgt. I. 202, Ercsei 95, En. 568, Wolff 65, Freyn 83, Soó in Gr. 248, Todor 62, Pr. I. c. 290, Borza FER. 39 **a.** **b.**) — **c.** *salsa* (L.) Moq. — Kv. Melegv. (Janka 599, Pr. I. c. 291), Szamosfa (Csűrös I. c.), Dezmér (Soó BK. XXII. 71), Apahida-K.kara (Ny. Kv. 175), Kolozs (Schur En. 568, Janka 599), Sz.újvár (Janka 599), Torda (Schur VSV. X. 80, Hayek 467, Todor 62)

389. *Salsola kali* L. (resp. *S. ruthenica* Iljin) — Kolozs (Bgt. I. 203), Torda (Ercsei 133), Bonenyires (K. et O. 22) Dubia.

390. *Petrosimonia triandra* (Pall.) Simk. — In formis : *densiflora* et *laxiflora* Fenzl (cf. Janka 599, ÖBZ. VI. 203 : Kolozs) — Kv. Szénafű : Melegv. (Landoz Kv. I. 13, Andrae B. Z. XIV. 899, Schur VSV. II. 175, X. 112, Janka 599, ÖBZ. V. 230, Hayek 465, Soó GM. 102, in Gr. 243, Consp. 50, Pr. Cp. 141, Fl. II. 291, Ny. Kv. 176 etc.), Apahida-K.kara (Ny. I. c., FER. 380, Pr. Fl. II. 293), Kolozs (Bgt. I. 203, Schur VSV. X. 112, Janka 599, ÖBZ. I. c., Hayek 465, Soó in Gr. 248, Consp. 50), Virágosv. (Hb. Norm. 5517), Torda (Bgt. I. c., Ercsei 133, Schur VSV. X. 112, Wolff 65, Winkler 49, Janka 599, Borza FER. 137, FER. 38, Soó I. c., Todor 63, Pr. Fl. II. 290), Hesdát (Pr. I. c. 296), Szék-Sz.újvár (Janka 599, ÖBZ. VI. 363), Szék (Soó 108, Consp. 50)

Delenda : *Corispermum hyssopifolium* L. — Vszt.gothárd (Janka 599)

Beta vulgaris L. Subspont. — Szamosfa-Apahida (Priszter 86)
Spinacia oleracea L. Subspont. — Kv.-Szamosfa (Priszter I. c.)

Amaranthaceae.

391. *Amaranthus retroflexus* L. — Frequens. — **f.** *crispulus* Nyár. Kv.-Szamosfa (Ny. Kv. 189), — **f.** *pusillus* Opiz Szamosfa, Apahida, Kolozs, Torda (Soó GM. 101, in Gr. 248, Priszter 86) — **b.** *Delilei* (Richt. et Lor.) Thell. — Kv., Szamosfa, Apahida (Soó BK. XXII. 7, Bot. Arch. XIX. 350, Kv. 189), Kolozs-K.bós (Ny. Kv. 189), Sec. Priszter I. c. etiam *f. major* Moq. et *f. elongatus* Beck.

392. *A. hypochoondriacus* L. var. *chlorostachys* (Willd.) Thell. — Kolozsvár-Szamosfa (Ny. Kv. 189, Priszter I. c.), — Dezmér-Apahida (!Priszter I. c. et *f. prostratus* Moq.)

393. *A. angustifolius* Lam. = *A. blitum* L. var. *silvester* (Desf.) Thell. — Szamosfa, Apahida (Priszter I. c.), K.bós (Ny. Kv. 190, ap. Soó Bot. Arch. XIX. 190), Torda (Simk., Wolff ap. Soó I. c., Todor 63)

A. paniculatus L. Subspont. — Vszt.gothárd-Feketelak (Janka ap. Soó Bot. Arch. XIX. 350)

394. *A. adscendens* Lois. = *A. lividus* L. var. *ascendens* Thell. — Kv. Szénafű (Soó Kv. 190 f. *major* (Hag.) Thell.), Kv.-Szamosfa-Apahida (Wolff ap. Ny. Kv. 190 f. *major*, Priszter I. c. etiam *f. microphyllus* Thell. resp. *repens* (Spenn.) Thell.), Sz.újvár (K. et O. 3), Torda (Todor 63), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 39)

395. *A. albus* L. — Sza mosfa-Apahida (!Priszter I. c.), K.bós (Ny. Kv. 190)

Portulacaceae.

396. *Portulaca oleracea* L. — Frequens.

P. grandiflora Hook. — Subspont. Szamosfa, Szszt.miklós (Priszter AGH. VI. 86)

Caryophyllaceae.

397. *Stellaria aquatica* (L.) Scop. — Kv. Szénafű (Soó GM. 96), Szamosfa-Apahida (!Priszter 86), Bonchida(!), Sz.újvár (K. et O. 17), Torda (Ercsei 100, Todor 63)

398. *S. media* (L.) Vill. — Frequens.

399. *S. holostea* L. — (EK. 277) — Kv. Szénafű, Fejérd, Dezmér, Ajton, Apahida, Sz.újvár, B.váralja, Szu.németi, Coptelke, Bonchida-Szék, Sz.jenő, Iklód, Szék, Vszt.egyed, Pujon, Kályán, Korpád, Kolozs, P.kamarás, N.sármás, M.ménes, Báld, Teke, M.bánd, M.vásárh., Bádok-Doboka-Moró-Tötör. — Torda(!) — **b.** *elatior* Peterm. — Dezmér (Ny. Kv. 193)

400. *S. graminea* L. — Frequens.

Dubia : *S. palustris* Retz. Sz.újvár (K. et O. 15)

401. *Cerastium anomalam* W. et K. — Kv. Szénafű (Soó Gm. 93, Pr. Cp. 96, Knapp, Richt. ap. Ny. Kv. 193), Szamosfa, Dezmér (Soó, Ujv. Kv. 653, Ny. Kv. 193), Apahida (Ny. Pop FER. 400), Kolozs, K.bós, Virágosv. (Freyn 119), Dés (Pr. Cp. 79), M.vásárh. (Ny. Mv. 37), Torda (Ercsei 100 sub *C. trigyno* ?, Todor 67)

402. *C. brachypetalum* Desp. — Kv. Szénafű (Soó GM. 90, Kv. 652 BK. XXII. 257, Ny. Kv. 194), Kolozs, K.bós (Freyn 119), Torda (Todor 63), M.szabad (Ny. Mv. 36) — **b.** *tauricum* (Spr.) Kern. — Kv. Szénafű (Soó BK. I. c.) Jósikatanya (Ujv. Kv. 652) Torda (Todor 63)

403. *C. vulgatum* L. — Frequens. — **b.** *glandulosum* (Bönningh.) Wirtg. — Kv. Szénafű (Soó Kv. 194), Torda (Todor 64) — **c.** *elatius* (Peterm.) Gürke — Kv. Szénafű (Soó Kv. 194, BK. XXIII. 147)

404. *C. semidecandrum* L. — Buza (Pr. Cp. 145), Torda (Ercsei 150) Dubia.

405. *C. glutinosum* Fr. — Kv. Szénafű, Melegv. (Soó Kv. 654, Consp. 56), Szamosfa (Ri ap. Ny. Kv. 195, Soó Kv. 654, Consp. 50, 56), Apahida (Ny. Kv. 195), Kolozs (Freyn ap. Ny. Kv. 195, Soó Consp. I. c.), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 40), Torda (Ercsei 100, Todor 64)

406. *C. glomeratum* Thuill. — Galambod (Ny. Mv. 36)
C. arvense L. — Torda (Ercsei 100), Sz.újvár (K. et O. 8 v. *incanum* Ledeb.) Summum adventiva.
407. *Holosteum umbellatum* L. — Frequens, in formis multis, sic etiam f. *glutinosum* (M. B.) Gürke (Torda : Todor 64), f. *semicalvum* Schur (Kolozs : Soó Kv. 654), f. *subglabrum* Nyár. (Szénafű : Zsák in Ny. Kv. 195)
408. *Sagina procumbens* L. — Kolozsvár-Apahida (!Priszter 86), Bonchida (Soó 108), F.mikola (Hg. II. 66)
409. *Arenaria serpyllifolia* L. — Frequens. — b. *viseida* (Lois.) DC. Kv. Szénafű (Richt. ap. Ny. Kv. 196), Torda (Todor 64)
410. *A. Biebersteinii* Schlechtd. — Kv. Szénafű (Landoz Kv. I. 4, Schur VSV. II. 175, En. 112, Andrae BZ. XI. 438, Janka 561, Freyn 119, Soó GM. 88, 90, Kv. 654, auct. multi ap. Ny. Kv. 196, Pr. Cp. 136, 138, 142, Ny. FER. 1472), Melegv. (Soó Conspl. 56), Apahida (Pr. ap. Ny. I. c., Soó Kv. 654), Kolozs (Schur l. c., Freyn 119), K.bós, Virágosv. (Freyn 119), Torda (Janka 561, ÖBZ. VI. 194, Winkler 49, Wolff 57, Todor 64)
- Delenda : *Minuartia verna* (L.) Hiern. — Torda (Ercsei 75)
411. *Moehringia trinervia* (L.) Clairv. (EK. 277) — Kv. Szénafű, Bonchida-Szék, Korpád, Sz.újvár, F.mikola, B.váralja, Szu.németi, Coptelke, N.sármás. — Torda (Ercsei 75, Todor 64)
412. *Spergula arvensis* L. — Szamosfa (Borb. ap. Ny. Kv. 197), Ajton (Freyn, Knapp ap. Ny. I. c.), Sz.újvár (K. et O. 24), Torda (Ercsei 39, et sub „*S. nodosa*“)
413. *Spergularia rubra* (L.) Presl. — Kv. Szénafű (Ujv. Kv. 654), Szamosfa, Apahida (Soó GM. 101, ap. Gr. 247, Pr. Fl. II. 294, Priszter 86), Kolozs (Ujv. I. c.), Désakna (Pr. I. c. 297)
414. *S. salina* Presl — incl. b. *halophila* (Bunge) Simk. — Kv. Szénafű, Melegv. (Simk. MNL. III. 51, En. 145, Hayek 466, Ny. Kv. 197, Soó Kv. 654, Conspl. 14, pt. b., Morariu FER. 2523), Szamosfa-Dezmér-Apahida (Simk. En. 145, Pr. MBL. V. 32, Soó GM. 100—1, ap. Gr. 247, Kv. 654, Richt., Borb. ap. Ny. Kv. 197 pt. b.), Kolozs (Bgt. I. 409, Schur VSV. X. 111, Freyn 118, Soó ap. Gr. 247, Conspl. 50), K.bós (Freyn 118, Soó ap. Gr. 247 b.), Szék (Soó Conspl. 33, 50), Báld, N.sármás (Pr. FK. 312, Cp. 230), Virágosv. (Freyn 118), Torda (Bgt. I. c., Schur VSV. X. 78, Soó in Gr. 247, Todor 64) —
415. *S. marginata* (DC.) Kittel — Szamosfa (Schur En. 126)? — cf. Soó BK. XXII. 75 — Pr. Fl. II. 300), Kolozs (Bgt. I. 409, Freyn 118, Pr. I. c. 296), Torda (Schur l. c., Wolff 57, cf. Todor 64)
416. *Herniaria glabra* L. — Kv.-Szamosfa-Apahida (!Priszter 86,) Torda (Wolff 59)
417. *H. incana* Lam. (incl. *Besseri* (Fischer) Gürke) — Kolozs (Schur En. 222)?, Torda (Winkler 48, Wolff ap. Janka 568)
418. *Scleranthus annuus* L. — Frequens, in formis multis.
419. *S. uncinatus* Schur — Kv. Szénafű „Morgó, Csup“ (Ny. BK. XXXIX. 135, Kv. 199, Ujv. Kv. 654, Soó 101)
- 419a. *S. perennis* L. — Ad limites : Torda (Simk. En. 147)

- S. intermedius* (*annuus* × *perennis*) Kitt. — Kv. Szénafű (Schur En. 224), vix nam *S. perennis* in dit. Szénafű deest (cf. Soó BK. XXII. 75)
420. *Agrostemma githago* L. — Frequens.
421. *Viscaria vulgaris* Bernh. — (EK. 278) — Kv. Szénafű, Fejér, Apahida, Vszt.gothárd, Sz.újvár, B.váralja, Coptelke, Báld, M.vásárh. — Torda(!)
422. *Silene eucubalus* Wibel. — (EK. 278) — (var. *latifolia* (Mill.) Beck) — Kv. Szénafű, Fejér, Szamosfa, Korpád, Sz.jenő, Bonchida-Szék, Cege, Pujon, Feketelak-Vszt.gothárd (cum *lus. rubra* Ram.), Bazéd, Szabéd, Mojos. — Torda (Sebők 33, Todor 64) — var. *oleracea* (Ficinus) R. et F. — Kv. Szénafű, Szamosfa (Ny. Kv. 200, Ujv. Kv. 654)
423. *S. nutans* L. — (EK. 278) — Kv. Szénafű, Fejér, Bonchida-Szék, Cege-Pujon, Vszt.gothárd, Omboztelek, Kolozs, B.váralja, Szu.németi-Coptelke, Feketelak, M.szilvás, M.vásárh. — Torda (Sebők 39, Todor 64) — *lus. rubens* (Vest.) Rohrb. — Kv. Szénafű (Soó Kv. 202)
424. *S. nemoralis* W. et K. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 86, En. 110, auct. multi ap. Ny. Kv. 202, Ujv. Kv. 654), Melegv. (Soó Kv. 654), Mojos, Bazéd (Lengy. ap. Soó 108)
425. *S. longiflora* Ehrh. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 86, Soó GM. 87, Hayek 466, Pr. Cp. 84, Ny. Soó Kv. 201, AGH. V. 146, Wolff ap. Ny. I. c.), Szamosfa-Apahida, Jósikatanya (Pr. MBL. V. 32 sub „*S. multiflora*“, Cp. 142, auct. plures ap. Ny. I. c.), Gerend, M.záh (Ercsei 148), Torda (Bgt. I. 398, Ercsei 148, Winkler 48)
426. *S. chlorantha* Ehrh. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 86, En. 102, Soó GM. 90, Wolff ap. Ny. Kv. 201, Hayek 466)
427. *S. otites* (L.) Wibel — Frequens. — b. *pseudotites* (Bess.) Borb. — Kv. Szénafű (Soó GM. 97, BK. XXIII. 71, Ghisa BCI. XXI. 60, Ujv. Kv. 654, Meusel 301), Melegv. (Butujás ap. Ny. Kv. 201), Virágosv. (Ny. I. c.), Torda (Ercsei 72)
- Delenda : *S. parviflora* (Ehrh.) Pers. — Kv., Kolozs, Torda (Bgt. I. 397)
- S. dichotoma* Ehrh. — Torda (Ercsei 148)
- S. armeria* L. — Kecsed (Hg. I. 126) Verisimiliter subspontanea.
428. *Lychnis flos-cueuli* L. — Frequens. *Lus. albiflora* Tinant. Kv. Szénafű (Soó Kv. 203)
- Dubia : *L. coronaria* (L.) Desr. — Mezőség (Bgt. I. 218)
429. *Melandrium album* (Mill.) Garcke — Frequens.
430. *M. noctiflorum* (L.) Fr. — Szamosfa (Richt. ap. Ny. Kv. 203, Soó, Ujv. Kv. 655), Mócs (Pr. Cp. 109), Kályán(!)
431. *M. viscosum* (L.) Čel. — Szamosfa (Landoz EM. II. 27, Soó Kv. 654, Richt. Ny. Kv. 203, Pr. Cp. 87), Apahida (Soó I. c.), Kv. Melegv. (Pr. Fl. II. 291, ap. Ny. I. c.), Virágosv. (Freyn 120), Torda (Ercsei 91, Wolff 57, Sebők 46, Todor FER. 1461)
432. *Cuebalus baccheifer* L. — Kv. Szénafű (Soó GM. 79), Apahida (Soó Kv. 204), Bonchida(!), Torda (Ercsei 90, Sebők 33), Gerend (Ercsei 90), M.záh (Ercsei 90, Pr. Cp. 105), Sz.újvár (Pr. Cp. 74), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 44)

433. *Gypsophila muralis* L. — Frequens.
434. *G. arenaria* W. et K. (*var. leioclados* Borb.?) — Kolozs, Torda (Bgt. I. 384) — Dubia, e Kv. Szénafű (Pr. Cp. 142) certe delenda. Etiam dubia *G. paniculata* L. — M.záh (Pr. Fl. I. 300)
435. *Vaccaria pyramidata* Medic. praecipue var. *grandiflora* (Fisch.) Cel. — Kv. Szénafű (Soó BK. XXV. 143, Kv. 204) -Szamosfa (Priszter 86), Fejérd, Szék, Cege, Apahida-Kályán (Soó 108), Sz.újvár (K. et O. 25), M.csán (Simk. En. 122), Kékes (Pr. Cp. 165), Torda (Bielz ap. Fuss VSV. XV. 127), M.vásárh. (Ny. Mv. 35)
- Dubia : *Tunica prolifera* (L.) Scop. — Torda, M.záh (Ercsei 143)
436. *Dianthus barbatus* L. — Frequens, in formis pluribus: ssp. *latifolius* (Gr. et Sch.) Hegi — Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 148, Kv. 654 cum *f. subfastigiatus* Schur), B.váralja (Hg. III. 125—8), certe magis distributa.
- ssp. *saxigenus* (Schur) — Frequens, etiam *f. commutatus* Zap. Kv. Szénafű (Ny. Soó Kv. 206), *f. solitus* Zap. Szénafű (Ny. l. c.), *f. repentiformis* Nyár. Szénafű, Apahida (Soó Kv. 654), Sz.újvár (Hg. II. 68)
- ssp. *puberulus* (Simk.) — Kv. Szénafű (Andrae BZ. XI. 436, Schur En. 94, Soó Kv. 206 non typ.), M.szovát (Péterfi MNL. XVII. 59), Berkenyes (Fr ap. Simk. En 119), M.vásárh. (Ny. Mv. 37, Pr. Cp. 106), Torda (Borb. TF. XII. 49)
437. *D. collinus* W. et K. var. (tr.) *debreceniensis* Soó (*subcollinus* Nyár.) — Kv. Szénafű (Richt. ap. Ny. BK. XXXIX. 135, Szűcs AGH. V. 198)
- ssp. *glabriusculus* (Kit.) Thaïsz resp. Soó — (AGH. V. 198) — Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 154, GM. 85, Kv. 654, Pr. Cp. 84, But., Richt. ap. Ny. Kv. 207, ap. Szűcs AGH. V. 200), Ajton (Freyn 120), Kályán (Soó 108), Ördöngősfüzes (Pr. Cp. 108), Vszt.iván (K. et O. 10), Mócs, Sz.lekence (Pr. MBL. V. 31), Buza (Pr. Cp. 145), Kékes (Prod.), Vszt.gothárd (Janka), Sz.kocsárd (Barth ap. Szűcs l. c.)
- f. subpaniculatus* Schur incl. *f. furcatus* Nyár. — Kv. Szénafű (Soó Kv. 207, ap. Szűcs l. c.), Dezmér (Soó, Ujv. Kv. 654) — *f. pseudotrifasciculatus* Soó — Kv. Szénafű (Fuss Transs. 95, Simk. En. 120, Ny. Kv. 207 sub „*D. trifasciculatus*“, cf. Soó BK. XXIII. 154)
- Dubia : *D. trifasciculatus* Kit. — Vszt.gothárd, Cege (Janka ÖBZ. VI. 193)
- Delenda : *D. giganteus* D Ürv. — Apahida (Schur VSV. X. 117)
438. *D. armeria* L. — (EK. 278) — Kv. Szénafű, Fejérd, Dezmér (*var. glaber* Scholz), Berkenyes, Kékes, Sz.újvár, Sz.jenő, Cege, Pujon-Ombozteleke, Kályán. — Désakna (Pr. Fl. II. 298), Torda(!)
439. *Saponaria officinalis* L. — Frequens.

Ceratophyllaceae.

440. *Ceratopyllum submersum* L. — Mezőség tavai (Pr. MBL. V. 32) : Kv. Szénafű (Ny. FK. 48—9, Kv. 208, Soó AGH. VI. 5, Consp. 10, Arch. Biol. XVII. 97), Apahida (!Ny. Kv. 208, EM. 114, Soó Arch. l. c.), Cege (Pr. Cp. 50, Soó Arch. 92), Torda (Bgt. II. 90, Sebők 39)
441. *C. demersum* L. — Szszt.miklós (Pápai ap. Soó MBIM. II.

- 68, cf. Ny. Kv. 208), Cege(!), M.tóhát(Csató ap. Soó l. c.), M.záh (Simk. En. 233), M.szovát (Borb. TTK. 1888. 38), Torda (Bgt. II. 89), M.vásárh. (Ny. ap. Soó l. c.) — b. *apiculatum* (Cham. et Schlechtd.) Asch. — Szszt.miklós-Apahida (Ujv. Kv. 654, Soó Arch. 98)

Nymphaeaceae.

442. *Nymphaea alba* L. — Cege (IPr. MBL. V. 31, Cp. 223), Torda, M.záh, M.kapus (Ercsei 110), Sz.kocsárd(!), M.vásárh. (Bgt. ap. Fuss Transs. 38, Ny. Mv. 38), M.sztgyörgy (Ny. ap. Soó Szf. 23)
443. *Nuphar luteum* L. — Torda (Ercsei 110), M.vásárh. (Ny. Kv. 38), M.sztgyörgy (Ny. l. c.), Sz.régen (Emerich ap. Fuss 38 ; Unverricht ap. Schur En. 35, Bielz Landk. 78 sub „*N. sericeo*“)

Ranunculaceae.

444. *Paeonia tenuifolia* L. — (AGH. V. 156) : Mezőzál hegyei Bota, Bojur (Tinta ap. Sternheim Sieb. 24, Janka 556, ÖBZ. V. 60, VI. 193, Barth 106, Landoz EM. II. 26, Wolff VSV. VIII. 20, MNL. I. 56, FEAH. 2080, FER. 249, auct. plures ap. Huth Mon. Paeonia 270—1, ap. Soó AGH. V. 156) — cum *f. latisepta* Neilr. (*P. hybrida* auct.)

445. *Caltha laeta* Sch., Nym., Ky. (*C. palustris* auct.) — Frequens
b. *pseudocornuta* Zap. — Kv. Szénafű (Ny. Kv. 211)

446. *Trollius europaeus* L. — (EK. 278) — Kv. Szénafű, Fejérd, Ajton, K.bós, Buza. — Torda (Ercsei 157, Wolff 56)

447. *Helleborus purpurascens* W. et K. — (EK. 278) — Kv. Szénafű,* Fejérd, Dezmér, Apahida, Sz.újvár, F.mikola,* B.váralja, Szu.németi, Coptelke, Bonchida, Sz.jenő, Iklód, Szék, Szék-Vszt.-egyed-Ombozteleke-Pujon-Cege, Vszt.gothárd, Kiskályán, Korpád, Kolozs, Berkenyes, P.kamarás, M.szilvás, N.sármás, M.ménes, Teke, K.bós, Kékes, Gyeke-Sármás, Szabéd,* M.vásárh. partim etiam
b. *Baumgartnii* Kov.(*) — Torda (Ercsei 75)

448. *Nigella arvensis* L. (*N. sativa* Pr. Cp. 165—6) — Frequens.
b. *trachycarpa* Borb. Kv. Szénafű (Soó BK. XXV. 144)

449. *Isopyrum thalictroides* L. — (EK. 278) — Fejérd, Bonchida, Sz.jenő, Iklód, Bonchida-Szék, Sz.újvár, B.váralja, Szu.németi, Kékes, M.bánd, Bazéd, M.vásárh., Doboka-Moró-Tötör. — Dés (Czetz 16)

450. *Aetaea spicata* L. — (EK. 278) — Bonchida, Sz.jenő, Iklód, Bonchida-Szék, Vszt.egyed-Pujon, Vszt.gothárd, Kályán, B.váralja, Szu.németi, Coptelke, F.mikola, M.szilvás, Szabéd, M.bánd. — Torda (Ercsei 151)

451. *Cimicifuga europaea* Schipcz. (*C. foetida* auct.) — Kiscég-Nagycég-Katona (Janka MTK. XII. 184)

452. *Aquilegia vulgaris* L. — Cege (Soó 108 subsp.), Dés (Schur VSV. X. 115, Czetz 11). Tantum subspontanea.

453. *Consolida regalis* S. F. Gray (ssp. *arvensis* (Opiz) Soó) — Frequens. — b. *major* (Beck) Soó Kv. Szénafű (Soó ÖBZ. 1922. 242,

- BK. XXIII. 148) — **e. glanduligera** (Peterm.) Soó Szamosfa (Soó l. c.), Kv. Szénafü (Borb. ap. Soó l. c.)
ssp. paniculata (Host) Soó — Kv. Szénafü (Borb. ap. Ny. Kv. 213, MBL. III. 24) **b. adenopoda** (Borb.) Soó
454. **C. orientalis** (Gay.) Schrödinger — Válaszút (Soó 108, Kv. 641)
455. **Delphinium fissum** W. et K. — Kv. Melegv. (Walz MNL. I. 130, tantum olim : Soó BK. XXII. 75), Mezőség (Fuss Transs 32), ubi?
456. **D. Simonkaianum** Pawl. — Ajton (Pr. Cp. 105 sub *D. elato*, cf. Ny. Kv. 213—4?), Bala-N. erese (Ny. ap. Pr. Cp. 106, Kv. 214, ap. Pawl. Bull. Acad. Polon. 1933. 151)
457. **Aconitum anthora** L. — (EK. 279) — Kv. Szénafü, Dezmér, Kolozs, Berkenyes, Gerend, G.keresztür, Apahida, Kályán, Korpád, Vszt.gothárd, Szék, P.kamarás, Bazéd, Buza, Bánok. — Torda (Freyn 113), Buza (Grintescu Stud. Ac. anthora 53 f. *dacicum* Grint.)
458. **A. moldavicum** Hacq. — (EK. 279) — Fejérd, Apahida, Kiskályán, Korpád, Kolozs, Berkenyes, Mócs, Vszt.gothárd, Kékes, M.szovát, Kékes-Szt.miklós, P.kamarás, Bala-N.ercse, Sz.újvár, B.váralja, Bánok-Doboka. — Ad-limes : Bethlen (Reithoffer ap. Gáyer MBL. VI. 296 v. *australe* (Rchb.) Gáyer.)
459. **A. lycoctonum** L. ssp. **vulparia** (Rchb.) Gáyer — Bazéd (Lengy. ap. Soó 109)
460. **A. variegatum** L. — (EK. 279) — Fejérd, Ajton, Sz.újvár-Dés. — Torda (Wolff ap. Freyn 114)
461. **Pulsatilla australis** (Heuff.) Simk. resp. **P. montana** (Hoppe) Rchb. — Frequens. (Cf. Simk. MBL. V. 172—182, Jav. Magy. Fl. 364, Soó BK. XXIX. 126—7, Wagner Acta Botanica Szeged I. 21, sec. Wagner planta nostra est *P. montana*, *P. australis* hybrida specierum *montana* et *balkana*) — lus. *fuscoflorens* Simk. Kv. Szénafü (Simk. l. c.) — **b. Jankae** (F. Schultz) Simk. — Kv. Szénafü (Simk. l. c., Gáyer MBL. VIII. 56, Soó l. c.), Vszt.gothárd (Janka ap. Schultz Flora 1856. I. 205), Iklód (Soó 109)
462. **P. patens** (L.) Mill. — Kv. Szénafü (Wolff VSV. VIII. 21, Andrae BZ. XI. 411, Land. EM. II. 26, Schur VSV. 85, EN. 4, Janka 550, ÖBZ. IV. 403, Barth 105, Simk. l. c., Hayek 466, Soó GM. 90, BK. XXIX. 126, Pr. Cp. 132—8, auct. pl. ap. Ny. Kv. 217, Ny. FER. 1239, Ghisa BCI. XXI. 62), Virágosv. (Freyn 112), Torda, M.ludás (Wolff l. c., Freyn ÖBZ. XXV. 34, 75, Gáyer MBL. VIII. 58), Kályán (Janka 550), Iklód (Soó 109), G.keresztür (Pr. Cp. 147) — **b. obtusiloba** Schur — Kv. Szénafü (Wolff ap. Schur ÖBZ. X. 253) — lus. *albiflora* Opiz et *f. geminiflora* Gáyer — Kv. Szénafü (Soó BK. XXIX. 126, Simk. l. c.)
463. **P. montana** × **patens** (**P. Gáyeri** Simk.) — Kv. Szénafü (Simk. l. c., Gáyer l. c., Soó GM. 90, BK. XXIX. 127, Pr. Cp. 138), Torda (Freyn 112, ÖBZ. XXV. 34, 75 sub „*P. Hackelii*“, Gáyer l. c., Ny. Kv. 217)
464. **Anemone hepatica** L. — (EK. 279) — Fejérd, Szamosfa, Dezmér, Apahida, Sz.újvár, F.mikola, B.váralja, Szu.németi, Bonchida, Sz.jenő, Iklód, Szék-Vszt.egyed-Ombozelke-Pujon-Cege, Vszt.gothárd, Kályán, Korpád, Kolozs, M.záh, Vajdaszentiván, Sárpatak,

- M.szilvás, P.kamarás, M.ménes, Kékes, Gyeke-Sármás, Berkenyes, G.keresztür, Bánok-Doboka-Moró-Tötör. — Dés (Györffy Szegedi F. II. 160) — **b. multiloba** Hartm. — Korpád (Soó 108)
465. **A. nemorosa** L. — (EK. 279) — Kv. Szénafü, Diószegi-e, Szamosfa, Dezmér, Kolozs, Sz.újvár, F.mikola, B.váralja, Szu.németi, Coptelke, Bonchida, Sz.jenő, Iklód, Szék-Vszt.egyed-Ombozelke-Pujon-Cege, Vszt.gothárd, Kályán, Korpád, K.bós, Teke, Kékes, G.keresztür, Feketelak (et *f. grandiflora* et *f. biflora* Hoppe), M.vásárh., Bánok-Doboka-Moró. — Torda (Ercsei 87)
466. **A. ranunculoides** L. — (EK. 279) — Kv. Szénafü (et *f. latisecta* Schur et *f. biflora* Peterm.), Fejérd, Dezmér, Kolozs, K.bós, Sz.újvár, B.váralja, Sz.jenő, Iklód, Bonchida, Szék-Vszt.egyed Ombozelke-Pujon-Cege, Vszt.gothárd, Apahida, Korpád, Kályán, Kékes, M.bánd, G.keresztür, M.vásárh., Moró-Tötör. — Torda (Ercsei 87)
467. **A. silvestris** L. — Kv. Szénafü, Fejérd (Soó GM. 83, 88, 90, Kv. 655, AGH. V. 148, Pr. Cp. 132—3, FER. 1237, auct. plures ap. Ny. Kv. 218, Meusel 300), Ajton (Ny. l. c.), Kolozs, Bós, Virágosv. (Freyn 112), Apahida, K.borsa(!), Sz.újvár (K. et O. 4, Pr. Cp. 118, Hg. II. 68), Torda (Ercsei 86) — *f. major* Jancz. — Kv. Szénafü (Priszter 87)
468. **Clematis integrifolia** L. — Kv. Szénafü (Bgt. II. 114, Landoz I. 3, Winkler 45, Soó GM. 86—90, AGH. V. 148, Kv. 655, Pr. Cp. 83, 132—7, Ny. Kv. 219, auct. plures ap. Ny. l. c., Ghisa BCI. XXI. 61, FER. 2212) — et *f. biflora* Soó (Soó BK. XXV. 144), *f. pumila* Priszter (AGH. VI. 87), A.zsuk (Ny. l. c.), Apahida (Soó Kv. 219), Kolozs (Barth 105, Freyn 111), K.bós, Virágosv. (Freyn 111, Ny. l. c.), Apahida-Telekfarka, Szék, Bonchida-Szék (Soó 109), Fejérd, K.borsa(!), Kecsed (Hg. I. 126), Désakna (Hg. II. 71), Torda, Gerend (Ercsei 21)
469. **C. recta** L. — Frequens.
470. **C. vitalba** L. — (EK. 278) — Kv. Szénafü (Soó GM. 96), Szamosfa, Sz.újvár, B.váralja, Szu.németi, Bonchida, Sz.jenő, Pujon, Vszt.gothárd, M.szilvás, Bánok-Doboka. — Torda (Ercsei 21)
471. **Myosurus minimus** L. — Apahida (Pr. MBL. V. 31, Fl. II. 286), Torda (Janka 552, Wolff 56), M.vásárh. (Ny. Mv. 38)
472. **Ceratocephalus testiculatus** (Cr.) Kern. — Kolozs (Ny. FER. 1011b), Torda (Wolff 56), Egerbegy (Barth 106)
473. **Ranunculus trichophyllus** Chaix (*R. staccidus* Pers.) — Frequens, in formis pluribus (cf. Glück Süßwasserfl. XV. 205, Ny. Kv. 221), incl. **b. paucistamineus** (Tausch) — **c. penicillatus** Glück — Apahida (Ny. Kv. 221) — **d. Rionii** (Lagger) — Kv. Szénafü (Simk. MNL. III. 49, Borza FER. 765, —?), Torda (Wolff ap. Simk. En. 44), M.méhes (Bgt. ap. Simk. l. c.) — lus. *terrestris* (Gr. et Godr.) Beck — Frequens.
Dubia : *R. divaricatus* Schrank — Sz.újvár (K. et O. 4), Dés (Czetz 19)
474. **R. ficaria** L. — (EK. 279—80) — Frequens, in silvis. — Typo frequentior est :
ssp. calthaefolius (Rchb.) Bl. Nym. Sch. (incl. *f. stipitatus* Nyár.) Cf. Kv. 221—2.

. 475. **R. auricomus** L. — (EK. 280) — Kv. Szénafű, Fejérd, Dezmér, Apahida, Kolozs, K.bós, Berkenyes, Sz.újvár, B.váralja, Bonchida-Szék, Sz.jenő, Iklód, Szék-Vszt.gothárd-Pujon-Cege, Feketelak, M.szilvás, M.ménes, Teke, M.vásárh., Bánok-Doboka.

b. binatus (Kit.) Heuff. — Kv. Szénafű, Bonchida, M.vásárh. — **c. (tr.) sibiricus** Glehn (*binatus-auricomus*) — Kv. Szénafű, Fejérd, Iklód. Vszt.gothárd (Janka ap. Schiller M. Termt. Ért. 1917. 443) — **d. (tr.) reniformis** Kitt. (*auricomus-binatus*) Kv. Szénafű, Dezmér, Szék, B.váralja, M.vásárh. — **e. (tr.) incisifolius** Rchb. (*auricomus-cassubicus*) — Dezmér, Sz.újvár, Sz.jenő, Iklód, Bonchida-Szék, Kékes, M.vásárh., Moró-Tötör.

476. **R. cassubieus** L. — (EK. 280) — Kv. Szénafű, Fejérd, Sz.újvár, Szu.németi, Coptelke, Bonchida-Szék, Sz.jenő, Korpád, Kékes, Berkényes, M.bánd, M.vásárh. — Dés (Czetz 19), Torda (Wolff 56, ap. Freyn 113, Barth 106) — **b. (tr.) fallax** W. et Gr. (*cassubicus-auricomus*) — Fejérd, Sz.újvár, F.mikola, Dezmér. — **c. (tr.) silvicola** W. et Gr. (*binatus-cassubicus*) — Kolozs, Bonchida-Szék, Sz.újvár, F.mikola, B.váralja, Kékes. — **d. (tr.) pinguior** Rchb. (*cassubicus-binatus*) — Dezmér, Bonchida-Szék, Sz.újvár, F.mikola, B.váralja, Sz.újfalu, K.borsa. — **e. (tr.) gracilis** Schur (*cassubicus-flabellifolius*) — Bonchida-Szék.

477. **R. lingua** L. — Kv. Szénafű (Soó, GM. 94, Ny. FK. 50), Apahida (Soó BK. XXV. 144, Kv. 655 cum **b. hirsutus** Wallr.), Ajton (Ny. Kv. 223, EM. 129 cum **b.**), Torda (Fuss Transs. 21, Ercsei 56, Wolff 56), M.sztgyörgy (Ny. ap. Soó Szf. 51)

478. **R. flammula** L. — Cege, Vszt.gothárd (Pr. MBL. V. 31), Torda (Ercsei 56)

479. **R. seeleratus** L. — Frequens. — *f. minimus* DC. — Szamosfa (Soó in Gr. 250)

480. **R. pedatus** W. et K. — Torda-Sósf. (Janka ÖBZ. VI. 194, Wolff 56, FEAH. 710, Barth 106, Pr. Cp. 246, Fl. II. 290, Borza FER. 49). In dit. Kolozsvár deest!

481. **R. bulbosus** L. — Kv. Szénafű (Soó GM. 90, Kv. 655, Ny. Kv. 224), Sz.újvár (K. et O. 21), Torda (Ercsei 56), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Scr. I. 45), Sz.régen (Pr. Cp. 76) — **b. Aleae** Willk. (*pseudobulbosus* Schur) — Kolozs, Apahida (Schur VSV. X. 84, En. 22), Sz.újvár (Hg. II. 69)

Dubia : **R. illyricus** L. — Torda (Sebők 37)

482. **R. sardous** Cr. — Frequens. — *f. parvulus* (L.) Willk. et Lge. — Apahida (Pr. in Kv. 224), Szszt.miklós (Priszter 86) — **b. hirsutus** (Curt.) Beck. e terr. non vidi.

483. **R. repens** L. — Frequens. — **b. myrrhiphyllus** Wallr. — Kv. Szénafű (Richt. ap. Ny. Kv. 225)

484. **R. arvensis** L. — Frequens.

485. **R. acer** L. — Frequens. — **b. napellifolius** (Cr.) DC. — Kv. Szénafű (Soó Kv. 655) — *f. stipitatus* Nyár. — Kv. Szénafű, Apahida-Szszt.miklós (Ny. Kv. 225)

486. **R. Steveni** Andrz. — Mezőség (Schur VSV. X. 117) : Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 85, Soó GM. 88, 93, Kv. 227, Pr. Cp. 133,

Ny. FK. 44—6, 51, Ujv. Kv. 655), Szamosfa, Apahida, Dezmér (Ny. Kv. 226, EM. 114), Kolozs (Freyn 113), Sz.újvár (Pr. Cp. 74), Melegv., Kajántó, K.borsa-Válaszút, Bonchida, Szék(!), B.váralja (Hg. III. 126), Dés (Pr. Cp. 79), Torda (Wolff 56), M.vásárh. (Ny. 43),

b. strigulosus (Schur) Nyár. — Kv. Szénafű (Soó Kv. 227) — **c. Csatói** (Schur) — Kv. Szénafű (Barth. 106, in Kv. 227 deest)

ssp. Frieseanus (Jord.) — Szamosfa (Ujv. Kv. 655), Apahida (Csürös Kv. 655) transit in typum (Kv. Szénafű : Soó Kv. 227)

487. **R. intercedens** (acer — Steveni) Domin — Kv. Szénafű (Richt. ap. Ny. Kv. 229)

488. **R. lanuginosus** L. — Sz.újvár (K. et O. 21 — in pratis)?, Szu.németi (Hg. III. 129), Torda (Ercsei 56)?

489. **R. polyanthemos** L. — Frequens, in formis multis : **a. tenuifolius** Wallr., — **b. latifolius** Wallr. Kv. Szénafű (Bélteki, Butujás, Soó ap. Ny. Kv. 228), Ajton (Ny. l. c.)

Delenda : **R. lateriflorus** DC. — Mezőség (Janka 554). A nemini lecta.

490. **Thalictrum aquilegiforme** L. — (EK. 280) — Kv. Szénafű, Fejérd, Dezmér, Kolozs, K.bós, M.csán, Berkenyes, Sz.újvár, Korpád, Kályán, Feketelak, Bazéd, Mojos, M.vásárh., K.borsa. — Dés (Czetz 22), Torda (Ercsei 179), M.záh (Ny. ap. Soó 109)

491. **Th. minus** L. — Frequens, in formis multis, saepissime

a. collinum (Wallr.) Koch (incl. *f. flexuosum* Bernh.) — **b. minutifolium** Borb. Kv. Szénafű, Apahida (Soó Kv. 236, Ujv. Kv. 655), A.zsuk (Ny. Kv. 236) — **c. palmatifidum** Borb. Kv. Szénafű (Soó Kv. 236), K.bós (Ny. l. c.) — **d. ambigens** Jord. Kv. Szénafű (Soó Kv. 236), Korpád (Soó 109), Kecsed (Hg. I. 126) — **e. Jacquinianum** Koch (*majoriforme* Nyár.) Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 84, Ny. Kv. 237, Soó Kv. 655), Apahida-Szszt.miklós (Ujv. Kv. 655), K.bós (Freyn 11, Ny. l. c.), Kolozs, M.csán, Berkenyes, Virágosv. (Freyn 111), Bonchida, Szék(!) — **f. medium** (Murr.) Kv. Szénafű (Schur En. 9, Soó BK. XXIII. 148, GM. 90), Kolozs (Bgt. II. 115), K.bós (Ny. l. c.), Torda (Bgt. I. c., Ercsei 179) — **g. elatum** (Jacq.) Koch — Vszt.gothárd-Ombozelke (Soó 109), Kolozs (Bgt. II. 114)?, Torda (Ercsei 179) — **h. glaucescens** (Willd.) Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 84, Pr. Cp. 138, Ny. Kv. 236, Soó ap. Ny. l. c.), Apahida, K.bós-Virágosv. (Ny. l. c.), *f. multipartitum* Nyár. Kv. Szénafű (Ny. l. c.), *f. glauco-ambigens* Nyár. Kv. Szénafű (Soó l. c.), *f. glauco-majus* Nyár. Kv. Szénafű (Schur VNVBr. XV. 13, cf. Kv. 237)? — *i. puberulum* Regel Kv. (Schur En. 8)

492. **Th. simplex** L. Kv. Szénafű, Fejérd (Schur VSV. X. 83, ÖBZ. X. 250, VNVBr. XV. 22, Soó GM. 90, Soó, Bélteki ap. Ny. Kv. 237) — cum *f. caesium* Nyár. (Soó l. c.), Zsuk (Pr. Cp. 152) — **b. angustum** Nyár. Kv. Szénafű, Fejérd (Soó ap. Ny. l. c.) — cum *f. glaucinum* Nyár. — **e. soboliferum** Schur Kv. Szénafű (Janka ÖBZ. V. 230, Schur VSV. X. 84, ÖBZ. X. 250, VNVBr. XV. 21, Simk. En. 36, Soó BK. XXII. 72, GM. 90)

ssp. galiooides (Nestl.) — Kékes (Pr. ap. Ny. Kv. 238)

493. **Th. flavum** L. — Tantum ad fines territorii. Bethlen (Pr. MBL. XII. 128), Torda (Ercsei 179), M.vásárh. (Bgt. II. 117), Sz.régen

(Emerich ap. Fuss Transs. 12) — An huc „*Th. flavescens*“ Buza (Pr. Cp. 145)?

Cp. 145)⁹

494. **Th. lucidum** L. — Frequens, in formis multis, saepissime
a. peucedanifolium (Gr. et Sch.) Hay. (incl. *glabrostenophyllum* Nyár. Kv. 234) — **b. stenophyllum** (W. et Gr.) Hay. (*angustissimum* Cr., *hirtostenophyllum* Nyár), Kv. Szénafű, Fejér (Soó BK. XXIII. 148, Kv. 234—5, Ny. Kv. I. c.), Butujás ap. Ny. I. c.), Kolozs, K. bós (Freyen 111, Ny. I. c.), Kecsed (Hg. I. 126), K. borsa(!), M. vásárh. (Barth 106) — **c. heterophyllum** (W. et Gr.) Hay. (*nigricans* Scop.) Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 84, Soó I. c.), f. *Candollei* Nyár. K. bós-Virágosv. (Ny. Kv. 235) — **d. laserpititilolum** (Koch) Hay. Apahida (Soó Kv. 235) — **e. pseudolucidum** (L.) S. A. Gray ex Steyermark — **f. clatum** × **lucidum** (*iodostemon* Borb.) —

495. Th. minus var. elatum \times lucidum (Podostemone) E. B.
Torda-Sós. (Borb. ÖBZ. XXVIII. 310, Ért. Termt. IX.—157)
Hybrida dubia. r. I. Frecuens t. minor Dieudonne Kv.

496. *Adonis vernalis* L. — Frequens. *J. minor* Dieudonné Kv.
Szénafű (Janka ÖBZ. V. 230, Borb. MBL. III. 109), K.borsa(!) —
f. soproniensis Mygind Kv. Szénafű (Simk. MNL. III. 49, Borb. l. c.,
Soó Kv. 239, cf. Soó AGH. V. 158)
Kv. Szénafű „Elővölgy”

- 497. **A. volgensis** Stev. (AGH. V. 157) — Kv. Szenáru „Elosvojgy“ (Wolff VSV. VIII. 20 etc. citata omnia cf. Soó AGH. V. 157, Ny. Kv. 239, BK. XXXVIII. 138) — cum f. *pilosa* Schur (ÖBZ. X. 252), f. *subglabra* Nyár. et f. *glaberrima* Nyár (Kv. 240). De loco natali cf. Soó GM. 90, AGH. V. 158, Kv. 656, AGH. VI. 29. M. záh (Janka ÖBZ. VI. 194, Ny. BK. I. c.)

VI. 194, Ny. BK. I. c.)

498. *A. vernalis* × *vulgensis* (*A. hybrida* Wolff et *A. Walziana* Simk.) Kv. Szénafű „Elővölgy“, inter parentes, in formis : *A. hybrida* (*vernalis* > *vulgensis*) Wolff (VSV. VIII. 20) cum *f. glaberrima* et *subglabra* Nyár. BK. I. c. 139 et *A. Walziana* (*vernalis* < *vulgensis*) Simk. (MNL. II. 146) cum *f. pilosa*, *subglabra* et *glaberrima* Nyár. I. c. Citata omnia cf. Soó AGH. V. 157, Ny. Kv. 239—240.

499. *A. aestivalis* L. — Frequens

Dubia : *A. annua* L. (*A. autumnalis* L.) — Torda (Ercsei 72)

Berberidaceae

501. **Berberis vulgaris** L. — Ad fines : Dezmér-Györgyfa (Nyár-
Pop FER. 632 a), Aranyosgyéres (Ercsei 27), M.vásárh. (Ny. ap. Soó
Szf. 53)

Papaveraceae

502 *Chelidonium majus* L. — Frequens

503. *Glaeum corniculatum* (L.) Curt. (*var. phoeniceum* (C.L.) — Kv. Szénafű, Melegv., Tarcsa (Bgt. II. 80, Andrae BZ. XI. 413, olff, Ny. Soó Kv. 241), Szamosfa (Knapp ap. Ny. I. c.), Apahida (Ny. I. c.), Bujorean FER. 2530, Soó 109), Kolozs, Torda (Bgt. I. c.), Csej (csej 63), Sz.kocsárd (Simk. En. 68), Vszt.gothárd (Soó 109), Szabé-

(Szakmáry 120, Lengy. ap. Soó I. c.), M.kece (Nyár. ap. Soó I. c.), M.vásárh. (Ny. Mv. 43)

504. *Papaver rhoeas* L. — Frequens, in formis plurimis (cf. Nyár. Scr. I. 22—29, Nyár. f. AGH. V. 40—63) — b. *subintegrum* Willk. et Lge. — Apahida (Pr. ap. Ny. Kv. 243) — c. *agrivagum* (Jord.) Beck — Kékes, M.csán (Porc. ap. A. Nyár. AGH. V. 59) sed loca natalia „Kv.“ partim certe e terr. Mezőség orta.

505. **P. dubium** L. — Frequens, in formis multis (cf. A. Nyár. l. c. 33—40) praecipue *f. albiflorum* (Boiss.) — **b.** *tenuiseptum* A. Nyár. — Torda (Wolff ap. A. Nyár. 38) — **c.** *bipinnatifidum* A. Nyár. — Kv. Szénafű (Zsák ap. A. Nyár. l. c.) — *lus. maculosum* (Schur) A. Nyár. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 85, En. 36, VNVBr. XV. 67)

P. somniferum L. — Subspont. : Szamosfa, Apahida (Prisztler 86)
506. Corydalis cava (L.) Schw. et Körte (incl. *Ius albitflora* (Kit.)

Corydalis cava (L.) Schw. et Korte (incl. *lilaciflora* (Kit.) Rchb.) — (EK. 280—1) — (*C. Marshalliana* auct.), Kolozs, Sz.újvár, Sz.németi, Sz.jenő, Feketelak, M.örményes, Kékes, Bazéd, Szabéd. — Torda (Ercsei 58)

507. *C. solidia* (L.) Sw. (EK. 281) — Kv. Szénafű, Szamosfa, Dezmér, Kolozs, Szújvár, Bonchida, Iklód, Bonchida-Szék, Vszt.-gothárd, Kékes, Berkenyes, M.bánd, Szabéd, M.vásárh., Bánok-Doboka. — *b. erenata* F. Schultz — Bonchida, Iklód (Soó 109)

508. *Fumaria rostellata* Knaf. — Vszt.gothárd (Janka MTK. XIII. 184), Dés (Czetz 15), Sz.újvár (K. et O. 12 sub *F. off.*)?, Torda (Bgt. II. 315 sub *F. off.*, Ercsei 57)?

509. **F. Schleicheri** Soy.-Will. — Kv. Szénafü (Simk. MNL. II. 147, auct. multi ap. Ny. Kv. 248), Szamosfa, Kolozs (Só Kv. 657), Apahida (Ny. l. c.), Vszt.gothárd, Noszoly-Feketelak (Janka TF. I. 30), K.borsa(!), M.vásárh. (Ny. Mv. 43 sub „*F. Vaillantii*“)

510. F. Vaillant Lois. — Kv. Szénafü (Schur VSV. X. 84, Pr. Fl. II. 457), Kolozs (Bgt. II. 315, Freyn 114), Torda (Bgt. I. c.), Egerbegy (Barabás ap. Simk. En. 71)

Cruciferae

511. **Lepidium ruderale** L. — Frequens

512. *L. perfoliatum* L. — Kolozs (Bgt. II. 240), Katona (Pr. MBL. V. 31), Torda (Janka ÖBZ. VI. 194, VSV. XIV. 206, Barth. 107)

513. *L. campestre* (L.) R. Br. — Frequens.

514. *L. draba* L. — Frequens

L. hirtum auct. (Bgt. II. 243 : Kv. Szénafű, Kolozs — K. et O. 16 : Szújvár) est ignotum.

515. *Coronospus squamatus* (Forskal) Asch. — Apahida (Soó Kv. 657), Kolozs, Virágosv. (Freyn 116), Szabéd (Ny. Kv. 251), Vszt.-gothárd-Feketelak (Janka MTK. XII. 185)

516. *Thlaspi arvense* L. — Frequens.

517. *Th. perfoliatum* L. — Frequens

518. Th. Kovátsii Heuff. — Kv. Szénafü, Fejérd (Freyen 116, Soó GM. 85, 90, AGH. V. 143—149, Kv. 657, Pr. Cp. 132, Simk. En. 97, auct. multi ap. Ny. Kv. 252), Apahida, Ajton-K.bós (Ny. I. c.),

- K.bós-Kolozs (Pr. Cp. 99), Virágosv. (Freyn 116), Kályán, Bárév, Palatka (Janka MTK. XII. 185), Torda (Wolff ap. Freyn 116)
519. *Alliaria officinalis* Andrz. — Frequens.
- Iberis umbellata* L. — Subspont. Szamosfa, Szszt.miklós (Priszter, Soó AGH. VI. 87)
520. *Sisymbrium officinale* L. — Frequens.
521. *S. strictissimum* L. — Kv. Szénafű, Fejér (Soó GM. 83, Soó 109, Ny. Kv. 259), Szamosfa, Szszt.miklós (Priszter l. c.), Cege (Soó 109), M.vásárh. (Ny. Mv. 46)
522. *S. altissimum* L. — Kv. Szt.györgyh. (Ujv. Kv. 657, cf. Bgt. II. 254), Kolozs (Bgt. l. c.)
- 522a. *S. Loeselii* Juslen — Kv. Szénafű, Melegv. (Soó GM. 78, Kv. 260, 655, Ny. Kv. 260), Szamosfa, Apahida, A.zsuk (Ny. l. c., Ujv. Kv. 655), Kolozs, Virágosv. (Freyn 115), Torda (Freyn 115, Sebők 33), M.vásárh. (Ny. Mv. 47)
523. *S. sophia* L. = *Deseurainia sophia* (L.) Prantl — Frequens.
- Dubia : *S. polymorphum* (Murr) Roth — Désakna, Kolozs, Torda (Bgt. II. 263)
524. *Myagrum perfoliatum* L. — Kv. Szénafű, Melegv. (Landoz EM. II. 27, Schur VSV. X. 86, Richt., Ny. Kv. 257), Torda (Wolff 57), M.vásárh. (Ny. Mv. 49)
525. *Isatis tinctoria* L. ssp. *praecox* (Kit.) Domin et Podp. — Noszoly (Janka MTK. XII. 185), Kékes (Prod. MBL. V. 31)
526. *Sinapis arvensis* L. et *f. orientalis* (Juslen) Koch et Ziz. — Frequentes. — b. *Sehkuhriana* (Rchb.) Thell. Kv. Szénafű (Ny. Kv. 262 *f. glabra* (Godr.) Thell. et *f. hirsuta* Beck, Soó Kv. 657), Apahida (Soó l. c.)
- Dubia : *S. alba* L. ssp. *dissecta* (Lag.) Bonnier — Mezőség (Janka 556) sine loco natali speciali.
527. *Diplotaxis muralis* (L.) DC. — Kv. Szénafű (!Ny. Pr. Kv. 263), Szszt.miklós-Apahida(!), Kolozs, K.bós, Virágosv., Torda (Freyn 115), Kékes (Pr. Cp. 93), F.mikola, B.váralja (Hg. II. 68, III. 128), M.szovát (Pr. Fl. II. 212), Szabéd (Szakmáry 115), M.vásárh. (Ny. Mv. 47), K.borsa, Pujon(!) — b. *cauleseens* Kitt. — Szamosfa (Ujv. Kv. 657), Kv. Szénafű(!)
- Dubiae : *D. tenuifolia* (Jusl.) DC. — Torda (Ercsei 170, Wolff 58) anne 527b.
- D. viminea* (L.) DC. — Kolozs (Schur En. 60), Mócs (Prod. MBL. V. 31)
528. *Brassica nigra* (L.) Koch — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 86), Sz.újvár (Schur l. c. 113, K. et O. 6, Pr. Cp. 74), Alsódetrehem (Simk. En. 88), Torda (Ercsei 125, Winkler 48, Sebők 33), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 55)
529. *B. elongata* Ehrh. — Kv. Szénafű (Bgt. II. 264, Schur VSV. X. 85, Landoz EM. II. 26, Winkler 60, Soó GM. 98, AGH. V. 148, Pr. Cp. 95, 142, auct. multi ap. Ny. Kv. 264), Kolozs (Schur VSV. X. 111, Freyn 115), K.bós, Berkenyes, Virágosv. (Freyn 115), Apahida-K.kara, Bonchida-K.iklód, Szék. Ö.füzes, Pujon, Ombozelke, M.szava, Fekete-lak (Soó 110), Vszt.gothárd (Janka ap. OESchulz Brassiceae 38,

- Soó 110), Faragó (Nyár. ap. Soó 110), Gerend (Simk. En. 110, Nyár. l. c.), Kók, Cikud, A.gyéres (Simk. En. 88), Szabéd (Szakmáry 120, Lengy. ap. Soó l. c.), M.szovát (Pr. Cp. 94, Pop Guide 164, Pr. Fl. II. 212), Sóspatak (Pr. Cp. 153), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 55), Torda (Borza ap. OESchulz l. c., Winkler 48), Sz.újvár (Hg. II. 69), K.bersa(!) — *f. gigantea* Nyár. — Kv. Szénafű (Ny. Kv. 264, Ujv. Kv. 657) — ssp. *armoracioides* (Czern.) A. et G. — Kv. Szénafű (Ny. Kv. 264)
530. *B. campestris* L. — Verisimiliter tantum subs spontanea. M.vásárhely (Ny. ap. Soó Szf. 55)
- B. napus* L. — Subspont. : Szamosfa (Ny. Kv. 264)
531. *Raphanus raphanistrum* L. — Ajton-Rőd (Ny. Kv. 259), Kv.-Szamosfa(!)
- 531a. *R. sativus* L. — Subspontanea. Szamosfa-Szszt.miklós-Apahida (Priszter 87), Torda : Szt.mihályfa (Freyn 47), M.vásárh. (Ny. Kv. 55)
532. *Rapistrum perenne* (L.) All. — Kv. Szénafű, Melegv. (Soó GM. 90, Pr. Ny. Kv. 259), Kolozs, K.bós, Berkenyes, Virágosv., M.csán (Freyn 117), Kékes, M.záh (Pr. Cp. 92—93), Kályán (Bujon. FER. 963, Soó 110), Apahida-Kálván, Cege, Vszt.gothárd, M.száva, Ombozelke (Soó 110), Báld (Pr. FK. 1914. 313), Torda (Winkler 48) Delenda : *R. rugosum* (L.) All. — Kolozs (Schur En. 74), Torda (Bgt. II. 226)
533. *Crambe tataria* Sebők — (AGH. V. 158—9) a. *hungarica* DC. b. *aspera* Boiss. — Citata omnia cf. Soó AGH. V. 159, Ny. Kv. 253, OESchulz Pflanzenr. 234 (1919) 235 — Kv. Szénafű, Apahida, A.zsuk, Apahida-Telekfarka, Kolozs (a. b.), K.bós, Virágosv., Torda (a. b.), Torda-A.gyéres, Gerend, G.keresztúr, M.őrke, M.csán, M.tóhát, M.pagocsa, M.ludas, Egerbegy, (b.), M.szovát, M.záh (a. b.), M.keče, Báld, M.madaras, Vszt.gothárd, Sz.újvár, Szék, Szu.németi, Kékes, Faragó-N.nyulas (b.), Mojos (b.), Szabéd — c. *pinnatifida* (R. Br.) OESchulz — K.bós (Freyn ap. Schulz 235), Torda (Barth ap. Schulz l. c.) — f. *Biebersteinii* (Janka) OESchulz — Vszt.gothárd (Janka 550, ap. Schulz l. c.) — d. *turdensis* Prodan Fl. ed. 2. I. 392—3. — Torda (Pr. l. c.) Dubia.
534. *Barbarea vulgaris* R. Br. — Frequens. — ssp. *areuata* (Opiz) Hay. — Sz.újvár (K. et O. 6) an vero?
535. *Rorippa stylosa* (Pers.) Mansf. et Rothm. — (*R. pyrenaica* L.) Spach — Kv. Szénafű (Andrae BZ. XI. 413, Winkler 50, Soó GM. 90, Pr. Cp. 134—6, Ny. Kv. 254), Szamosfa (Ny. l. c.; Ujv. Kv. 641), Apahida (Priszter 87), Kolozs, K.bós, (Freyn 116, Ny. FER. 1958b), Fejér, A.zsuk (Ny. l. c.), Désakna (Bgt. II. 252), F.mikola (Hg. II. 66), Szu.németi, B.váralja (Hg. III. 128—30)
536. *R. islandica* (Oeder) Borb. — Kv. Szénafű (Soó GM. 94, Ujv. Kv. 657), Szszt.miklós-Apahida (Csűrös ap. Soó 110), Torda (Wolff ap. Borb. Roripa 60), Bonchida (Soó 110), Szabéd (Lengy. ap. Soó l. c.)
537. *R. amphibia* (L.) Bess. (a. *aquatica* (L.) Fritsch) — Kajántó (Ny. Kv. 255), Cege (Soó 110), Sz.újvár (K. et O. 21), Dés (Czetz 17), Torda (Ercsei 170), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 55) — b. *variifolia*

- (DC.) Rehb. — Kv. Szénafű, Fejérd (Soó BK. XXIII. 148, Ny. FK. 50, Soó 110), Cege (Soó 110)
538. **R. austriaca** (Cr.) Bess. — Kv. Szénafű (Simk. MNL. II. 147, Soó GM. 95, Ujv., Pr. in Kv. 657), Szamosfa-Szszt.miklós-Apahida (Pr. Cp. 87, Kv. 657, Ny. Kv. 255), Dezmér (Pr. Cp. 87), Sz.újvár (Pr. Cp. 74), Ajton (Freyn 116, Ny. I. c.), Cege(!), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 55)
539. **R. silvestris** (L.) Bess. — Frequens. — **b. rivularis** Rehb. Bonchida (Soó 110)
- 539a. **R. Kernerii** Menyh. — Szamosfa (Csűrös ap. Ny. Kv. 641) an planta vera?
540. **R. austriaca** × **silvestris** (**R. armoracioides** (Tausch) Fuss) — Kv. Szénafű (Soó GM. 95, BK. XXII. 72, Pr. Cp. 96), M.vásárh. (Ny. Mv. 47) — **b. terrestris** (Tausch) Jav. — Kv. Szénafű (Borb. Roripa 46, 48 cum f. *brachybotrya* Borb., Soó I. c.) — **c. Neilreichii** (Beck) Jav. — Kv. Szénafű (Simk. MNL. II. 147, En. 73 sub „*R. Turczaninowii*“), K.borsa(!)
541. **R. islandica** × **silvestris** (**R. barbareoides** (Tausch) Čel.) **a. astylis** (Rehb.) Borb. — Kv. Szénafű (Soó GM. 95, BK. XXII. 72), Apahida (Soó in Gr. 249), K.borsa-Válaszút(!) — **b. macrostylis** (Tausch) Borb. — Kv. (Borb. Roripa 46 f. *fissifolia* Borb.) — **c. Reichenbachii** Knaf — Kv. Szénafű (Simk. MNL. II. 147, III. 50, En. 72, Soó BK. XXII. 72, Pr. Cp. 137, Borb. Roripa 43 f. *auritula*, f. *pleiodonta* Borb.) — var.? Kecsed (Hg. I. 126)
- R. amphibia* × *austriaca*: Cege (Soó 110)?
542. **Armoracia rusticana** (Lam.) G. M. Sch. — Subspont.: Szamosfa-Szszt.miklós (Ny. Kv. 254), M.vásárh. (Ny. Mv. 50), Dés (Morariu 178)
543. **Dentaria bulbifera** L. — (EK. 281) — F.mikola, M.váralja, Szu.németi, Iklód, Cege-Pujon, Teke, Moró-Tötör.
544. **D. glandulosa** W. et K. — Kékes (Pr. Cp. 101), B.váralja, Szu.németi (Hg. III. 128, 130), Torda, „Alsóberek“ (Ercsei 57)
545. **Cardamine impatiens** L. — (EK. 281) — F.mikola, B.váralja, Szu.németi, Teke, Sz.újvár (K. et O. 7 sub „*C. silvatica*“?)
546. **C. pratensis** L. — Kv. Szénafű (Ny. FK. 43, 46, Kv. 266), Sz.újvár (K. et O. 7), Vszt.iván (Pr. MBL. V. 31), M.vásárh. (Ny. Mv. 45)
- ssp. **Hayneana** (Welw.) OESchulz — Kv. Szénafű (Soó BK. XXII. 75, GM. 93, Kv. 657, auct. plures ap. Ny. Kv. 266)
547. **Capsella bursa-pastoris** (L.) Med. — Frequentissima, in formis multis: f. *integrifolia* DC., f. *pinnatifida* Schlechtd., f. *sinuata* Schlechtd., f. *ruderalis* (Jord.), f. *stenocarpa* Crép. etc. circa Kv. (cf. Soó BK. XXV. 144, Kv. 253)
548. **Camelina sativa** (L.) Cr. — Kv. Szénafű (Bélteki ap. Ny. Kv. 257), Torda (Ercsei 64, Sebők 33), M.vásárh. (Ny. Mv. 50)
549. **C. alyssum** (Mill.) Thell. — Mezőség (Bgt. II. 224), M.záh (Ercsei 64)
550. **C. microcarpa** Andr. — Frequens. — **b. pilosa** DC. — Kv. Szénafű (Soó BK. XXII. 72, Ujv. Kv. 657), Szamosfa(!)
551. **Neslia paniculata** (L.) Horn. — Kv. Szénafű, Kistarcsa

- (Pr. Cp. 167, Fl. II. 457, auct. multi ap. Ny. Kv. 256, Soó, Ujv. Kv. 657), Rőd-Ajton (Ny. I. c.), Torda (Wolff 57), Gorgány (Borza FER. 2219), Vszt.gothárd, Korpád(I), Kékes (Pr. MBL. V. 31), M.vásárh. (Ny. Mv. 49)
552. **Draba verna** L. = **Erophila verna** Bess. — Frequens, in formis mulis, sic praecipue **a. Krockeri** (Andrz.) Neilr. (*steloncarpa* Jord.) — Kv. Szénafű (Ny. Kv. 258, Soó Kv. 657), Sz.újvár (Hg. II. 68), K.borsa(!) — **b. majuseula** (Jord.) Gr. — Ajton, Kolozs (Ny. I. c.), K.bós (Freyn ap. Ny. I. c.), M.szovát (Borza FER. 962b.)
553. **D. nemorosa** L. — Kv. Szénafű, Melegv. (Soó GM. 86, Pr. Cp. 98, Ny. Kv. 258), Apahida (Ny. I. c.), Kolozs, K.bós, Virágosv. (Freyn 116), Torda (Hayn. ap. Stur ÖBZ. XI. 195, Wolff FEAH. 2067, ap. OESchulz Draba 311), Sz.újvár (K. et O. 10), B.váralja (Hg. III. 126), Vszt.gothárd (Janka ap. OESchulz I. c.), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 57)
554. **Arabidopsis Thaliana** (L.) Heynh. — Kv. Szénafű (Ny. FER. 1487), Kolozs, K.bós (Freyn 114), Torda (Wolff 56), M.vásárh. (Ny. Mv. 48)
555. **Turritis glabra** L. — (EK. 281) — Kv. Szénafű, Dezmér, Korpád, Gerend, M.záh, Sz.újvár, Ördöngősfüzes, N.sármás, M.vásárh. — Torda (Ercsei 157)
556. **Arabis hirsuta** (L.) Scop. — (EK. 281) — Kv. Szénafű, A.zsuk, Apahida, Bonchida-Szék, Szabéd, Szu.németi-Coptelke. — Torda (Ercsei 157) — Cf. FER. 2221b.
557. **A. auriculata** Lam. — Kv. Szénafű (Pr. Cp. 133, Soó Kv. 657, auct. plures ap. Ny. Kv. 267, Bujor. FER. 2220), Kolozs, K.bós (Freyn 114)
558. **A. arenosa** (L.) Scop. : **Cardaminopsis a.** Hay. — (EK. 281) — Praecipue var. **segetalis** Schur, sic Kv. Szénafű, Kolozs, K.bós, Szék, F.mikola, B.váralja, Mojos, M.vásárh.
559. **Erysimum diffusum** Ehrh. — Mezőség, Kolozs (Bgt. II. 262), Sz.újvár (K. et O. 11) Dubia.
560. **E. repandum** Höjer — Frequens.
561. **E. pannonicum** Cr. = **E. odoratum** Ehrh. — Frequens, in formis pluribus: f. *denticulatum* Koch et f. *dentatum* Koch (Kv. Szénafű — Soó BK. XXV. 144) — f. *macrum* Nyár. Kv. Szénafű (Butujás ap. Ny. Kv. 261). Huc pertinere videtur: „*E. silvicum*“ Szék-Vszt.gothárd (Janka ÖBZ. VIII. 367)
562. **Alyssum alyssoides** L. — Frequens. — **b. depressum** (Schur) Soó — Szamosfa (Ujv. Kv. 657), B.váralja (Hg. III. 125)
563. **Berteroa incana** (L.) DC. — Frequens. — **b. viridis** Tausch Kv. Szénafű, Szamosfa (Soó BK. XXV. 114)
564. **Euclium syriacum** (L.) R. Br. — Kv. Szénafű (Landoz I. 4, Schur VSV. X. 86, Pr. Cp. 87, Fl. II. 287, Ny. FER. 1252, auct. multi ap. Ny. Kv. 254), Szamosfa, Dezmér (Pr. Cp. 87), Kolozs (Bgt. II. 227, Freyn 116), Virágosv. (Freyn 116), Bonchida (Soó 110), Gerend M.záh (Ercsei 149), Torda (Bgt. I. c., Ercsei 149, Wolff 57)
565. **Hesperis tristis** L. — Kv. Szénafű (Andrae BZ. XI. 414, Schur VSV. X. 85, Barth 107, Simk. En. 82, Soó GM. 90, Pr. Cp. 134,

auct. multi ap. Ny. Kv. 265), A.zsuk (Ny. l. c.), Apahida (Pr. Ny. l. c.), M.záh (Schur En. 53), Torda (Wolff 56)

566. *H. silvestris* Cr. — (EK. 281) — Kv. Szénafű, Dezmér, Kolozs-K.bós, Sz.újvár, Korpád, Bonchida-Szék, Kékes, Feketelak. — Torda (Freyn 115), Dés (Czetz 16)

567. *Bunias orientalis* L. — Kv. Szénafű, Melegv., Kistarcsa (Andrae BZ. XI. 416, Soó GM. 93, Kv. 657, auct. plures ap. Ny. Kv. 254), Szamosfa (Ny. l. c.), Apahida (Ny. l. c., Soó Kv. 657), Kolozs, Virágosv. (Freyn 116), Torda (Ercsei 149, Sebők 38), Sz.újvár (K. et O. 15), Bonchida, Szék, Cege, Pujon(!), M.vásárh. (Ny. Mv. 49)

568. *Conringia orientalis* (L.) Andr. — Kv. Szénafű (Andrae BZ. XI. 414, Simk. MNL. III. 50, Pr. Cp. 167, auct. plures ap. Ny. Kv. 263, Ujv. Kv. 657), Kolozs (Soó Kv. 657), Virágosv. (Freyn 115), Vszt.gothárd (Janka ap. Simk. En 87), Pujon (Janka 556), M.vásárh. (Ny. Mv. 45)

Resedaceae.

569. *Reseda luteola* L. — Kv. Szénafű (Pr. Cp. 167), Szamosfa (Schmidt ap. Ny. Kv. 268), Fejérd (Soó 110), Apahida-Kolozs (Richt. ap. Ny. l. c.), Kolozs (Bgt. II. 9), Virágosv. (Freyn 117), Egerbegy, Gerend (Ercsei 125), Torda (Bgt. l. c., Ercsei l. c.), Kékes (Pr. Cp. 167), Dés (Czetz ap. Simk. 105), M.kece (Ny. ap. Soó 110), K.borsa, Telekfarka(!)

570. *R. lutea* L. — Frequens, in parte orientali rarior, etiam *f. papillosa* Borb. (Kv. Szénafű, Apahida, etc. — cf. Ny. Kv. 269, Ujv. Kv. 657) — *f. elata* Priszter — Apahida (Priszter 87)

Crassulaceae.

571. *Sedum maximum* (L.) Hoffm. — (EK. 281) — Kv. Szénafű, Fejérd, Sz.újvár, F.mikola, B.váralja, Coptelke, Sz.jenő, Iklód, Cege, Pujon, Vszt.gothárd, Korpád, Kolozs, M.szilvás, Báld, P.kamarás, Kékes, M.vásárh., Doboka-Moró. — Torda (Ercsei 139)

572. *S. acre* L. — Frequens.

573. *S. sexangulare* L. (*S. boloniense* Lois.) — Kv. Szénafű (Soó GM. 98, Kv. 658, Ujv. Kv. 658), Szamosfa (Richt. ap. Ny. Kv. 270), Apahida (Soó Kv. 271), Kolozs, K.bós, Torda (Freyn 110), Szék(!)

S. hispanicum Juslen — Kv. Szénafű (Butujás ap. Ny. Kv. 270) Adventiva, iam extincta.

Saxifragaceae.

574. *Chrysosplenium alternifolium* L. — (EK. 281) — Sz.újvár, Ördöngősfüzes, Bonchida, M.vásárh. Dés (Czetz 13), Torda (Ercsei 176)

Ribes uva-crispa L. — Bonchida (Soó EK. 278) verisimil. subspontanea.

575. *Parnassia palustris* L. — Torda „Keresztesmező“ (Ercsei 73)

Rosaceae.

576. *Pyrus pyraster* (L.) Borkh. — (EK. 268) — Kv. Szénafű, Fejérd, Kolozs, Bonchida, Sz.jenő, Iklód, Bonchida-Szék, Vszt.gothárd etc., Sz.újvár, M.ménes, P.kamarás, Teke, N.sármás (var. *achras* Gärtn. — Borza BCL. VIII. 20), Kékes, M.vásárh., Bánok-Doboka. — Torda(?)

577. *Malus silvestris* (L.) Mill. — (EK. 268) — Kv. Szénafű, Fejérd, Sz.újvár, Sz.jenő, Sármás, P.kamarás (Borza BCL. VIII. 20, 23 var. *hortulana* CKSchneid.), M.vásárh.-Vszt.gothárd-Feketelak(?)

578. *Sorbus aucuparia* L. (praecipue var. *lanuginosa* (Kit.) Beck) — (EK. 268) — Bonchida, M.szilvás, Báld, K.borsa.

579. *S. terminalis* (L.) Cr. — (EK. 268) — Bonchida, Sz.újvár, F.mikola, B.váralja, Szu.németi, Coptelke, Teke.

S. aria (L.) Cr. var. *incisa* Rehb. — K.borsa (Soó EK. 268), subspontanea?

580. *Crataegus monogyna* Jacq. — Frequens, praecipue in var. *a. intermedia* Schur et b. *hirsuta* (Schur) A. et G. (cf. Ny. Kv. 275) — e. *laeiniata* (C. Koch) Beck (*fissa* Poir.) — Dezmér (Ny. l. c.)

581. *C. oxyacantha* L. — Apahida (Ny. Kv. 274), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 29), Additamenta veteriora ad praecedentem referunt, certe etiam recentiora (Kv. Szénafű : Meusel Herc. 300, Sármás : Borza BCL. VIII. 20)

582. *Rubus caesius* L. — Frequens.

583. *R. tomentosus* Borkh. — Kv. Szénafű (Richt. ap. Ny. Kv. 277, f. *setosoglandulosus* Wirtg.), Torda (Freyn 125)

584. *R. caesius* × *tomentosus* (*R. agrestis* W. et K.) — Apahida (Ny. Kv. 276), Kolozs (Freyn 125), Kékes (Pr. MBL. XV. 155 sub *R. leucophaeo*)

585. *R. caesius* × *procerus* (*R. Holandrei* Müll.) — Kv. Szénafű (Butujás ap. Ny. Kv. 277), Ajton-Rőd (Freyn 125)

586. *Fragaria vesca* L. — Frequens, in silvis et dumetis. — b. *semperflorens* Duch. — Szu.németi (Hg. III. 130)

587. *F. viridis* Duch. — Frequens.

588. *F. mosehata* Duch. — Ad limites : K.borsa (Soó EK. 282), M.vásárh. (Kovács ap. Sternh. Siebend. 28)

589. *Potentilla alba* L. — (EK. 282) — Kv. Szénafű, Fejérd, Dezmér, Kolozs, K.bós, Sz.jenő, Iklód, Szék, Cege-Pujon, Kályán, F.mikola, Sóspatak-Ménesfalu, Mojos, Doboka-Moró. — Dés (Czetz 15) Torda (Ercsei 122)

590. *P. supina* L. — In formis : f. *elatior* Lehm. et f. *limosa* Bönningh. — Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 148, Kv. 280), Szamosfa-Apahida (!Priszter 87), Bonchida, Szék (Soó 110)

591. *P. anserina* L. — Frequens. — b. *sericea* Hayne Kv. Szénafű (Ny. Kv. 280)

592. *P. erecta* (L.) Räuschel — Kv. Szénafű, Fejérd (Soó GM. 93, 95, Kv. 281, 658, Ujv. Kv. 658), Cege-Pujon, Vszt.gothárd (Soó 110), Kékes (Pr. Cp. 101), M.vásárh. (Ny. Mv. 58), Torda (Ercsei 155)

b. *dacia* Borb. — Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 148), F.mikola (Hg. II. 66)

593. **P. reptans** L. — Frequens. — *f. microphylla* Trattn. — Kv. Szénafű (Bélteki ap. Ny. Kv. 281)

594. **P. arenaria** Borkh. — Frequens. — *f. concolor* Th. Wolff Kv. Szénafű (Ujv. Kv. 658)

595. **P. adscendens** W. et K. — Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 148, GM. 88, 90 *f. oligodonta* Th. Wolff, *f. polydonta* (Borb.), *f. vire-scens* (Boiss.) Th. Wolff), Szújvár (K. et O. 20), Cege (Soó 110), K.borsa(!) M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 64) — **b. sublaciniata** Schur (*incisoserrata* Th. Wolff) Apahida (Borb., Ny. Kv. 282), Vszt.gothárd (Soó 110)

596. **P. argentea** L. — Frequens, in formis multis : **a. tenuiloba** (Jord.) Schw. — **b. angustisecta** (Saut.) Th. Wolff — **c. latisecta** (Sauter) Th. Wolff — *f. macrotoma* (Borb.) Th. Wolff — **d. decumbens** (Jord.) Focke — **e. demissa** Lehm. **b.-e.** (omnes e Kv. Szénafű indicatae (Soó BK. XXIII. 148, Ny. Kv. 283) — **f. incanescens** (Op.) Focke : *impolita* (Wahlbg.) Tratt. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 98, Soó I. c. cum *f. subincanescens* (Saut.) Th. Wolff et *f. magyarica* (Borb.) A. et G. — Soó I. c.) — **g. disseeta** Wallr. Kv. Szénafű (Soó I. c.), Apahida, K.bós (Ny. Kv. 284)

597. **P. leucopolitana** PJMüll. — Kv. Szénafű, Melegy. (Soó GM. 88, 90, Pr. Cp. 142, Fl. II. 292, Ny. Kv. 284), A.zsuk (Pr. Fl. II. 219), K.borsa(!), Szamosfa (Ny. I. c., Csűrös BCI. XXVII. 82), Apahida (Barth 109, Ny. I. c.)-K.kara (Pr. Cp. 98), Torda (Wolff ap. Simk. En. 219) — **b. mierodons** (Schur) Soó (*brachyloba* Borb.) — Kv. Szénafű (Simk. En. 219, Soó BK. XXIII. 148) — **c. Schultzii** (PJMüll.) Th. Wolff — Kv. Szénafű (Ny. Kv. 284), Szamosfa (Ujv. Kv. 658)

598. **P. reeta** L. — Frequens, in formis multis : **a. obseura** (Willd.) Koch, — *f. oxytoma* (Borb.) Soó — Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 148) K.borsa(!) — **b. pilosa** (Willd.) Led. — Kv. Szénafű (Soó I. c., Ny. Kv. 285), Pujon (Soó 110), Torda (Ercsei 122) — *f. auriflora* Borb. — Kv. Szénafű (Borb. ap. Ny. I. c.) — **c. semilaciniosa** Borb. — Apahida (Schur En. 189, cf. Simk. En. 218), Kékes (Pr. Cp. 108, MBL. XII. 126 sub *P. leucotricha* Borb.?),

ssp. tuberosa (J. Wolff) Soó — A.zsuk „Keselyhegy“ (Ny. BK. XXXVIII. 140, Kv. 284), Torda „Gorgány“ J. Wolff ap. Siegfr. Pot. exs. 914, FEAH. 2832) cf. Th. Wolff Mon. Potentilla 345, Soó AGH. V. 160.

599. **P. thuringiaca** Bernh. : **P. parviflora** Gaud. **ssp. thuringiaca** Hyl. (EK. 282) — Kv. Szénafű, Dezmér, Ajton, Pujon, Szújvár, B.váralja, Kékes, Vszt.gothárd, Mojos, M.vásárh., K.borsa, Bádok, Moró-Tötör — *f. elongata* (Goldb.) Th. Wolff — Kv. Szénafű. — **b. Nestleriana** (Tratt.) Sch. et K. — Kv. Szénafű, B.váralja, Szu.németi-Coptelke, Dezmér.

ssp. chrysanthia (Trev.) Soó — Kv. Szénafű, Fejér, Kolozs, K.bós, Vszt.gothárd — Torda (Janka 567, Wolff 59)

600. **P. heptaphylla** Justl. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 98, ÖBZ. X. 325, Soó GM. 90, BK. XXIII. 148 — *f. pusilla* Vocke — Pr. Cp. 142, Wolff, Ny. Kv. 287), Szújvár (K. et O. 20), F.mikola (Hg. II. 66) M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 66), Kecsed (Hg. I. 126), K.borsa(!)

601. **P. patula** W. et K. — Kv. Szénafű (Andrae BZ. XI. 456,

Schur VSV. X. 98, ÖBZ. X. 325, Pr. Cp. 132—3, auct. multi, Soó, Ny. Kv. 287, Ujv. Kv. 658, partim ad *f. tenella* Tratt. verg.), A.zsuk (Ny. I. c.), Apahida (Pr. Cp. 142, „*tenella*“, ap. Ny. I. c.), Kolozs, K.bós (Freyn 126), K.borsa(!), Szújvár (K. et O. 20), Vszt.gothárd (Janka 567, ap. Fuss VSV. XIX. 210), M.záh (Barth 109), M.bánd-M.bergenye (Pr. Cp. 153, „*tenella*“), Torda (Barth 109, Sebők 41) — **b. tenella** Tratt. sec. Ny. Kv. 286 tantum transitus.

602. **P. argentea** × **recta** (var. *pilosa*: **P. Kernerii** Borb.) — Apahida (Borb. ap. Soó BK. XXIII. 148)

603. **P. argentea** × **adscendens** (**P. semiargentea** Borb.) — Kv. Szénafű — Fejér (Ny. BK. XXXVIII. 140, Kv. 287)

604. **P. argentea** × **leucopolitana** (**P. argolitana** Nyár.) — Kv. Szénafű (Richt. ap. Ny. I. c.) Hybrida non certa.

605. **P. adscendens** × **recta** (var. *pilosa*: **P. Wolffiana** Siegfr.) — Kv. Szénafű (L. Richter ap. Soó BK. I. c., cf. Th. Wolff Mon. Potentilla 355), Torda (Wolff ap. Siegfr. Pot. exs. 334)

606. **Waldsteinia geoides** Willd. — (EK. 282) — Apahida, Fejér, Szék, Berkenyes, P.kamarás, Feketelak, Kiscég.

607. **Geum urbanum** L. — (EK. 282) — In silvis frequens. Delenda : *G. aleppicum* Jacq. — Szújvár (K. et O. 13)

608. **Filipendula vulgaris** Mönch = **hexapetala** Gilib. — Frequens.

609. **F. ulmaria** (L.) Max **a. glauca** (Schultz) A. et G. — Kv. Szénafű, Fejér (Soó GM. 93—6, 106, Kv. 658, Ny. FK. 43, 46, 51, Kv. 289, Ghisa BCI. XXI. 61), Dezmér (Páter ap. Ny. Kv. 289), Ajton (Freyn 127), Apahida(!), Báld (Pr. FK. 313), Bonchida(!), F.mikola (Hg. II. 66), Désakna (Hg. II. 71), Torda (Ercsei 20) — **b. denudata** (Presl) Beck — Kv. Szénafű (Ny. FK. 51), Kékes (Pr. Cp. 78)

610. **Alehemilla vulgaris** L. s. l. — Kolozs (Freyn 126)

A. arvensis (L.) Scop. Ad limites : M.vásárh. (Bgt. I. 96, Ny. ap. Soó Szf. 67)

611. **Agrimonia eupatoria** L. — Frequens.

612. **Sanguisorba officinalis** L. — Kv. Szénafű, Fejér (Bélteki, Ny. Kv. 290, Soó Kv. 658), Ajton (Freyn 126, Ny. I. c.), Kékes (Pr. Cp. 144), K.borsa(!), Torda-A.polyán (Ercsei 175, Wolff 59), cf. Pr. Fl. II. 345.

613. **S. minor** Scop. praec. **ssp. muricata** (Spach) A. et G. — Frequens. — **b. lasiotricha** (Borb.) Soó Kolozs (Soó Kv. 658) — Typus indicatur : Kv. Szénafű (Soó GM. 90, Ny. Soó Kv. 290, Pr. Fl. II. 457), Szamosfa (Ujv. Kv. 658), Apahida (Barth 109, Ny. I. c.), M.záh, M.pagocsa, Torda (Erdei 36), M.vásárh. (Barth I. c., Ny. Mv. 68) — **b. puberula** (DC) Gams Kv. Szénafű (Soó, Ny. Kv. 290), Apahida (Soó Kv. 658)

614. **Rosa spinosissima** L. — Kv. Szénafű, Telekfarka (Borb. Rosa 548, Ny. Kv. 292) — **b. pimpinellifolia** (L.) Braun — Mezőség (Bgt. II. 49), A.zsuk (Ny. Kv. 291), Apahida (Hg. ap. Soó 111), M.záh (Ercsei 129), Kolozs (Pr. 29—30, *f. Cojocnae* Prod.)

615. **R. gallica** L. — Kv. Szénafű (Soó GM. 84, Ny. Kv. 292, FER. 1021, Pr. Cp. 95, 136, 141, Rosa 42), Kolozs, K.bós, Berkenyes (Freyn 125), Apahida, Bonchida-Iklód, Cege, Pujon-Omboztelek, Kállyán(!), Torda (Ercsei 129, Wolff 59), Kékes (Pr. Cp. 92), Dés (Pr.

Rosa 42), Sz.újvár (Pr. Cp. 109), Sz.nyires (Pr. MBL. XV. 255), Désakna (Hg. II. 71), Kecsed, Doboka-Moró (Hg. I. 126, 129), M.vásárh. (Ny. Kv. 56, ap. R. Keller BCL. VI. 6. formae variae) saepissime
a. austriaca (Cr.) — **b. cordifolia** (Host) Br. — M.szovát (Péterfi ap. Pr. Rosa 41) — **c. elata** Christ Kv. Szénafü (Ny. Kv. 292) — **d. haplodonta** (Borb.) Br. — Kv. Szénafü (Pr. Rosa 43, *f. semihaplodonta* Prod. FER. 1023) — **f. napocensis** Prod. — Kv. Szénafü (Pr. Rosa 43) — **e. leiophylla** (Borb.) R. Kell. — Kv. Szénafü, Fejér (Pr. Rosa 44, Ny. Kv. 292) — *f. fejérdensis* Nyár. — Fejér (Ny. l. c.) — **f. magnifica** (Borb.) Br. Kv. Szénafü-Fejér (Pr. Rosa 42, FER. 1020) — **g. pannonica** (Wiesb.) Br. — Kv. Szénafü (Soó BK. XXIII. 148, Pr. Cp. 141, Rosa 45, FER. 10124), A.zsük (Ny. Kv. 292), Kékes (Pr. Rosa 45) — **h. pumila** (Jacq.) Br. — Kv. Szénafü (Landoz, Wolff Borb., Richt. ap. Pr. Rosa 43, Ny. Kv. 292), Bonchida (Kanitz ap. Pr. l. c.), M.szovát (Péterfi ap. Pr. l. c.)

616. R. obtusifolia Desv. — Kv. Szénafü (Soó GM. 84, BK. XXIII. 149, Pr. Rosa 60, FER. 1028) — **b. bonehidensis** R. Kell. — Bonchida (Kanitz ap. Pr. Rosa 62) — **c. fascifoliata** R. Kell. — Bonchida (Kanitz l. c.)

617. R. dumetorum Thuill. — Kv. Szénafü (Soó BK. XXIII. 148, GM. 82, 84), Ombozelke (Soó 111), Doboka-Bádok (Hg. I. 129) — **a. solstitialis** (Bess.) : Thuillieri Chr. — Kv. Szénafü, Fejér (Soó l. c., Pr. Rosa 72, Cp. 141, Ny. Kv. 296), M.szovát, Kékes, Sz.újvár, Dés (Pr. Rosa 72—3), Désakna (Richt. ap. Pr. l. c.), M.vásárh. (Ny. Mv. 57, ap. Pr. l. c., ap. R. Kell. BCL. VI. 34) — **b. gabrielis** F. Gér. — Kv. Szénafü (Pr. FER. 1038) — **c. globata** (Désegl.) Rouy — Kv. Szénafü (Hg. in Kv. 659) — **d. hispidula** (Rip.) Chr. — Kv. Szénafü (Pr. Rosa 71, FER. 1035 bc. et *f. foliis glaucescentibus* Pr. Rosa 72), Teke (Pr. l. c.) — **e. leptotricha** Borb. — Fejér (Ny. Kv. 296) — **f. hirta** Br. *f. peropaca* Br. — Kv. Szénafü (Hg. in Kv. 659) — **g. obseura** (Pug.) Kv. Szénafü (Pr. Rosa 70, cf. Borb. Rosa 429) — **h. platyphylla** (Rau) Chr. — Kv. Szénafü (Soó BK. XXIII. 148, Pr. FER. 1034 ex Ny. Kv. 296), Apahida (Soó Kv. 659), Désakna (Richt. ap. Pr. Rosa 71), M.vásárh. (Ny. ap. Pr. l. c., R. Kell. B. Cl. VI. 33), P.kamarás (Pr. Cp. 102) — **i. pubens** (Dés. et Oz.) — Kv. Szénafü (Pr. Rosa 76) — **j. ramealis** (Pug.) Kv. Szénafü (Borb. Rosa 429, Soó BK. XXIII. 149) — **k. sphaeroarpa** (Pug.) Kv. Szénafü (Pr. Rosa 70 cum *f. foenatis* Pr.) — **l. sphaeroidea** Schwertschlage — Kv. Szénafü (Pr. FER. 1043) — **m. subglabra** (Borb.) R. Kell. — Kv. Szénafü (Pr. Rosa 75), Dés (L. Richt. ap. Pr. l. c.), M.vásárh. (Ny. Mv. 57, ap. R. Kell. BCL. VI. 34) — **n. urbica** (Lem.) Baker — Kv. Szénafü (Soó BK. XXIII. 148) — **o. tortuosa** Wierzb. *f. glabra* Deg. — Dezmér (Soó Kv. 659)

618. R. canina L. — Frequens, in formis multis. — **a. Lutetiana** Lem. — Kv. Szénafü (Pr. Rosa 96, FER. 1050 c., Soó, Hg. Kv. 654), Kolozs, Désakna (L. Richt. ap. Pr. l. c.), Sz.újvár (Pr. Cp. 264), Dés, Kékes (Pr. l. c.) — *f. brevipes* (Borb.) Kv. Szénafü (Borb. Rosa 142, Soó BK. XXIII. 149, Pr. Rosa 97) — **b. analoga** (Désegl.) Rouy. — Kv. Szénafü (Pr. Rosa 102) — **c. euoxiphylla** Borb. — Kékes (Pr. MBL. XV. 255) — **d. fissidens** Borb. — Kv. Szénafü, Fejér (Ny. Kv. 298, Hg., Soó Kv. 659), Dezmér (Soó l. c.), Kékes (Pr. MBL. XV.

255) — **dd. fallens** (Désegl.) Borb. — Kv. Szénafü : Jósikat. (Soó l. c.) — **e. globosa** Desv. — Kv. Szénafü (Borb. Rosa 415, Pr. Rosa 97, Soó Kv. 659 sub *R. sphaerica*) — **f. globularis** (Franchet) Crépin — Kv. Szénafü (Pr. Rosa 103, Soó Kv. 659) — **g. hirtella** (Rip.) Christ — Kv. Szénafü (Kanitz, Pr. Rosa 103) — **h. marisensis** Simk. et H. Br. — Kv. Szénafü, Fejér (Soó BK. XXIII. 149, Pr. Rosa 99, Ny. Kv. 299), Apahida (Pr. l. c., Soó Kv. 659), Kolozs, Sz.újvár, Dés, Mócs, M.szovát (Pr. l. c., Pr. Cp. 264) — *f. duplicitoserrata* (Deg.) Soó — Kv. Szt. györgyh. (Pr. Rosa 100) — **i. montivaga** (Désegl.) Borb. — Kv. Szénafü (Soó Kv. 659), Fejér (Ny. Kv. 298) — **j. pervulgata** Schwertschl. — Kv. Szénafü (Pr. Rosa 102) — **k. submyrtillus** H. Br. — Kv. Szénafü (Pr. Rosa 97) — **l. syntrichostyla** (Rip.) Borb. — Kv. Szénafü (Pr. l. c. 96, Ny. Kv. 298) — **m. semibiserrata** Borb. — Kv. Szénafü (Pr. Rosa 101, Ny. Kv. 299, Soó l. c.), Dezmér (Soó l. c.) — **f. praecox** Prod. — Kv. Szénafü (Pr. l. c. 101) — **n. spuria** (Pug.) Borb. — Kv. Szénafü (Soó l. c.) — **o. Timeroyi** Chab. — Kv. Szénafü (Pr. Rosa 104) — **p. Touranginiana** Dés. et Rip. — Kv. Szénafü (Pr. Rosa 98) — **q. transitoria** R. Kell. — Kv. Szénafü (Pr. Rosa 102, Ny. Kv. 299), Dés (L. Richt. ap. Pr. l. c.) — **r. transsilvanica** (Schur) R. Kell. — Kv. Szénafü (Soó BK. XXIII. 149, Pr. Rosa 104, Borb. ap. Pr. l. c.), Kékes (Pr. MBL. XV. 255) — **s. vaccinoides** H. Br. — Kv. Szénafü (Pr. Rosa 97) — **t. vásárhelyensis** R. Kell. — M.vásárh. (Ny. ap. Keller BCL. VI. 27) — **u. vinealis** (Rip.) Rouy. — M.vásárh. (Ny. ap. Keller l. c.), **ssp. dumalis** (Bechst.) Hay. — Kv. Szénafü, Dés (Pr. Rosa 111, M.vásárh. (Ny. ap. Keller l. c. 28) — **b. biserrata** (Nérat) Baker — Kv. Szénafü (Pr. l. c. 110, FER. 1061) — **e. medioxima** (Désegl.) Borb. — Kv. Szénafü (Pr. l. c. 113) — **d. recognita** Rouy — Kv. Szénafü (Pr. l. c. 110), M.vásárh. (Ny. ap. Keller BCL. VII. 28) — **e. Sabranskyi** H. Br. — Bonchida (Kanitz ap. Pr. l. c. 112) — **f. sphæroidea** (Rip.) Borb. — Kv. Szénafü (Pr. l. c. 110) — **g. submészkoensis** R. Kell. — Kv. Szénafü (Pr. FER. 1067) — **h. verticillacantha** (Mérat) Baker — Kv. Szénafü (Pr. FER. 1064) — **i. villosiuseula** (Rip.) Borb. — Bonchida (Kanitz ap. Pr. Rosa 112), M.vásárh. (Ny. ap. Pr. l. c.), Teke (Pr. l. c.). E Marosvásárhely etiam indicantur (Ny. ap. R. Keller BCL. VI. 27—30) : **ascita** (Désegl.) Borb., **brachypoda** (Désegl. et Rip.) Borb., **glaucina** (Rip.) Br., **innocua** (Rip.) Borb.

619. R. mierantha Sm. — Kv. Szénafü (Pr. Rosa 127 et *f. campiensis* Prod. l. c. 128) Ombozelke (Soó 111) — **b. septicola** Désegl. — *f. pseudominuscula* Rouy — Bonchida (Kanitz ap. Pr. l. c.)

620. R. caryophyllacea Bess. **b. bonehidiae** R. Kell. — Bonchida (Kanitz ap. Keller Synops. Rosarum 413, Pr. Rosa 130)

621. R. eglanteria L. (*R. rubiginosa* L.) Ad limites : K.borsa (Soó Erd. Kis. 269), Torda (Ercsei 128?)

Dubia : *R. arvensis* Huds. — Torda (Ercsei 130)

622. R. arvensis × galliea (*R. Polliniana* Spr.) — Kv. Szénafü (Kanitz ap. Pr. Rosa 28 : **v. coriacea** (Borb.) R. Kell.), Bonchida (Kanitz l. c. : **v. umbellata** R. Kell.)

623. R. canina × gallica (*R. Jundzillii* Bess.) — **b. Bichigeani** (*pannonica* × *transsilvanica*) Prod. — Kv. Szénafü (Pr. Rosa 48) — **c. campiensis** Prod. — Kv. Szénafü (Pr. FER. 1025) — **d. insidiosa**

- Rip. — Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 149, GM. 84; Pr. Rosa 48) —
e. perglandulosa Borb. — K.bós (Freyn ap. Borb. Rosa 383)
 624. *R. foetida* Herrm. — Subspont.: Kajántó (Schmidt ap. Ny. Kv. 291), Szabéd (Ny. l. c., ap. Pr. Rosa 90), Mócs (Pr. l. c.)
 624a. *R. foetida* × *gallica* (*R. sabedensis* Prod.) — Szabéd, spontanea (Ny. ap. R. Kell. B. Cl. VI. 7, ap. Pr. Rosa 39)
 625. *Prunus tenella* Batsch (*P. nana* (L.) Stokes non Duroi) — Kv. Szénafű (Bgt. II. 30, Schur VSV. X. 98, Winkler 50, Hayek 466, Soó GM. 84, 89, Pr. Cp. 95, 134, 141, Soó AGH. V. 146—7, VI. 40, auct. multi ap. Ny. Kv. 302, FER. 156b, Meusel 301 — etiam *b. campestris* (Bess.) Beck: Richt. HNorm. 5033, Soó GM. 97), Apahida (Pr. Ny. l. c., Soó AGH. V. 149), Kolozs, K.kara, K.bós, Berkenyes, Virágosv. (Freyn 127), A.zsuk (Ny. l. c., Pr. Cp. 152), M.szovát (Pop Guide 165, Pr. Fl. II. 212), Sz.újvár-Kérő (K. et O. 4), Vszt.gothárd (Janka 566) — etiam *b.* — Telekfarka-Apahida-Kályán, Bonchida, Szék, Iklód, Feketelak, Ombozelke (Soó 111), Mojos (Lengy. ap. Soó l. c.), Kékes (Pr. Cp. 92), Báld (Pr. FK. 1914. 313, Cp. 146), M.záh (Pr. Cp. 146), M.bánd (Pr. Cp. 105, F. et Bl. 691), M.bánd-M.bergenye, Sóspatak (Pr. Cp. 153), M.lekence, M.koppánd (F. et Bl. 691), Torda (Ercsei 105, Wolff 58), Torda-M.őr (Ercsei!), M.kök, Gerend (Simk. En. 199)
 626. *Prunus avium* L. var. *silvestris* (Kirschl.) Dierb. (EK. 268) — Kv. Fejérd, Dezmér, Apahida, Kolozs, Ajton, Sz.újvár, Coptelke, Bonchida-Szék, Sz.jenő, Iklód, Szék-Vszt.egyed-Ombozelke-Pujon-Feketelak, Kályán, M.szilvás, P.kamarás, N.sármás, M.ménes, Gyeke-Sármás, Berkenyes, M.záh, Bala-N.ercse, M.vásárh.
 627. *P. spinosa* L. a. *vulgaris* Sér. et *b. dasypylla* Schur — Frequentes (cf. Ny. Mv. 55, Kv. 303, Acta Bot. Szeged I. 37) — *f. major* Posp. Kolozs (Ny. l. c.) — *e. inermis* Godr. — Kv. Szénafű, K.bós (Ny. l. c.)
 628. *P. fruticosa* Pall. — (EK. 269) incl. *f. aucta* (Borb.) Jav. — Kv. Szénafű, Fejérd, Dezmér, Apahida, K.kara, Kolozs, K.bós, Sz.újvár, Bonchida-Szék, Iklód, M.szava, Feketelak, Bala-N.ercse, Szabéd-M.fele, Vszt.egyed, Vajdaszt.iván, Lövér, K.sármás, N.ölyves, M.lekence, M.vásárh. — Torda (Wolff 58)
 629. *P. padus* L. — (EK. 268) — Sz.újvár, Bonchida, Vszt.iván, A.gyéres, M.szilvás, K.sármás, M.ölyves, Szabéd, M.kölpény, Székes, Ikland, M.vásárh. — Torda (Ercsei 168, Wolff 58, Freyn 127, Györffy, Szegedi F. II. 163)
P. cerasus L. — Subspont.: M.ménes (Borza BCl. VIII. 25)
P. cerasifera Ehrh. — Subspont.: Dezmér, Apahida (Ny. Kv. 302)
 630. *P. avium* × *fruticosa* (*Mohácsyana* Kárp.) — M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. Suppl. 31)

Leguminosae.

631. *Genista sagittalis* L. (*Genistella* s. Gams) — Kv. Szénafű (Soó GM. 88, 90, Pr. Cp. 135—7, Ny. Kv. 307), Apahida (Ny. l. c.), Kolozs, K.bós, Virágosv. (Freyn 127), Kályán(!)

632. *G. spathulata* Spach — Torda, Egerbegy, Gerend (Barth 108)
Dubiae: *G. ovala* W. et K. ssp. *transsilvanica* (Lerchenf.) Jav. var. *Mayeri* (Janka) Jav. Kékes (Prod. MBL. V. 31.) — *G. pilosa* L. — Torda (Ercsei 125), Sz.újvár (K. et O. 12) — *G. germanica* L. — Torda (Ercsei 125)
 633. *G. tinctoria* L. (incl. ver. *campestris* (Janka) A. et G.) Frequens, sed *ssp. elata* (Mönch) A. et G. frequentior. — *b. subnitens* Nyár. — Dezmér „Puc“ (Üjv. Kv. 660)
 634. *Cytisus nigricans* L. — Kv. Szénafű (Ny. Kv. 308, Soó Kv. 660, AGH. V. 148—9, Meusel 301), Apahida (Ny. l. c., Pápai, Richt. ap. Ny. l. c.), Kolozs (Schur VSV. X. 111), A.sztniklós (Pr. Cp. 93), Sz.éncs (Pr. Cp. 94), Budatelke (Pr. Cp. 145), Fejerd, Szék, Cege-Pujon-Ombozelke, Sz.újvár, Bonchida-Kisiklódi(!), M.vásárh. (Ny. Mv. 60), Torda (Ercsei 167) — *b. sericeus* Rochel — Kolozs (Schur l. c., Freyn 127), Kv. Szénafű (Borb. ap. Ny. Kv. 309)
 635. *C. supinus* L. (*C. aggregatus* Schur) — Kolozs, K.bós, Torda (Freyn 128) — Dubia.
 636. *C. albus* Hacq. — Frequens. — *b. pallidus* (Schrad.) A. et G. Torda (Ercsei 166 sub „*C. austriaco*“)?, Vszt.iván (K. et O. 9 sub „*C. austriaco*“)?, M.vásárh. (Kovács ap. Rehb. Icones XXII. 12)
 637. *C. hirsutus* L. ssp. *leucotrichus* (Schur) A. et G. — (EK. 282) — Kv. Szénafű, Fejérd, Apahida, Egerbegy, Sz.újvár, Szék, M.szovát. — Torda (Ercsei 166, sub „*C. supino*“), Dés (Czetz 14)
b. semielongatus Nyár. — Bonchida-Kisiklódi (Soó 111), Apahida (Pr., Ny. Kv. 310)*, Sz.újvár (K. et O. 10 sub „*C. ratisbonensi*“?)
 638. *Ononis arvensis* L. (*O. hircina* Jacq.) — Frequens. — *b. spinescens* Ledeb. (*O. spinosa* et *spinosa-hircina* auct. Transs.) — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 97), Szamosfa (Wolff ap. Ny., Soó Kv. 310), Apahida (Soó AGH. V. 153, Ny. Kv. 660), Torda (Ércsei 66), Kékes (Pr. Cp. 93)
 639. *Trigonella procumbens* (Bess.) Rchb. — Kolozs (Bgt. II. 369, Landoz ap. Ny. Kv. 660), Torda (Bgt. l. c., Wolff ap. Sirjaev Trigonella V. 10, sed planta certe pr. Szind lecta), Sz.újvár (K. et O. 17)
T. foenum-graecum L. — Kolozs (Barth ap. Sirjaev l. c. 38) Subspontanea?
 640. *Medicago lupulina* L. — Frequens, in formis multis : *a. vulgaris* Koch f. *erecta* R. Kell., f. *prostrata* R. Kell., *b. eriocarpa* R. et F., *c. glandulosa* M. et K. — Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 149, Kv. 311, Ny. Kv. 311)
 641. *M. falcata* L. — Frequens, in formis multis : *b. procumbens* (Bess.) A. et G. — Kv. Szénafű (Soó Kv. 312, Üjv. Kv. 660), Szamosfa (Soó BK. l. c.), Apahida (Ny. Kv. 312) — *e. diffusa* Schur Kv. — Szénafű(!), Fejérd, Telekfarka-Apahida, Szamosfa, Apahida (Soó in Gr. 247, Ny. Kv. l. c.), Kolozs (Schur VSV. X. 111), Torda (Schur VSV. X. 78, Soó l. c.) K.borsa(!) — *d. mierophylla* (Coss. et Ansb.) Rouy — Kv. Szénafű (Soó BK. l. c.)

* Hanc plantam Ny. partim sub *C. elongato*, partim sub *C. leucotr. ssp. semielongato* publicavit (Cheia Turzii Resumé 5, Kv. 310)

642. *M.sativa* L. — Subspontanea, frequens.
Dubia : *M. rigidula* Desr. — Kv. Szénafű (Bgt. II. 382), Torda (Ercsei 40)
643. *M.minima* (L.) Grub. — Kv. Szénafű (Soó GM. 90), Melegv(!) Apahida (Soó BK. XXV. 144, Kv. 660, Ujv. I. c. — cum *b. viscosa* Koch), B.váralja (Hg. III. 125), Torda (Freyn 128)
644. *M. falcata* × *sativa* (*M. varia* Martyn) — Kv. Szénafű (Soó BK. XXV. 144 cum *b. pseudofalcata* R. et F., Ny. Kv. 312), Szamosfa (Soó Kv. 312 in Gr. 250), Apahida (Ny. I. c., Soó Kv. 660), Bonchida-Iklód (Soó 111), Báld (Pr. FK. 1914. 313)
645. *Melilotus dentatus* (W. et K.) Pers. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 97), Szújvár-Zsuk (Pr. Cp. 74, 88, Flora II. 288) an vero?
646. *M. altissimus* Thuill. ssp. *paluster* (W. et K.) b. *perfrondosus* Borb. — Kv. Szénafű (Borb. ÖBZ. XXXV. 76, MBL. I. 108, Hayek 466, Soó GM. 94, 96), Fejérd-Telekfarka(!), Szamosfa (Soó Kv. 313), Kolozs (Schur En. 153, Hayek 467), Dés (L. Richt. ap. Borb. MBL. I. c.), Torda (Schur VSV. X. 78, En. 153)
647. *M. officinalis* (L.) Lam. — Frequens.
648. *M. albus* Desr. — Kv. Szénafű-Szamosfa (!Ny. Kv. 313), Szszt.miklós-Apahida(!), Torda (Wolff 58), M.bánd, M.ludas (Lengy.), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. Suppl. 72)
649. *Trifolium procumbens* L. resp. *campestre* Schreb. — Frequens in formis plurimis (cf. Ny. BK. XXXVIII. 141—2, Kv. 314—5) — *b. minus* Koch — Kv. Szénafű, Szamosfa, Apahida, Kolozs (Soó BK. XXIII. 149, in Gr. 247—9, Kv. 660, Consp. 50, 55), Dés (Pr. Cp. 79 sub „*T. filiforme*“?), Torda (Soó in Gr. I. c.)
650. *T. agrarium* L. = *T. aureum* Poll. — (EK. 282) — Kv. Szénafű, Szújvár, Korpád, Bazéd, M.vásárh. — Fejérd(!), Torda (Ercsei 97)
651. *T. dubium* Sibth. — Kv. Melegv. (Ny. Kv. 314, Soó Consp. 56), Szamosfa, Apahida (Páter, Ny. Kv. 314, Ujv. Kv. 660, Soó I. c. 46), Ajton (Ny. I. c.), Torda (Schur VSV. X. 78), Dés (Pr. Cp. 79), Sz.lekence (Lengy.), M.vásárh. (Ny. Mv. 63)
652. *T. fragiferum* L. — Frequens.
653. *T. montanum* L. — Frequens. — *f. robustum* Schur — Kv. Szénafű (Soó BK. XXV. 144)
654. *T. retusum* Höjer (*T. parviflorum* Ehrh.) — Kv. Melegv. (Pr. Cp. 141, Fl. II. 292, sed sec. Ny. Kv. 316 ?), Szamosfa (Pr. Cp. 88, Fl. I. 528)?, Dés (Pr. Cp. 79, Fl. I. 528, II. 288), Torda-Sósfürdő (Wolff MNL. I. 58, ap. Freyn 128, Pr. I. c.)
Dubia : *T. strictum* Jusl. (*T. laevigatum* Desf.) — Kolozs (Bgt. II. 370), Torda, M.csán (Ercsei 96)
655. *T. angulatum* W. et K. — Szamosfa (Soó Kv. 317, Consp. 55), Apahida (Ny. FER. 1987, Kv. 317), Kolozs (Bgt. II. 370, Schur VSV. X. 111, Hayek 465), Désakna (Bgt. I. c.), Mócs (Sigerus ap. Fuss Transs. 164), Torda (Bgt. I. c., Ercsei 96)
656. *T. repens* L. — Frequens.
657. *T. hybridum* L. — Frequens.
658. *T. striatum* L. — Kv. Melegv. (Pr. Cp. 141, Fl. II. 292, Soó Consp. 55), Szamosfa (Simk. En. 182, Soó in Gr. 248, GM. 101, Consp.

- 55, Pr. Cp. 88), Apahida (Soó I. c., Ny. FER. 558), Dés (Pr. Fl. II. 288), Torda (Fuss Transs. 161, Freyn 128)
659. *T. arvense* L. — Frequens — *b. strictius* M. et K. (Brittingeri Beck) — Torda (Todor FER. 1986)
660. *T. alpestre* L. — Frequens, in formis pluribus (*f. monostachyum* Sér., *f. distachyum* Sér.)
661. *T. rubens* L. — Kv. Szénafű, Fejérd (Bgt. II. 372, Schur VSV. X. 97, Winkler 44, Hayek 466, Soó GM. 83, 90, AGH. V. 143, 149, Meusel 300, auct. pl. ap. Ny. Kv. 320), Kajántó, A.zsuk (Ny. I. c.), Apahida (Schur VSV. X. 117, En. 155, Richt. ap. Ny. I. c.), Kolozs (Freyn 128), K.bós (Ny. FER. 557), Szújvár (Hg. II. 68), Bonchida, Iklód, Szék, Cege, Pujon, Vszt.gothárd-Feketelak (Soó 111), K.borsa(!), Kecsed, Doboka-Moró (Hg. I. 126—8), Kékes (Pr. Cp. 144), Mócs (Pr. Fl. I. 521), Báld (Borza BCI. VIII. 22, Pr. Cp. 103), M.szilvás (Borza I. c. 18), Gerend (Wolff 58), M.vásárh. (Ny. Mv. 64), Torda (Ercsei 97)
662. *T. ochroleucum* Huds. — Kv. Szénafű-Fejérd (Schur VSV. X. 97, Soó, Ny. Kv. 318), Apahida (Soó AGH. V. 153, Kv. 660), Kolozs-K.bós (Freyn 128), Szújvár (K. et O. 25), Bonchida, Iklód, Szék, Cege, Pujon, Vszt.gothárd (Soó 111), Budatelke (Pr. Cp. 145), Kecsed, Doboka-Moró (Hg. I. 126—8), K.borsa(!), M.vásárh. (Ny. Mv. 64), Torda (Todor FER. 2445), — monstr. *pseudoleistogamum* Nyár. — Szt.györgyh. (Pr. ap. Ny. Scr. I. 80, Kv. 318)
663. *T. pannonicum* Jacq. — Kv. Szénafű, Fejérd (Pr. Cp. 136—7, FER. 558, Ghisa BCI. XXI. 61, Richt., Ny. Soó Kv. 318, Hg. Kv. 660), Kolozs, K.bós, Virágosv. (Freyn 128, Ny. I. c.), Ajton (Ny. I. c.), F.mikola (Hg. II. 66), Dés (Schur VSV. X. 115), Kékes, M.földvár (Pr. Cp. 144—5), Doboka-Bádok (Hg. I. 129), K.borsa(!), Bonchida, Iklód, Szék, Cege, Pujon, Vszt.gothárd (Soó 111)
664. *T. medium* L. — (EK. 682) — Kv. Szénafű, Fejérd, Ajton, Dezmér, Aranykút, Berkenyes, Apahida, Korpád, Sz.jenő, Iklód Szék, Cege, Pujon, Vszt.gothárd, Szújvár, F.mikola, B.váralja, Copitelke, Doboka-Moró, Báld, A.sztmiklós, Zsuk, Bazéd, M.vásárh. ssp *sárosiense* (Hazsi.) Gib. et Belli — F.mikola (Hg. II. 65)
665. *T. pratense* L. — Frequens, in formis pluribus (*f. biceps* Pop : Kv. Szénafű Pop BCI. XIII. 103)
- b. expansum* (W. et K.) Hausskn. : *americanum* Harz. — Kolozs (Bgt. II. 372)
- T. incarnatum* L. — Subspont. Sz.lekence (Lengy.)
- Delenda : *T. pallidum* W. et K. — Mezőség (Schur En. 152) — *T. resupinatum* L. — Mezőség (Bgt. II. 377), Torda (Ercsei 97) — *T. ambiguum* M. B. — Farago (Janka 563) — *T. diffusum* Ehrh. — Torda (Ercsei 96)
666. *Anthyllis vulneraria* L. — Kv. Szénafű (Pr. Cp. 96 et pl. loc., Fl. II. 457, Ghisa BCI. XXI. 60)?, Apahida (Pr. Cp. 143)?, Szújvár (K. et O. 4, Pr. Cp. 143)?, Báld (Pr. FK. 1914. 313, Cp. 146)?, Torda, Gerend, M.záh, M.pagocsa (Ercsei 141)?, M.vásárh. (Ny. Mv. 62, Pr. Cp. 96)?, M.szovát (Borza Guide 208)? certe ad ssp. pertinent, tantum ad limites : Ajton (Ny. Kv. 321)
- ssp. *polyphylla* (Kit.) Hay. — Frequens. — *b. leiotricha* Borb.

(*A. vulneraria* auct.) Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 149, Kv. 321, 660) cfr. supra.

e. sanguinea Schur (*A. Dillenii* auct.) — Kv. Szénafű (Soó, Ny. Kv. 321), Kolozs, K.bós (Freyn 128) — *f. minor* Nyár. — Kv. Szénafű (Ny. I. c.)

667. **Dorycium herbaceum** Vill. — Frequens. (*D. sericeum* Hg. I.)

668. **Lotus siliquosus** L. — Kv. Szénafű, Melegv. (Schur VSV. X. 97, Soó GM. 93, auct. multi ap. Ny. Kv. 322, Soó, Ujv. Kv. 660, Pr. Cp. 140, Fl. II. 291), Szamosfa-Apahida (Soó Consp. 44, Pr. ap. Ny. I. c.), Kolozs (Bgt. II. 353, Schur En. 160, Freyn 129), A.zsuk (Ny. I. c.), K.bós, Berkenyes, Virágosv. (Freyn 129), Gerend (Ercsei 92), Bonchida, Szék, Cege, Vszt.gothárd(!), Szabéd (Szakmáry 120), Tötör-Moró (Hg. I. 127), Torda (Bgt. I. c., Ercsei I. c., Freyn 129)

669. **L. corniculatus** L. — Frequens, in formis pluribus : **a. arvensis** (Pers.) Ser., **b. ciliatus** Koch — Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 149, Ujv. Kv. 661), Szszt.miklós (Pr. ap. Ny. Kv. 322), M.vásárh. (Ny. Mv. 60) — **c. hirsutus** Koch — Kv. Szénafű (Soó I. c.), Torda (Schur VSV. X. 78)

ssp. tenuifolius (L.) Hartm. — In pratis salinis frequens. (cf. Schur VSV. X. 78, 97, 112, En. 160, Freyn 129, Simk. En. 185, Wolff 58, Hayek 466—7, Szakmáry 120, Soó GM. 100, in Gr. 250, Consp. 29—30, 32—4, 44—5, 50—1, 55, Pr. MBL. V. 31, Cp. 140, Bujor. BCI. XIV. 227, Ny. Kv. 322, EM. 112, Pr. Fl. II. 295—8, 340, 342, Hg. II. 70, Priszter 87, FEH. 372, Borza FER. 57 etc. — etiam K.borsa, Vszt.gothárd-Feketelak!)

670. **Galega officinalis** L. — Kv. Szénafű, Melegv., Fejérd, Kajántó (Soó GM. 96, Ny. Kv. 323, Richt., Bélteki ap. Ny. I. c.), Szamosfa-Apahida (Richt., Ny., Soó Kv. 322, Priszter I. c.), K.borsa, Bonchida, Szék(!), Kolozs, K.bós, Berkenyes, Virágosv. (Freyn 129), Torda (Ercsei 59), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 72)

671. **Robinia pseudoacacia** L. — Subspontanea, frequens.

672. **Astragalus exscapus** L. **ssp. transsilvanicus** (Barth) A. et G. — (AGH. V. 160), Egerbegy-Gerend (Barth ap. Schur VNVBrünn XV. 184, FEAH. 2813, Ny. FER. 1278, Wolff 58, Barabás, Göth ap. Soó AGH. I. c.), Katona-Kiscég (Janka ÖBZ. XVIII. 232)

673. **A. dasyanthus** Pall. — Kv. (Wolff ap. Schur En. 164, false), Kolozs (Freyn 129), Kolozs-Torda (Janka I. c. 267), Torda (Wolff ap. Janka 564, MNL. I. 58, Sebők 46), Gerend (Ercsei 24), M.szovát (Péterfi MBL. XVII. 59, FER. 157, Pop Guide 165, Ny. Kv. 324, Pr. Cp. 147, Fl. I. 536, II. 212), Szék (Soó 111, Kv. 661), M.szava-Vszt.egyed (Soó 111), Mócs, Novaly, M.záh, Csehtelke, Vszt.gothárd-Pujon (Janka MTK. XII. 187), M.kók, A.gyéres (Simk. En. 189), Báld (Pr. FK. 1914. 313, Cp. 146), Szabéd (Szakmáry 120), M.vásárh. (Ny. Mv. 68, Pr. Cp. 96, 107)

674. **A. cicer** L. — Kv. Szénafű (Soó Kv. 324, 661, Györffy ap. Ny. Kv. 324), Kolozs, Berkenyes, Virágosv. (Freyn 129), K.bós (Ny. I. c.)

675. **A. glycyphyllos** L. — (EK. 283) — Kv. Szénafű, Fejérd, Szújvár, F.mikola, Bonchida-Szék, Sz.Jenő, Iklód, Pujon, Cege, Vszt.gothárd, Feketelak, M.szilvás, Báld, M.vásárh.

676. **A. monspessulanus** L. (incl. *praecox* Baumg.) — Kv. Szénafű, Melegv., Fejérd (Bgt. II. 362, Soó GM. 87, 90, 99, AGH. V. 144—150, Pr. Cp. 95—6, 135, 142, Meusel 301, auct. multi ap. Ny. Kv. 323), K.borsa-Válaszút (Soó AGH. V. 144), Kecsed, Tötör-Moró (Hg. I. 127), Apahida (Pr. Cp. 142—3, Ny. — Pop FER. 568, Soó I. c.), Apahida-Kályán (Soó 111), Kolozs (Hayek 465), Dezmér (Ny. Kv. 323), Kolozs, K.bós, Berkenyes, Virágosv. (Freyn 129), Torda (Ercsei 24, Sebők 38), Szt.mihályfa, A.gyéres, M.csán, M.záh (Simk. En. 189), Szújvár (K. et O. 5 sub *A. incurvata*), M.szovát (Péterfi MBL. XVII. 59, Pop, Borza Guide 165, 207), Vszt.gothárd (Janka 564), Bonchida, Szék, Iklód, Pujon, Ombozelke, Vszt.gothárd-Feketelak (Soó 111), Mócs, Kékes, Sz.enes (Pr. Cp. 92—4), M.bánd (Pr. Cp. 153), Szabéd-M.fele (Szakmáry 120, Ny. FEH. 768), Mojos, Bazéd (Lengy. ap. Soó 111), M.vásárh. (Ny. Mv. 67)

677. **A. asper** Wulf — Kv. Szénafű, Melegv. (Bgt. II. 321, Schur VSV. X. 98, Andrae Bot. Ztg. XIV. 442, Winkler 50, Hayek 466, Soó GM. 90, 99, AGH. V. 148, Pr. Cp. 135, Péterfi FER. 159, auct. multi ap. Ny. Kv. 324), Apahida, (Borb. ap. Ny. I. c.) Vszt.gothárd (Janka MTK. XII. 187), M.záh (Pr. Cp. 93, 146), Virágosv. (Freyn 129), Egerbegy (Barabás ap. Simk. En. 188), Gerend (Wolff 58), Torda (Ercsei 24, Wolff 58)

678. **A. Péterpii** Játv. — (AGH. V. 150) — M.szovát-M.gyéres (Péterfi FEH. 363, MBL. XVII. 59, Péterfi et.Pr. FER. 160, Pr. Cp. 147, Pop Guide 165, Borza Guide 207, Ny. Kv. 324, ap. Soó AGH. V. 160)

679. **A. austriacus** Jacq. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 98, Hayek 466, Soó GM. 99 olim?), Apahida (Soó 111), M.szovát (Péterfi MBL. XVII. 59, Pop I. c., Borza I. c., Pr. Fl. II. 212), Egerbegy, M.záh (Simk. En. 188, Pr. Cp. 146) — cf. Ny. Kv. 325 — Mócs (Pr. Cp. 94), Báld (Pr. FK. 1914. 313, Cp. 146), Szabéd (Szakmáry 120, Lengy. ap. Soó 111), Gerend, Kislekence (Ny. ap. Soó 111)

680. **A. vesicarius** L. **ssp. albidus** (W. et K.) Beck p. var. (AGH. II. 94) — Kv. Szénafű „Kúphegy“ (Joó-ap. Schur VSV. II. 167, X. 98, Landoz EM. II. 28, Andrae VSV. IV. 164, Hayek 466, Soó GM. 90, Pr. Cp. 99, Péterfi, Pr. FER. 158, auct. multi ap. Ny. Kv. 325, ap. Prod.), Gerend (Ercsei 24, Wolff 58), Egerbegy (Simk. En. 188), Torda (Wolff I. c.), Vszt.gothárd (Janka 564)

681. **A. onobrychis** L. — Kv. Szénafű (Soó GM. 90, 98, Kv. 325 cum *f. major* DC., Ny. Kv. 325, Ujv. Kv. 661, Bélteki ap. Ny. I. c.), K.bós (Freyn 129), Pujon, Ombozelke (Soó 111), Szabéd (Lengy. ap. Soó 111)

681a. **Oxytropis pilosa** (L.) DC. — Kv. Szénafű (Bgt. I. 357, Schur VSV. X. 98, Soó GM. 90, 98, AGH. V. 146—8, Kv. 661, Pr. Cp. 134—5, 142, auct. multi ap. Ny. Kv. 325, Meusel 301, Péterfi FER. 1497), Apahida (Hayek 465, Pr. ap. Ny. I. c.), A.zsuk (Ny. I. c.), Kolozs (!Freyn 129), K.bós (Freyn et Ny. I. c.), K.borsa-Válaszút (Soó AGH. V. 144), M.szovát (Pop Guide 165, Pr. Fl. II. 212), Vszt.gothárd (Janka MTK. XII. 187), Fejérd, Bonchida-Kisiklód, Pujon, Vszt.gothárd-Feketelak (Soó 111), Szújvár(!), Báld (Pr. FK. 1914. 313, Cp. 146),

Szabéd (Lengy. ap. Soó 111), Faragó-Körtekapu (Ny. ap. Soó 111), Gerend (Wolff 58), Torda (Ercsei 24, Winkler 48)

682. *Coronilla varia* L. — Frequens. — *lus. alba* Pluskal Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 157)

Ornithopus perpusillus L. — Kv. Szénafű (Bgt. II. 367)?, adventiva?

683. *Onobrychis viciaefolia* Scop. — Frequens, etiam culta et subspontanea.

f. glabrescens Beck : *calvescens* Schur — Kv. Szénafű (Soó Kv. 327)

684. *O. arenaria* (Kit.) DC. — Kv. Szénafű (Simk. MNL. III. 51, Soó GM. 87, 90, AGH. V. 149, Kv. 661, Meusel 201, auct. plures ap. Ny. Kv. 327), Apahida (Schur En. 327, Soó AGH. V. 144, Ny. I. c.), Apahida-Kályán, Fejér, K.borsa-Válaszút, Bonchida-K.iklód-Szék(!) Kolozs (Schur I. c.), K.bós (Ny. I. c.), M.szovát (Borza Guide 207), Doboka-Moró (Hg. I. 129), M.vásárh. (Ny. Mv. 67)

685. *Vicia hirsuta* (L.) Grey — Kv. Szénafű, Melegv. (Pr. Cp. 137, Soó Kv. 661), Szamosfa, Apahida (Ny. Soó Kv. 329, 661, Cp. 46, Priszter 87), K.borsa(!), Torda (Ercsei 64), M.vásárh. (Ny. Mv. 67)

686. *V. tetrasperma* (L.) Schreb. — Frequens.

687. *V. silvatica* L. — (EK. 283) — Fejér, Apahida, Aranykút, Berkenyes, M.szilvás, Bala-N.ercse. — Torda (Ercsei 18)?

688. *V. pisiformis* L. — (EK. 283) — Ajton, P.kamarás, Egerbegy, Báld. — M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. Suppl. 32)

689. *V. dumetorum* L. — (EK. 283) — Fejér, Kolozs, Berkenyes, Iklód, N.sármás, Báld, Bazéd, Bádok-Doboka. — Torda (Ercsei 17)

690. *V. cassubica* L. — (EK. 283) — Kolozs, Cege, Szabéd, Báld. — Kékes (Prod. ap. Ny. Scr. BMT. I. 111), Torda (Ercsei 18)

691. *V. eracea* L. — Frequens, in formis multis : *a. vulgaris* Neilr., *b. latifolia* Neilr., *c. linearis* (Peterm.) Koch. — *d. (tr.) transiens* Soó — Fejér, Pujon (Soó 112)

ssp. tenuifolia (Roth) Gaud. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 97, auct. p. ap. Ny. Kv. 331, Soó Kv. 331), Apahida (Ny. I. c.), Szu.németi (Hg. III. 130), Feketelak (Soó 112), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 74)

692. *V. villosa* Roth — Kv. Szénafű (Soó, Ny. Kv. 331 cf. Pr. Cp. 166), Apahida (Soó I. c.) -Sz.újvár (Pr. I. c.), M.örményes (Ny. ap. Pr. 168), Kékes, M.ludas (Pr. Cp. 165—6), Torda (Ercsei 18), M.vásárh. (Ny. Mv. 67)

ssp. glabreseens (Koch) Soó (*V. pseudovillosa* Schur) — Apahida (Soó BK. XXII. 72), Bonchida (Soó 112)

693. *V. lathyroides* L. — B.váralja (Hg. III. 126)

694. *V. pannonica* Cr. — Frequens. — *b. angustifolia* Borb. — Kv. Szénafű (Soó Kv. 327)

ssp. striata (M.B.) Hay. — Kv. (Pr. Cp. 166), Szszt.miklós-Apahida(!), Apahida-Sz.újvár (Pr. I. c.), M.vásárh., Mszt.györgy (Ny. ap. Soó Szf. 74, Suppl. 32)

695. *V. sordida* W. et K. — Mezőség (Bgt. I. 339) : Kv. Szénafű (Pr. Cp. 142), Torda (Ercsei 18), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Ser. I. 46) — *b. Biebersteinii* (Bess.) Borb. — Mezőség (Bgt. I. c. 340)

696. *V. sepium* L. — (EK. 283) — Kv. Szénafű, Fejér, Szamosfa-Apahida, Ajton, Sz.újvár, Kolozs, Korpád, Bonchida, Iklód, Szék, Cege etc. — Báld-Sármás (Pr. FK. 1913. 313, Pr. 78), Kékes (Pr. Cp. 165), B.váralja (Hg. III. 126), Torda (Ercsei 18)

697. *V. sativa* L. — Culta et subspontanea — *b. linearis* Lange — Apahida (Ny. Kv. 328)

ssp. angustifolia (Grufbg.) Gaud. *a. Bobartii* Koch et *b. segetalis* (Thuill.) Koch frequentes, prior rarius : Kv. Melegv. (Ny. Kv. 328, Soó Kv. 661, Consp. 56), Szamosfa (Soó I. c. 44—6, Priszter 87), Dezmér (Pr. Fl. II. 456), Apahida, Ajton (Ny. I. c.), K.borsa, Bonchida(!), Tötör-Moró (Hg. I. 128), B.váralja (Hg. III. 129)

Delenda : *V. serratifolia* Jacq. — Kv. Szénafű (Pr. Cp. 142)

698. *Lathyrus aphaea* L. — Kv. Szénafű (Pr. Cp. 137, Ny. Kv. 331), Dezmér (Pr. Fl. II. 456), Apahida (Soó BK. XXV. 144 ad *b. affinis* (Guss.) Ces. verg. (Ujv. Kv. 661), Kékes, M.örményes (Pr. Cp. 165, 168), Fejér, K.borsa, Szék(!), Gyulatelke (Morariu 191), Vszt.gothárd (!Janka 564), Sz.lekence, Dengeleg (Lengy.), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 74)

699. *L. nissolia* L. — Kv. Szénafű (Bgt. II. 331), Kajántó (Soó Kv. 661), Szamosfa (Landoz EM. II. 29, Bélteki ap. Ny. Kv. 331), Torda-Sósf. (Wolff 58), B.váralja (Hg. III. 128) — *b. gramineus* (Kern.) A. et G. — Apahida-K.kara (Szabó ap. Ny. Kv. 331), Torda (Borza FER. 1980)

700. *L. hirsutus* L. — Kv. Szénafű (Bgt. II. 332, Soó Kv. 332), Szamosfa-Apahida (auct. pl. ap. Ny. Kv. 332, Soó I. c.), Szék, Cege, Vszt.gothárd(!), Virágosv. (Freyn 130), Sz.kocsárd (Simk. En. 196), M.ludas, M.örményes (Pr. Cp. 166—8), M.vásárh. (Ny. Mv. 66 *b. acirrhosus* (Schur)

701. *L. paluster* L. — Vszt.gothárd (Soó 112), Egerszeg pr., M.vásárh. (Barth 109) ad fines terr. etiam pr. Kv. (Borb., Richt. ap. Soó BK. XXIII. 149)

702. *L. tuberosus* L. — Frequens.

703. *L. pratensis* L. — Frequens.

704. *L. Hallersteinii* Baumg. — Ajton-Rőd (Freyn 130, cf. Ny. Kv. 332), Torda (Wolff 58), nec in Szénafű (uti Hayek 466 addit) — *b. (tr. ad sp. praecedentem) longipedunculatus* Nyár. — F.mikola (Soó ap. Ny. Kv. 661), Sz.jenő (Soó 112)

705. *L. silvester* L. *b. platyphyllus* (Retz.) Asch. — Fejér (Soó BK. XII. 72, GM. 83, Kv. 333), Kolozs (Freyn 130), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. Suppl. 33)

706. *L. latifolius* L. — (EK. 283) — Kv. Szénafű, K.bós, Cege, Ombozelke-,Vszt.gothárd (vulgo *b. brachypterus* (Alef.) Beck) — Torda (Wolff 58)

707. *L. pallescens* (M. B.) C. Koch — Kv. Szénafű, Melegv. (Kovács in Sternheim 29, Schur VSV. X. 98, Janka 565, Barth 109, Hayek 466, Soó GM. 88, 90, Kv. 661, Pr. Cp. 132—7, Borza-Péterfi FER. 161, auct. multi ap. Ny. Kv. 333, Ujv. Kv. 661, cf. Brassai EM. III. 110), Apahida (Pr., Ny. I. c.), Kolozs-K.bós (Ny. I. c.), Virágosv. (Freyn 130), M.záh (Janka ap. Simk. En. 198) — *b. nudus* Nyár. — Kv. Szénafű (Wolff, Szentpétery ap. Ny. I. c.)

708. *L. pannonicus* (Kramer) Garcke — Kv. Szénafű (Andraeae Bot. Ztg. XI. 443 sub „*Or. albo*“, ap. Javorka BK. XV. 14, Wolff, Zsák ap. Ny. Kv. 334, Soó Kv. 338) cum transitis ad ssp. (cf. Ny. I. c.)

ssp. *collinus* (Ortmann) Soó. (*L. versicolor* auct. — non Gm.) — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 97, En. 173, Pr. Cp. 95, 132, 135, Soó GM. 99, AGH. V. 145, 148—9, auct. multi ap. Sirjaev Bull. assoc. Russe V. 256 et Ny. Kv. 334), Apahida (Pr. Cp. 142, Ny. I. c.), Kolozs, K.bós, Virágosv. (Freyn 130), Kecsed (Hg. I. 126), Iklód, Szék (Soó 112), Mojos, Szabéd (Lengy. ap. Soó 112), Gerend (Barth 109), Torda (Bgt. ap. Fuss VSV. XV. 121)

709. *L. niger* (L.) Bernh. — (EK. 283) — Kv. Szénafű, Fejérd, Dezmér, Kolozs, Apahida, Kályán, Korpád, Ajton, Sz.újvár, F.mikola, B.váralja, Szu.németi, Bonchida-Szék, Sz.jenő, Iklód, Szék, Vszt.-egyed, Pujon, Cege, Feketelak, Vszt.gothárd, M.szilvás, N.sármás, Báld, P.kamarás, Teke, Kékes, M.vásárh., Bátok-Doboka-Moró. — Dés (Czetz 18), Torda (Ercsei 93)

710. *L. vernus* (L.) Bernh. — (EK. 283) — Kv. Szénafű, Fejérd, Apahida, Dezmér, Kolozs, Sz.újvár, F.mikola, B.váralja, Szu.németi, Coptelke, Szék, Sz.jenő, Iklód, Szék-Vszt.egyed, Pujon, Vszt.gothárd, Kályán, Korpád, M.szilvás, Báld, Teke, Kékes, Berkenyes, G.keresztúr, M.vásárh., Bátok-Doboka-Moró-Tötör. — Torda (Ercsei 93)

Dubiae. *L. transsilvanicus* (Spr.) Rchb. — Ad limites: Torda (Ercsei 93, sub *L. laevigata*, Simk. En. 199, Bgt. II. 329) — *L. laevigatus* (W. et K.) Fritsch — Kv. Szénafű (Wolff ex Schur ÖBZ. X. 324)

711. *Pisum arvense* L. = *P. sativum* L. ssp. *arvense* A. et G. — Kv., Szamosfa, Apahida (Soó GM. 115, Ny. Kv. 336, Ujv. Kv. 661, Priszter 87), K.borsa(!), Tötör-Moró (Hg. I. 128 sub „*P. salivo*“), Sz.újvár (Pr. Cp. 166), M.vásárh. (Ny. Mv. 62), Torda (Soó Bot. Arch. XIX. 354)

ssp. *elatius* (M. B.) A. et G. — M.vásárh. (Ny. ap. Soó Ser. I. 46)

Geraniaceae.

712. *Geranium phaeum* L. — (EK. 283) — Kv. Szénafű(?), Sz.újvár, B.váralja, Szu.németi, Szék, Cege, Vszt.gothárd, Bátok-Doboka. — Torda (Ercsei 62)

713. *G. Robertianum* L. — Sz.újvár, F.mikola, B.váralja, Bonchida, Cege, Vszt.gothárd, P.kamarás, N.sármás, Kékes, Gyek-Sármás, Mojos, M.vásárh., Bátok-Doboka. — Torda (Ercsei 63)

714. *G. divaricatum* Ehrh. — Torda (Bgt. II. 293, Ercsei 63, Schur VSV. X. 78), M.vásárh. (Ny. Mv. 69)

715. *G. columbinum* L. — Kv. Szénafű (Bélteki, Ny. Kv. 339), N.sármás-Báld (Pr. FK. 1914. 313), Kékes, Buza (Pr. ap. Pantu Mem. Sect. Stüntif. VIII. 91), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 75), Torda (Ercsei 63)

716. *G. dissectum* Jusl. — Kv. Szénafű (Pr. Fl. II. 456), Sz.lekence M.bánd (Lengy.), Torda (Ercsei 63), Kékes (Pr. ap. Pantu I. c. 86)

717. *G. pusillum* Burm. — Frequens.

718. *G. sanguineum* L. — Frequens.

719. *G. palustre* Torner — (EK. 284) — Kv. Szénafű, Fejérd, F.mikola, Bonchida, Szék, M.vásárh., Bátok-Doboka. — Torda (Ercsei 63)

720. *G. pratense* L. — Frequens.

Delenda : *G. rotundifolium* L. — Kv. Szénafű (Pr. Cp. 142), Torda (Ercsei 63)

G. collinum Steph. — P.kamarás, Tóhát, M.záh (Janka 561)

721. *Erodium cicutarium* (L.) L'Hérit. — Frequens, in formis multis (cf. Ny. Kv. 336) — *f. bulbosum* Prod. — Sz.újvár-Hesdát (Pr. Fl. I. 570)

Delenda : *E. serolinum* Stev. — Faragó (Janka 561)

Oxalidaceae.

722. *Oxalis acetosella* L. — Bonchida, Vszt.gothárd (Soó 112, adventiva?), F.mikola (Hg. II. 65), B.váralja, Szu.németi, Coptelke (Hg. III. 127—30)

723. *O. stricta* L. — Adventiva : Bonchida, Cege (Soó 112), Kolozs (*f. ramosissima* Schur En. 140), Szamosfa-Apahida (!Priszter 88)

Linaceae.

724. *Linum catharticum* L. — Frequens. — Rarius ad *b. subaplinum* Hausskn. verg. Kv. Szénafű (Soó Kv. 661)

725. *L. flavum* L. — (saepius *b. angustifolium* Jav.) — Kv. Szénafű (Bgt. I. 273, Schur VSV. X. 86, Hayek 466, Soó GM. 88, 90, BK. XXIII. 149, AGH. V. 146, Pr. Cp. 134, 141, auct. multi ap. Ny. 340, Meusel 300), Melegv. (Soó Kv. 661), Szamosfa (Péterfi FER. 973a), Apahida (Ny. Kv. 340, Soó AGH. V. 144, Ujv. Kv. 661), Dezmér (Soó), Kolozs, K.bós (Freyn 124, N.y I. c.), Berkenyes, Virágosv. (Freyn 124), Torda (Ercsei 94, Freyn 124), K.borsa, Válaszút (Soó AGH. I. c.), Kecsed (Hg. I. 126—7), Fejérd, Telekfarka-Apahida, Apahida-Kályán, Bonchida-Iklód, Szék, Szék-Cege, Pujon, Ombozelke, Vszt.gothárd, Feketelak (Soó 112), Sz.újvár (K. et O. 27, Soó AGH. I. c., Hg. II. 68), Kékes, A.sztmiklós, M.záh, Sz.enes (Pr. Cp. 92—4), Báld (Pr. Fk. 1914. 313, Pr. Cp. 146), Szabéd (Szakmáry 120, Lengy. ap. Soó 112), M.vásárh. (Ny. Mv. 70) — *f. degeneratum* Nyár. Kv. Szénafű (Ny. Kv. 341) — *c. hungaricum* (Podp.) Gräbn. — Kv. Szénafű (Soó GM. 98, BK. XXIII. 149, Kv. 661), Sz.újvár (Hg. II. 69 ad typum verg.), K.borsa(!)

726. *L. hirsutum* L. (*v. angustifolium* Led.) — Kv. Szénafű (Soó BK. XXV. 144, GM. 88, 90 et lus. *albiflorum* Schur, Pr. Cp. 141, auct. plures ap. Ny. Kv. 341), Szamosfa (Péterfi FER. 970), Apahida (Ny. I. c., Soó AGH. V. 145), Kolozs (Richt. ap. Ny. I. c., Freyn 124), Dezmér(!), K.bós, Berkenyes, Virágosv. (Freyn 124), Torda (Ercsei 97, Freyn 124), Gerend (Simk. En. 150, Ny. ap. Soó 112), Apahida-K.kara, Iklód, Szék, M.szava (Soó 112), M.szovát, M.gyéres (Péterfi MBL. XVII. 59), Sz.újvár, Désakna (Hg. II. 68, 71), Kecsed (Hg. I. 126—7), Kékes, A.sztmiklós, Sz.enes (Pr. Cp. 92—4), Mojos (Lengy. ap. Soó 112), M.kece (Ny. ap. Soó 112)

727. *L. nervosum* W. et K. — Kv. Szénafű (Bgt. I. 271, Schur VSV. X. 86, Soó GM. 90, Pr. Cp. 96, 134—8, Ny. — Gürtler FER. 430, Ghisa BCL. XXI. 62, auct. multi ap. Ny. Kv. 341), A.zsuk (Ny. Kv. 341), Apahida (Barth 108), Kolozs (Bgt. I. c., Barth 108, Freyn 124), K.bós (Freyn 124, Ny. I. c.), Virágosv. (Freyn 124), Torda (Bgt. I. c., Ercsei 94, Wolff 57, FEAH. 2462, Freyn 124), M.szovát, M.gyéres (Péterfi MBL. XVII. 59), Iklód (Soó 112), Gerend (Wolff 57), Báld (Pr. Cp. 146, FK. 1914. 313), M.záh (Pr. Cp. 93)

728. *L. tenuifolium* L. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 86, Hayek 466, Soó GM. 92, 98, AGH. V. 146, Hayek 466, Pr. Cp. 140, Meusel 300, Ny. Kv. 341), Apahida (Ny. FER. 432b, Soó Kv. 661), Kolozs, K.bós, Berkenyes, Ajton, Virágosv., Torda (Freyn 124), K.borsa(!), Fejér, Telekfarka-Apahida, Apahida-K.kara-Kályán, Bonchida-Iklód, Pujon, Ombozelke (Soó 112), Sz.újvár (K. et O. 16, Pr. Cp. 118), Kékes, Sz.éncs (Pr. Cp. 92, 94), Budatölke (Pr. Cp. 145), Szabéd (Lengy. ap. Soó 112)

729. *L. austriacum* L. — Frequens. — **b. squamulosum** (Rudolphii) Boiss — Kv. Szénafű (Simk. En. 152, Soó Ny. Kv. 342), Kolozs, K.bós, Berkenyes, Virágosv. (Freyn ÖBZ. XXVI. 228), Mezőség (Janka 561)

730. *L. perenne* L. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 86, Soó GM. 87, Pr. Cp. 134, 138, 141, auct. plures ap. Ny. Kv. 342), A.zsuk (Ny. I. c.), K.borsa(!), Kolozs (Barth 108), Torda (Schur VSV. X. 78, Hayek 467), Kékes (Pr. Cp. 92) — **b. lasiopetalum** Schur — Kv. Szénafű (Schur En. 128) — **e. pseudoaustriacum** Nyár. — Kv. Szénafű (Ujv. Kv. 661 cf. Ny. I. c.)

L. ustitatissimum L. — Subspont. : Szamosfa-Apahida (Priszter 88), Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 86 culta?)

Rutaceae.

731. *Dietamus albus* L. — Kv. Szénafű (Soó GM. 90, AGH. V. 145—6, Kv. 661 auct. multi ap. Ny. Kv. 343), Apahida (Ny. I. c.), Kolozs (Hayek 465), A.zsuk (Ny. I. c., Pr. Cp. 152), Kolozs, K.bós (Freyn 123), Torda (Ercsei 46, Freyn 123), Gerend, M.záh (Ercsei 46), Fejér, Telekfarka, Szék (Soó 112), Sz.újvár (K. et O. 10, Pr. Cp. 118), Szu.németi (Hg. III. 130), Désakna (Hg. II. 71), Kékes, M.záh, Sz.éncs (Pr. Cp. 92—4), Báld (Pr. FK. 1914. 313), Szabéd (Szakmáry 120), Lengy. ap. Soó 112), Mojos, Bazéd (Lengy. I. c.), M.vásárh. (Ny. Mv. 70, ap. Pr. Cp. 96) — **b. caucasicus** (Fisch. et Mey.) Boiss. — Kv. Szénafű (Soó BK. XXII. 72), Apahida (Pr. ap. Ny. Kv. 343), Kályán (Janka 562), Fejér (Ujv. Kv. 661 sub *laevistyllo*)

Polygalaceae.

732. *Polygala major* Jacq. — Frequens. — **b. grandiflora** Chodat — Kv. Szénafű (Soó BK. XXV. 144), Torda (Sagorski in A. et G. Syn. VII. 327) — **c. minor** Schur (*neglecta* (Kern.) Borb.) — Kv. Szénafű, Apahida (Soó Kv. 661) — *lus. albiflora* Bgt. Kv. Szénafű (Priszter 91)

733. **P. eomosa** Schkuhr — Frequens. — **b. litigiosa** Legrand Kecsed, Doboka-Moró (Hg. I. 126, 129 anne huc pertinet *P. vulgaris* auct. e Mezőség p. maj. p.?) — **c. podolica** DC. — Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 140, GM. 87, Pr. Cp. 134, Ujv. Kv. 661), Dezmér, Ajton (Ny. Kv. 344), — etiam *f. strictiuscula* Wol. et *lus. lilacina* Borb. Kv. Szénafű (Ny. I. c.)

734. *P. vulgaris* L. — Kolozs, K.bós (Freyn 122)? — nam Freyn *P. comosam* non enumerat — Ajton (Ny. I. c.), Torda (Ercsei 38, Freyn 122), Sz.újvár (K. et O. 19, Pr. Cp. 118), B.váralja (Hg. III. 126), Buza (Pr. Cp. 145)

Euphorbiaceae.

735. *Mercurialis perennis* L. — (EK. 284) — Kv. Szénafű, Fejér, Dezmér, Bonchida, Szék, Pujon, Vszt.egyed, B.váralja, Szu.németi, Kékes, Bánok-Doboka. — Dés (Czetz 17)

736. *M. ovata* Sternbg. et Hoppe — Kv. Szénafű (Bgt. III. 344, Andrae BZ. XIII. 915, Schur VSV. X. 107, Landoz EM. II. 36, Winkler 50, Soó 85, 90, AGH. V. 148, Ny. FER. 1521, auct. multi ap. Ny. Kv. 345, Hg. Kv. 662, Ghisa BCL. XXI. 62), A.zsuk, Dezmér-Apahida (Ny. I. c.), Kolozs, K.bós, Virágosv. (Freyn 123), Tötör-Moró (Hg. I. 127), K.borsa(!) — **b. longistipes** Borb. — F.mikola (Hg. II. 66)

Dubia : *Mercurialis annua* L. — Kv. (Schur VSV. X. 107 : Szénafű?)

737. *Euphorbia platyphylla* L. — Frequens. — **b. literata** (Jacq.) Koch — Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 149)

738. *E. striata* L. — Kv. Szénafű (Pr. Cp. 168, Borb. ap. Ny. Kv. 346) an vero?, F.mikola (Hg. II. 66)

739. *E. polychroma* Kern. (EK. 284) — Kv. Szénafű, Fejér, Dezmér, Kolozs, K.bós, Bonchida-Szék, Sz.jenő, Iklód, F.mikola, P.kamarás, Teke, Mojos, Szabéd, M.vásárh. — Torda (Ercsei 58, Freyn 123)

740. *E. angulata* Jacq. — (EK. 284) — Kv. Szénafű, Fejér, Dezmér, Korpád, Kolozs, K.bós, Ajton, Bonchida-Szék, Iklód, Szék, Cege-Pujon, Feketelak, Mojos, Bala, M.panit, M.vásárh.

741. *E. helioscopia* L. — Frequens.

742. *E. villosa* W. et K. — Kv. Szénafű, Fejér (Winkler 50, Soó GM. 93, 96, Pr. Cp. 96, 167—8, Meusel 301, auct. plures ap. Ny. Kv. 347, Ujv. Kv. 662, Ghisa BCL. XXI. 62), A.zsuk (Ny. I. c.), M.szovát (Péterfi MBL. XVII. 59, Pop Guide 165), Sz.jenő, Szék, Cege, Feketelak (Soó 112), M.ludas (Pr. Cp. 165), K.borsa(!) in formis multis, cf. Ny. I. c., Torda (Ercsei 13)

742a. *E. palustris* L. — Dés-Sz.újvár (Pr. Fl. II. 340), Torda (Ercsei 58)

743. *E. Seguieriana* Necker — Torda (Wolff MNL. I. 65, Sebők 37), M.szovát, M.gyéres (Péterfi MBL. XVII. 59, Borza Guide 207, Pr. Fl. II. 212), Gerend (Wolff I. c.)

743a. *E. glareosa* MB. — Ad limites : Torda (Ercsei 58), Felvinc (Barth 115)

744. *E. amygdaloides* L. — (EK. 284) — Fejér, Dezmér, Apahida, Kolozs, Sz.újvár, F.mikola, B.váralja, Szu.németi, Coptelke, Bonchida-Szék, Vszt.gothárd, Kályán, Korpád, M.ménes, P.kamarás, M.bánd, M.vásárh. — Bádok-Doboka-Moró. — Torda (Ercsei 58)

745. *E. salicifolia* Host — Frequens. — *f. (status) Schurii* Simk. — Kv. Szénafű (Soó Kv. 348), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. Suppl. 34), K.borsa, Bonchida(!)

746. *E. cyparissias* L. — Frequens. — *b. serotina* Schur — Kv. Szénafű (Ny. Kv. 351), Bonchida-Szék, Kályán (Soó 112)

747. *E. esula* L. — Kv. Szénafű (Soó, Ny. Kv. 351), A.zsuk, Szamosfa-Apahida (Ny. I. c.), Kolozs, K.bós, Virágosv. (Freyn 123), Sz.újvár (K. et O. 11), Torda (Ercsei 58, Wolff 65)

748. *E. virgata* W. et K. — Frequens. — *b. pseudovirgata* Schur Szamosfa (Butujás ap. Ny. Kv. 352 sub „*latibasis* Nyár.“)

749. *E. exigua* L. — Frequens. — *b. truncata* Koch (*retusa* L.?) Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 149)

750. *E. faleata* L. — Frequens. — *b. acuminata* (Lam.) St. Am. — Mezőség (Schur En. 599) : Mócs (Pr. MBL. XII. 126, Pr. Cp. 94), Torda (Simk. MNL. II. 152)

751. *E. peplus* L. — Dengeleg (Lengy.), Torda (Ercsei 58)?

752. *E. esula* × *salicifolia* (*E. paradoxa* Schur) resp. *E. esula* var. *villosa* Roch — Kv. Szénafű (Schur En. 596, Soó BK. XXII. 66, Kv. 662), M.vásárh. (Ny. Mv. 73)

753. *E. virgata* × *salicifolia* (*E. angustata* (Rochel)) — M.vásárh. (Barabás ap. Wagner TTK. Pótf. 1900. 47)*

Dubia : *E. agraria* MB. — Mezőség (Janka ÖBZ. V. 230), Kv. (Schur 597, Pr. BAcad. Agr. I. s. 4, Fl. I. 59)

Callitrichaceae.

754. *Callitrichie palustris* L. — Kv. Szénafű (Ny. Kv. 353 f. *jontana* Rehb., Soó Arch. Biol. Hung. XVII. 97), Torda (Ercsei 107)

C. sp. sterilis (? *C. polymorpha* Lönnr.) — Ajton (Ny. I. c.), Dezmér, F.mikola (Soó)

Celastraceae.

755. *Evonymus verrucosus* Scop. — (EK. 269) — Kv. Szénafű, Fejér, Dezmér, Sz.újvár, F.mikola, Bonchida-Szék, B.váralja, M.szilvás, N.sármás, Báld, P.kamarás, M.ménes, Berkenyes, M.bánd, M.vásárh., Vszt.iván, Bádok-Doboka.

756. *E. europaeus* L. — Frequens. (*E. latifolius* Borza BCl. VIII. 23 : P.kamarás certe hoc pertinet.)

Staphyleaceae.

757. *Staphylea pinnata* L. — (EK. 269) — In silvis fere omnibus, cf. Soó I. c., F. et Bl. 691. — Torda (Wolff 58)

* Quid sit *E. juculi* (*virgata* × *esula*) Prod. Fl. I. 595 : „La jue“?

Aceraceae.

758. *Acer tataricum* L. — (EK. 269) — In silvis fere omnibus, cf. Soó I. c., F. et Bl. 690. — Torda (Ercsei 173)

759. *A. platanoides* L. — Fejér (Soó Kv. 662), M.szilvás (Borza BCl. VIII. 17), Kissármás, M.lekence (F. et Bl. 690), K.borsa „Órhegy“(!), Dés (Czetz 10), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. Suppl. 34)

760. *A. pseudoplatanus* L. — Fejér (Soó Kv. 622), Sz.újvár (Pr. Cp. 100, Soó 101), Szu.németi (K. et O. 1), B.váralja, Coptelke (Hg. III. 128—9), Sz.jenő (Soó 101), Szék, M.szengyel (F. et Bl. 690), K.borsa, „Órhegy“(!), Bádok-Doboka, Moró-Tötör (Hg. I. 127—9), Torda (Ercsei 172)?, Dés (Czetz I. c.)

761. *A. campestre* L. — (EK. 1947. 55) — In silvis fere omnibus (*ssp. leiocarpum* (Opiz) Pax) — *b. austriacum* (Tratt) DC. — Apahida (Ny. Kv. 355) — *c. trifidum* Borb. — F.mikola (Hg. II. 65)

Balsaminaceae.

762. *Impatiens noli-tangere* L. — Bonchida (Soó 112), Gerend (Ercsei 48), Torda (Wolff 58, Sebők 43)

763. *I. glandulifera* Royle (*I. Roylei* Walpers) Subspont. — Szamosfa-Apahida (Priszter 88, cf. Soó XXII. 72, Bot. Archiv 1927. XIX. 357, GM. 114)

Rhamnaceae.

764. *Rhamnus catharticus* L. — (EK. 270) — Kv. Szénafű, Fejér, Kv.-Apahida, Dezmér, Kolozs, Berkenyes, Apahida-Kályán, Sz.jenő, Szék, M.ménes, Kékes, M.záh, M.vásárh. — Torda (Ercsei 21, Freyn 122) — *b. leiocephalus* Borb. — Kolozs (Soó Kv. 662)

765. *Rh. bapheoecus* Rothm. — (EK. 270) — Kv. Szénafű (et *b. valdepubens* Nyár.), Dezmér (et *e. heterocaulis* (Wierzb.) Soó), Sz.újvár, M.vásárh. — Torda (Ercsei 21, Wolff 58, Borb. Erd. Lap. 1885. 704, — *f. heterocaulis* : FER. 1718b)

766. *Frangula alnus* Mill. — (EK. 270) — Kv. Szénafű, Szamosfa, Apahida, Kolozs, Korpád, Kályán, Bonchida, Sz.jenő, Pujon, Sz.újvár, Kékes, M.vásárh.-Bádok-Doboka. — Dés (Czetz 20), Torda (Ercsei 21)

Vitaceae.

767. *Vitis silvestris* Gm. — Kv. Szamosfa-Apahida (!Priszter 88) *Parthenocissus inserta* (Kern.) Fritsch — Subspont. Kv. Szszt. miklós (Priszter I. c.)

Tiliaceae.

768. *Tilia argentea* Desf. — Kv. „Fejérdi-e.“ (Soó 113 planta glabrescens, anne hybridogena?), Kékes, Bazéd (F. et Bl. 690), cf. Wagner Kert. Akad. Közl. XII. carta geogr.

769. *T. platyphyllos* Scop. — Iklód „Hársastető“ (Soó 113), Mojos (Lengy. ap Soó 113), spontanea?

770. *T. cordata* Mill. — (EK. 1947. 55) — Kv. Fejér (Soó GM. 82, Kv. 359, Ny. Kv. 359, Ujv. Kv. 622 et *b. major* Spach), Szamosfa (Pr. Fl. II. 146), Ajton (Ny. l. c.), Moró-Tötör (Hg. I. 127), Sz.újvár (K. et O. 24, Pr. Cp. 100), Szu.németi (Hg. III. 129 —?), F.mikola (Hg. II. 65), Bonchida-Szék, Sz.jenő, Iklód, Cege-Vszt.egyed-Pujon, etc.(!), M.szilvás, Báld (Borza BCl. VIII. 17, 22), M.vásárh. (Ny.), Torda (Ercsei 150)

Malvaceae.

771. *Lavatera thuringiaca* L. — Frequens.

772. *Althaea hirsuta* L. — Kv. Szénafű (Andrae Bot. Ztg. XI. 439, Schur VSV. X. 96, Landoz EM. II. 28, Soó GM. 90, Pr. Cp. 168, Fl. II. 457, auct. plures ap. Ny. Kv. 362), Apahida (Ny. l. c.), Kolozs (Fuss Transs. 128, Freyn 121), K.bós, Virágosv. (Freyn l. c.), Nagycég (Fuss l. c.), M.kák (Simk. En. 154), Torda (Wolff 57)

773. *A. pallida* (W. et K.) Willd. (*A. biennis* (Winterl) Borb.) — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 96, Soó GM. 87, 90, 96, auct. plures ap. Ny. Kv. 362), Melegv., Dezmér-Apahida(!), Szamosfa (Soó Kv. 362), Apahida (FER. 444), Virágosv. (Freyn 121), Torda (Schur VSV. X. 78, Winkler 48, Wolff MNL. I. 57, Hayek 467), Dés (Schur l. c. 115), B.váralja (Hg. III. 125)

774. *A. officinalis* L. — Frequens.

775. *A. cannabina* L. — Kv. Szénafű (Bgt. II. 297, Andrae Bot. Ztg. XI. 439, Soó GM. 90, Wolff, Györffy ap. Ny. Kv. 362), Fejér(!), Kolozs, K.bós (Freyn 121, ap. Ny. l. c., Ny. FER. 443), Torda (Schur VSV. X. 78, Wolff 57, Pr. Fl. II. 290), Gerend (Simk. Em. 154), Kékes (Pr. MBL. V. 31)

A. rosea (L.) Cav. — Subspont. M.vásárh. (Ny. ap. Soó Scr. I. 46)

776. *Malva silvestris* L. — Frequens. — *l. albida* Priszter Szszt.-miklós (Priszter 91)

777. *M. neglecta* Wallr. — Frequens. — *b. brahypetala* Üchtr. — Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 149)

778. *M. pusilla* With. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 86), Kolozs (Schur l. c. 111), Sz.újvár (K. et O. 17), Torda (Ercsei 102, Schur En. 130, Wolff 57, Freyn 121), Bonchida, Gyulatelke, V.kamarás, Dés (Morariu tab. V.), M.vásárh. (Kováts ap. Sternh. Siebenb. 27)

M. moschata L. *b. laciniata* (Desr.) Gr. et Godr. — Kajántó (Bujo-rean BCl. XVII. 150) Subspont.

M. crispa L. — Dés (Czetz 17) culta?

779. *Hibiscus trionum* L. — Frequens.

Abutilon Theophrasti Medic. — Subspont. M.vásárh. (Ny. ap. Soó Scr. I. 46)

Guttiferae.

780. *Hypericum tetrapterum* Fr. — Kv. Szénafű (Wolff ap. Ny., Soó Kv. 364)

781. *H. perforatum* L. — Frequens. — *b. angustifolium* DC. —

Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 149) — *e. microphyllum* DC. — Szamosfa (Soó l. c., GM. 101, in Gr. 247)

782. *H. maculatum* Cr. — Kv. Szénafű, Fejér (Schur VSV. X. 97, Soó GM. 83, Kv. 263, Wolff ap. Ny. Kv. 263), Ajton (Ny. l. c.)

783. *H. hirsutum* L. — (EK. 284) — Kv. Szénafű, Fejér, Dez-mér (et *f. latifolium* Beckh.), Kolozs, Korpád, K.bós, Berkenyes, Mócs, Sz.újvár, Szék, Cege-Pujon, Szabéd-M.bárd, Doboka-Moró.

784. *H. montanum* L. var. *seabrum* Koch — Kv. Szénafű, Fejér (Soó GM. 83, Kv. 564, Ghisa ap. Ny. Kv. 564), Ajton (Freyn 121), M.bárd, Bazéd (Lengy. ap. Soó 112), Torda (Ercsei 96)

785. *H. elegans* Steph. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 96, Winkler 50 sub „*H. pulchro*“, Bélteki, Wolff ap. Ny. Kv. 364, Pr. Cp. 142), Kolozs, K.bós (Freyn 121), Gerend, M.kák (Simk. En. 157), Mócs (Pr. MBL. V. 32), Báld (Pr. FK. 1914. 313), Buza (Pr. Cp. 145), M.vásárh. (Wagner TTK. 1900. PF. 46)

Elatinaceae.

786. *Elatine alsinastrum* L. — Sz.kocsárd (Csató ap. Simk. En. 149), Torda (Ercsei 92)

Tamaricaceae.

787. *Myricaria germanica* (L.) Desv. — Szamosfa, (Priszter 88) Szt.mihályfa (Wolff 59), Torda (Ercsei 16)

Cistaceae.

788. *Fumana procumbens* (Dun.) Gr. et Godr. — Kolozs, K.bós, Virágosv. (Freyn 117) sed ceterum a nemine lecta.

789. *Helianthemum nummularium* (L.) Dun. — Kolozs, K.bós (Freyn 117, anne ssp?), A.sztmiklós (Pr. Cp. 93)

ssp. *ovatum* (Viv.) Sch. et Th. et *f. lanceolatum* (Willk.) — Frequens, cf. Soó BK. XXIII. 157, Ny. Kv. 366.

Violaceae.

790. *Viola collina* Béss. — Kv. Szénafű (Andrae Bot. Ztg. XI. 415, VSV. V. 61, Ny. Kv. 367), Sz.újvár (K. et O. 27), Bárd (Pr. Cp. 105), Torda-Sós. (Wolff 57)

791. *V. ambigua* W. et K. — Kv. Szénafű (Andrae Bot. Ztg. XI. 416, Soó GM. 83, Pr. Cp. 95, 117, 132, Ny. FER. 450b, Kv. 367), Apahida (!Ny. FER. 450a, Kv. 367, Pr. Cp. 142), Kolozs, K.bós (Freyn 117, Ny. l. c.), M.szovát (Péterfi MBL. XVII. 59, Pop Guide 165, Pr. Fl. II. 212), M.bárd-Bergenye (Pr. Cp. 153), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. Suppl. 35), K.borsa(!) — *b. gymnocarpa* Janka — Kv. Szénafű (Freyn 117), Feketelak (Janka 559)

792. *V. hirta* L. — Frequens, in formis multis (cf. Ny. Kv. 368) sic : *f. grandiflora* Pacher Kv. Szénafű (Soó Kv. 368) — *b. fraterna* Rchb. — Apahida (Ny. l. c.)

793. *V. cyanæa* Čel. (*V. Beraudii* Bor. var. *cyanæa* Hand. -Mazz.) — (EK. 284—5) — Kv. Szénafü, Fejérd, Szamosfa, Dezmér, Bazéd, Szabéd, K.borsa — sed certe in silvis magis divulgata.

794. *V. odorata* L. — (EK. 285) — Kv. Szénafü, Sz.újvár, P.kamarás, Kékes, M.záh, M.bánd, N.sármás, Bazéd, Szabéd, M.vásárh. — Torda (Ercsei 33)?

794a. *V. alba* Bess. — Ad limites : Torda (Freyn 117), Dés (Prod. Fl. I. 636)

795. *V. mirabilis* L. — (EK. 285) — Kv. Szénafü, Fejérd (etiam *f. pratensis* Nyár.), Dezmér, Apahida, Kolozs, Ajton, Berkenyes, Kályán, Szék, Pujon, Vszt.gothárd, Sz.újvár, M.szilvás, N.sármás, P.kamarás, Kékes, M.bánd, Bazéd, Sárpatak, Pókakeresztúr, Szabéd, M.vásárh., K.borsa, Moró-Tötör.

796. *V. silvatica* Fr. — In silvis omnibus frequens (EK. 285), normaliter quasi ssp. *bavarica* (Schrank) Soó (*tr. silvatica* — *Riviniana*, Syn. : *intermedia* Rchb., *nemorosa* N. W. M.) cf. Soó 113, EK. I. c.

ssp. *Riviniana* (Rchb.) Asch. — Dezmér (Harg. Kv. 662, Pr. Fl. II. 148), Sz.újvár (Hg. II. 67), M.vásárh. (Ny. Mv. 77)

797. *V. montana* L. — Kv. Szénafü (Soó Kv. 374, Zsák, Ny. Kv. 374), Sz.újvár (Hg. II. 68), B.váralja (Hg. II. 129)

798. *V. canina* L. — Kv. Szénafü (Soó GM. 83, Pr. Cp. 132, 136, Ny. Kv. 374), Kolozs-K.bós (Ny. I. c., Pr. Cp. 139), Ajton (Ny. I. c.), Sz.újvár (Hg. II. 68)

799. *V. elatior* Fr. — Kv. Szénafü (Bélteki ap. Ny. Kv. 374, Ujv. Kv. 662), Dés (Czetz 23) — b. *Jordanii* Hanry — Kv., Dés (Pr. Fl. I. 638)

800. *V. stagnina* Kit. — Kv. Szénafü (Soó GM. 93, Kv. 373), Kolozs, K.bós (Freyn 118), Dés (Czetz I. c.) — b. *macrostipula* F. Schultz (*tr. stagnina-montana*) Kv. Szénafü (Soó BK. XXV. 144)

801. *V. pumila* Chaix — Kv. Szénafü (Simk. MNL. III. 50, Barth 107, Soó GM. 93, Kv. 375, auct. plures ap. Ny. Kv. 375), K.bós (Ny. I. c.), Sz.újvár (K. et O. 27) — lus. *alba* Nyár. Kv. Szénafü (Soó Kv. 375) — b. *fallacina* Úchtr. (*tr. pumila-stagnina*) — Ajton (Ny. I. c.)

802. *V. collina* × *hirta* (*V. interjeeta* Borb.) — Kv. Szénafü (Ny. Kv. 367)

803. *V. ambigua* × *hirta* (*V. revoluta* Heuff.) — Kv. Szénafü (Soó GM. 83, Kv. 662, Pr. Cp. 132, Ny. FER. 456c, Kv. 368 — etiam *f. ambugiformis* et *f. hirtiformis* Nyár. — cf. Borbásia III. 92), Apahida (Pr. Cp. 142, Nyár. — Pop FER. 456a), K.bós-Ajton (Ny. I. c.), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Scr. I. 46)

804. *V. ambigua* × *collina* (*V. Diószegiana* Borb.) — Kv. Szénafü (Ny. Kv. 368), M.bánd (Pr. Fl. I. 639)

805. *V. odorata* × *hirta* (*V. permixta* Jord.) — Kv. Szénafü (Soó Kv. 371, Ny. I. c. f. *oenipontana* Murr.), Sz.újvár (Hg. II. 67), N.sármás (Borza BCI. VIII. 21)

806. *V. cyanæa* × *hirta* (*V. Kernerii* Wiesb.) — Kv. Szénafü (Soó Kv. 371, Borbásia III. 94 : f. *monostorensis* (Nyár.) Soó nov. c.), K.borsa „Órhégy”(!)

807. *V. montana* × *silvatica* ssp. *Riviniana* (*V. Weinharti* W. Becker) — Sz.újvár (Hg. II. 67 sec. Nyár.)

V. alba × *odorata* (*V. multicaulis* Jord.) — Ad limites : Dés (Pr. Cp. 233)

808. *V. tricolor* L. sp. coll. — Torda (Ercsei 179), M.újvár (Schur En. 85), Szabéd (Szakmáry 120), M.vásárh. (Ny. Mv. 76)

ssp. *Bielziana* (Schur) Soó — Kv. Szénafü (Soó GM. 90, Richt. ap. Ny. Kv. 375 non typ.)

ssp. *luteola* (Schur) Soó = *chrysanthia* Schur — Kv. Szénafü (Schur VSV. X. 86 sub *V. sudetica*, Richt. ap. Ny. Kv. 376) cf. Schur ÖBZ. X. 253)

809. *V. arvensis* Murr. — Frequens, in formis multis, cf. Soó BK. XXII. 72, Ny. Kv. 377, sic b. *gracileseens* (Jord.) — Kv. Szénafü (Soó, Ny. Kv. 377 — e. *pulehella* (Gáyer) Nyár. — Kv. Szénafü (Soó BK. XXII. 72, Ujv. Kv. 662). Certe etiam formeae : a. *ruralis* (Jord.), e. *agrestis* (Jord.), — d. *bicolor* R. et Sch. (*V. banatica* Kit.) — Torda (Ercsei 179)

Thymelaeaceae.

810. *Thymelaea passerina* (L.) Coss. — Kolozs (Bgt. I. 335, Freyn 84, Ny. Kv. 379), Berkenyes (Freyn 84), Torda (Bgt. I. 335), Szt.mihályfa (Simk. En. 476), Apahida, Kályán (Soó 113), Gyulatelke (Morariu 191), Szék(!), Dengeleg, Szabéd (Lengy. ap. Soó 113), Kékes (Pr. MBL. V. 33), A.sztsmiklós (Pr. Cp. 93), M.ludas (Pr. Cp. 165), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 85), Désakna (Hg. II. 71)

811. *Daphne cneorum* L. — Apahida „Csuhá” (Pr. Cp. 128, 142, Ny. Kv. 380), Dezmér-Pata (Ny. I. c.)

812. *D. mezereum* L. — (EK. 285) — Kv. Szénafü, Fejérd, Dezmér, Kolozs, Sz.újvár, K.néma, B.váralja, Coptelke, Iklód, Bonehida-Szék, Vszt.gothárd, Kályán, M.szilvás, Bala-N.ercse, M.vásárh., Bádok-Doboka. — Torda (Ercsei 28)

Lythraceae.

813. *Peplis portula* L. — Vszt.gothárd-Pujon (Janka 567), Torda (Bgt. En. I. 282, Ercsei 97)

814. *Lythrum hyssopifolium* L. — Kv. Szénafü-Szamosfa (Bélteki, Wolff ap. Ny. Kv. 380), Szsztmiklós-Apahida (Csűrös ap. Soó 113), Apahida-Kályán (Soó 113), Gyulatelke, Dés (Morariu 190, 178), Cege (Pr. Cp. 50), Sz.újvár (Schur VSV. X. 113), Báld-N.sármás (Pr. FK. 1914. 312, Pr. Cp. 58), Katona-Kiscég (Ny. ap. Soó 113), Bazéd (Lengy. I. c.), Torda (Wolff 59), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 85), M.kece-M.ludas (Ny. ap. Soó 113)

815. *Lythrum virgatum* L. — Kv. Szénafü (Landoz Kolozsv. I. 7, Andrae BZ. XI. 458, Schur VSV. X. 99, Soó GM. 93, Ny. FK. 46—8, Richt., Bélteki ap. Ny. Kv. 381), Szamosfa (Richt. I. c.), Apahida (Joó ap. Ny. I. c.), Apahida-Korpád (Soó 113), Kolozs (Schur En. 219), K.bós (Ny. FER. 1722), Torda (Schur VSV. X. 78), Sz.újvár (Schur I. c. 113), Kékes (Pr. Cp. 145), M.vásárh. (Bgt. II. 7), M.kece-M.ludas (Ny. ap. Soó 113), K.borsa(?)

- 815a. *L. salicaria* × *virgatum* (*L. seabrum* Simk.) — Kv. Szénafű (Soó GM. 93, BK. XXII. 72)
 816. *L. salicaria* L. — Frequens, in formis pluribus.

Onagraceae.

817. *Oenothera biennis* L. — Frequens.
 818. *Epilobium hirsutum* L. — Frequens, in formis pluribus, sic *f. parviflorum* Hausskn. et *b. adenocaulon* Hausskn. Szénafű-Szamosfa (Ny. Kv. 383)
 819. *E. parviflorum* Schreb. — Frequens, in formis pluribus.
b. tomentosum Hausskn. — Kv. Szénafű, Szamosfa (Soó ap. Ny. 383)
 820. *E. montanum* L. — (EK. 285) — Kv. Szénafű, Ajton, Sz.-újvár, F.mikola, Ö.füzes, M.szilvás, Báld, K.borsa, Bázok-Doboka-Moró. — Torda (Ercsei 41)
 821. *E. collinum* Gmel. — Kékes (Pr. Cp. 108)
 822. *E. roseum* Schreb. — Apahida (Pr. Cp. 58), Cege (Pr. Cp. 50)
 823. *E. tetragonum* L. — Kv. Szénafű (Soó GM. 93, Kv. 384, Ny. FK. 1941. 48), Szszt.miklós(!), Apahida (Pr. Cp. 53), Sz.újvár (K. et O. 11), Torda (Ercsei 41)
 824. *E. palustre* L. — Kv. Szénafű (Soó Kv. 663), Szamosfa (Borb. ap. Ny. Kv. 384), Apahida (Pr. Cp. 58)
 825. *E. palustre* × *parviflorum* (*E. rivulare* Wahlbg.) — Kv. Szénafű (Soó Kv. 642)
 Dubia : *E. hybridum* Schur — Kv. Szénafű (Schur En. 209) :
 hybrida vel *E. parviflorum*?
 826. *Chamaenerion angustifolium* (L.) Scop. — Szamosfa (Priszter 88), Dezmér (Ujv. Kv. 663), Apahida (Pr. Cp. 53), Ö.füzes (K. et O. 8)
 827. *Ch. palustre* Scop. — Torda (Wolff MNL. I. 59)
 828. *Ciraea lutetiana* L. — Torda (Ercsei 149, Wolff I. c.)

Haloragaceae.

829. *Myriophyllum verticillatum* L. — Szamosfa (Landoz EM. II. 30, Soó MBIM. II. 72, Pr. Bul. Acad. Agr. 1933. 243), Szszt.miklós-Apahida (Csürös, Ujv., Soó Kv. 643, Soó Arch. Biol. XVII. 98 et *f. limosum* DC.), M.tóhát (Csató ap. Soó MBIM. I. c.), Kékes (Pr. ap. Soó Arch. I. c. *f. pectinatum* (DC.) Wallr.), M.záh (Pr. ap. Soó I. c.), Szék(!), Torda (Wolff 58), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 87, Arch. I. c. *f. pinnatifidum* Wallr.)
 830. *M. spicatum* L. — Kv.-Szamosfa Dezmér (Ny. Kv. 385, EM. 1941. 110, 114), Cege (Györffy MBL. III. 164, Pr. Cp. 49), M.szovát (Pr. Cp. 53), M.tóhát, M.újvár (Csató ap. Soó MBIM. II. 72), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 73)
 831. *Hippuris vulgaris* L. — Vszt.gothárd-Cege : Hodostó (! Janka MTK. XII. 186, Györffy MBL. III. 165, Pr. Cp. 49, ap. Soó MBIM. II. 75), Vszt.gothárd-Ö.füzes (Pr. ap. Arch. I. c. 98, verisimiliter locus natalis praecedens)

- Hydrocaryaceae.*
 832. *Trapa natans* L. — Torda (Wolff ap. Soó Ann. Mus. Nat. XXXIX. 174)

Araliaceae.

833. *Hedera helix* L. — (EK. 286) — Fejérd, Apahida, Sz.újvár, B.váralja, Szu.németi, Coptelke, M.szilvás, M.ménes, Berkenyes, Bázok-Doboka.

Umbelliferae.

834. *Sanicula europaea* L. — Sz.újvár, F.mikola, B.váralja, Szu.németi, Coptelke, Pujon, Vszt.egyed, Bázok-Doboka. — Torda (Wolff 59)

835. *Eryngium campestre* L. — Frequens.

836. *E. planum* L. — Kv. Szénafű, Melegv. (Winkler 50, Soó GM. 87, 90, Pr. Cp. 83, Ny. Kv. 390, Ujv. Kv. 663, Pr. Fl. II. 292), Apahida-Kályán(!), Kékes, Buza, M.záh, A.zsuk (Pr. Cp. 108, 145—6, 152), Apahida (Freyn 107, Ujv. I. c.), Kolozs, K.bós, Ajton, Berkenyes, M.csán (Freyn 107), Szamosfa (Freyn 107, Ny. I. c., Csürös BCI. XXVII. 81), Gyulatelke (Morariu 191), Torda (Ercsei 76, Freyn 107, Borza FER. 2009, Pr. Fl. II. 290), Désakna (Pr. I. c. 298)

837. *Chaerophyllum aromaticum* L. — (EK. 286) — Fejérd, B.váralja, Szu.németi, Bonchida-Szék, Cege, Kályán, Bázok-Doboka. — Torda(!)

838. *Ch. bulbosum* L. — Frequens, saepe *b. tenuissimum* (Vel.) Jav. — Kv. Szénafű (Soó BK. XXII. 72)

839. *Anthriscus silvester* (L.) Hoffm. — Frequens, additamenta pauca.

840. *A. cerefolium* L. Hoffm. *b. trichospermus* (Schult) W. et Gr. Torda (Ercsei 92) Certe magis distributa.

841. *Torilis japonica* (Houtt.) DC. (*T. anthricus* (L.) Gmel. non Gärtn.) — Frequens.

842. *T. arvensis* (Huds.) Lk. — Kolozs (Schur En. 271), Gerend (Simk. En. 271), Kékes (Pr. Cp. 165), M.vásárh. (Lengy. ap. Soó Szf. 38)

Delenda : *T. nodosa* (L.) Gärtn. — Torda (Bgt. I. 255, Ercsei 28)

843. *Caucalis latifolia* L. — Kv. Szénafű (Soó GM. 115, Ny. Kv. 393), Torda (Ercsei 28), Mezőség (Bgt. I. 254), B.váralja (Hg. III. 126), K.borsa(!)

844. *C. lappula* (Weber) Grande (*C. daucoides* L.) — Kv. Szénafű (Pr. Cp. 168, Soó Ny. Kv. 393), Szamosfa (Soó I. c.), Torda (Ercsei 28, Wolff 60), M.ludas, M.örményes (Pr. Cp. 165, 168), K.borsa, Bonchida, Szék, Cege, Pujon(!), B.váralja (Hg. III. 126, 129), Szabéd (Szakmány 120), M.vásárh. (Ny. Mv. 79) — ssp. *muricata* (Bischoff) Dom. — Sz.újvár (K. et O. 7)?

845. *Bifora radians* M. B. — Frequens.

- 845b. *Orlaya grandiflora* (L.) Hoffm. — Kv. Szénafű (Schur En. 240, Pr. Cp. 142), Mezőség (Bgt. I. 253), Torda (Ercsei 28), recentius non lecta, dubia (cf. Soó BK. XXII. 76, Ny. Kv. 393)

Delenda : *Scandix pecten-veneris* L. — Torda (Ercsei 161)

Coriandrum sativum L. — Apahida-Sz.újvár (Pr. Cp. 166) Tantum subspontanea.

846. *Conium maculatum* L. — Frequens.

847. *Bupleurum rotundifolium* L. — Kv. Szénafű (Pr. Cp. 168, Borb., Soó Kv. 394, Ujv. Kv. 663), Apahida (Soó AGH. V. 149), Dezmér(!), Kolozs, K.bós, Ajton, Berkenyes, Virágosv. (Freyn 107), Torda (Freyn 107, Ercsei 149), Gerend (Simk. En. 254), Fejérd, K.borsa, Válaszút, Szék, Vszt.gothárd, Pujon(!), Tötör-Moró (Hg. I. 128), Sz.újvár (K. et O. 6), Gyulatelke (Morariu 190), Kékes (Pr. Cp. 92, 165), Szabéd (Szakmáry 120), M.vásárh. (Bgt. I. 241, Ny. Mv. 78)

848. *B. tenuissimum* L. — Kv. Szénafű, Melegv. (Wolff, Ny. Kv. 394, Soó Consp. 55, Pr. Fl. II. 292), Szamosfa, Apahida (Soó GM. 100, in Gr. 249, Consp. 50, Richt., Bélteki Ny. Kv. 394, Csürös BCL XXVII. 80), -Kolozs (Pr. I. c. 293), Kolozs (Freyn 107, Soó in Gr. 249), K.bós, Berkenyes, Virágosv. (Freyn 107), Torda (Wolff 59, Soó I. c.), Szék (Soó Consp. 51), Hesdát (Pr. MBL. V. 32), M.záh (Simk. En. 254)

849. *B. falcatum* L. — Frequens, in formis pluribus. (Soó BK. XXIII. 150), *b. angustifolium* Lec. et Lam (*linearifolium* Schur) — Kv. Szénafű (Soó I. c., Ny. Kv. 394) — *c. petiolare* (Lap.) DC. cum typo.

850. *B. praealtum* Nathorst (*B. junceum* L.) — Kolozs (Bgt. I. 244, Schur En. 251), Torda (Bgt. I. c., Ercsei 149, Jav. Magy. Fl. 772), Mezőség (Bgt. I. c.), magis dubia.

851. *B. affine* Sadler — Kv. Szénafű-Apahida „Csikosh.“ (Ujv. Kv. 642), M.kók (Simk. En. 254), Torda (Ercsei 149)?, M.vásárh. Kováts in Sternheim 23)

852. *Trinia glauca* (L.) Dum. — Kv. Szénafű (Landoz EM. II. 30), A.zsuk (Pr. Fl. II. 219), Egerbegy (Barth 110)

853. *T. Kitaibelii* M. B. — Kv. Szénafű, Melegv. (Kováts in Sternheim 23, Janka 574, Soó GM. 99, Pr. Cp. 135, Borza-Nyárády FER. 461a. auct. plures ap. Ny. Kv. 395), Kolozs, K.bós, Virágosv. (Freyn 107, Ny. I. c.), Torda (Janka 574, ÖBZ. VI. 194, Wolff 59), Gerend (Wolff I. c.), K.borsa(!), Telekfarka-Apahida, Bonchida, Kisiklód-Szék, Cege, Omboztelek, Kályán (Soó 113), A.sztmiklós, Mócs, Kékes (Pr. Cp. 93, 109, 144), Faragó-N.nyulas, Bala-N.ercse (Ny. ap. Soó 113), Bazéd (Lengy. ap. Soó 113), M.vásárh. (Ny. 80)

Dubia : *Apium repens* (Jacq.) Rchb. — Sz.újvár (K. et O. 13)

854. *Cicuta virosa* L. — Kissármás (Pr. Cp. 103), Torda-Sós. (Ercsei 41), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 90)

855. *Falcaria vulgaris* Bernh. — Frequens.

856. *Carum carvi* L. — Frequens.

857. *Pimpinella saxifraga* L. — Frequens, in formis multis (cf. Soó BK. XXIII. 150, Ny. Kv. 396) — *b. nigra* (Mill.) Spr. — Kv. Szénafű(!)

858. *Aegopodium podagraria* L. — (EK. 286) — Kv. Szénafű, Fejérd, Kolozs, Szamosfa-Apahida, Kályán, Korpád, Sz.újvár, F.mikola, B.váralja, Szu.németi, Coptelke, Sz.jenő, Iklód, Vszt.gothárd, Bonchida-Szék, Vszt.egyed, Pujon, Cege, P.kamarás, N.sármás, M.ludas, M.vásárh., Bádok-Doboka. — Torda(!)

859. *Sium erectum* Huds. — Kv. Szénafű, Melegv. (Schur VSV. X. 99, Wolff, Bélteki ap. Ny. Kv. 397), Fejérd(!), Szamosfa (Bujorean BCL. XIV. 227, Ny. I. c.), Kékes (Pr. MBL. V. 32)

860. *S. latifolium* L. — Apahida (Ujv. Kv. 663 an sequens?), Torda (Ercsei 26), Dés (Czett 21), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 89)

861. *S. lanceolatum* M. B. — Kv. Szénafű (Barth ap. Jav. BK. XVI. 4, Soó BK. XXII. 76, GM. 96), Apahida (Csürös ap. Ny. Kv. 663), Désakna (Hg. II. 70)

862. *Seseli hippomarathrum* L. — Kolozs, K.bós, Torda (Freyn 108) ceterum a nemine lecta.

863. *S. gracile* W. et K. — Kolozs, K.bós (Freyn 108), Torda (Bgt. I. 238, Ercsei 66, Janka 573)), Szék (Soó 113), Vszt.gothárd (Janka FEAH. 118), Kályán (Janka ÖBZ. VI. 195), M.záh (Pr. Cp. 146)

864. *S. annuum* L. — Frequens.

865. *S. varium* Trev. — Kv. Szénafű (Soó GM. 98, BK. XXIII. 150 f. *transsilvanicum* Schur, AGH. V. 146, 149, Pr. Cp. 83, 141—2, Ny. Kv. 398, Ujv. Kv. 663 partim sub „*S. glauco*“ et „*osseo*“), Szamosfa (Richt. ap. Ny. I. c.), Apahida (Schur En. 257, Soó AGH. V. 153, Ny. I. c.), Kályán (Soó 113), Kolozs (!Schur I. c., Freyn 108), K.bós, Ajton, Berkenyes, Virágosv. (Freyn 108), Torda (Schur VSV. X. 78, En. 257, Freyn 108, Hayek 467), Gerend (Simk. En. 258), M.záh (Pr. Cp. 93, 146)

866. *S. libanotis* Koch — Torda (Wolff 60), M.vásárh. (Barth 110)

867. *Oenanthe aquatica* (L.) Poir. — Frequens.

868. *Oe. banatica* Heuff. — Kv. Szénafű, Fejérd (Soó GM. 96, Ny. FK. 52, Kv. 399), Ajton (Freyn 107, Ny. I. c.), Bonchida (Soó 113), Torda (Wolff 59, ap. Janka MTK. XII. 183, Barth 110), M.vásárh. (Barth 110)

Dubia : *Oe. fistulosa* L. — Torda (Ercsei 69)

869. *Aethusa cynapium* L. — Kv. Szénafű (Borb. ap. Ny. Kv. 399), Torda (Ercsei 13), Bonchida(!), Sz.lekence (Lengy.)

871. *Silaum peucedanoides* (MB.) Kern. — Kv. Szénafű (Kováts ap. Sternheim 23, Schur VSV. X. 99, Janka 573, ÖBZ. V. 230, Winkler 50, Soó GM. 88, 91, auct. plures ap. Ny. Kv. 400), Apahida (Soó Ny. I. c.), Kályán, Korpád (Soó 114), Kolozs, K.bós (Freyn 108, Ny. I. c.), N.nyulas (Sternh. I. c.), Kályán, Vszt.gothárd (Janka 573), Torda (Janka I. c., Wolff 60, FEAH. 2921), M.szovát (Pr. Cp. 94), M.záh (Pr. Fl. I. 682), Báld (Pr. FK. 1914. 313, Pr. Cp. 146), Kecsed (Hg. I. 126)

Huc : *S. silaus* (L.) Sch. et Th. — Mezőség (Bgt. I. 217)?

872. *Angelica silvestris* L. — Kv. Szénafű, Fejérd (Soó GM. 96, Kv. 663 et *b. elatior* Wahlbg. Soó, Hg. Ujv. Kv. 663), K.borsa, Korpád(!), Désakna (Hg. II. 71 ad *b. verg.* Sz.újvár (K. et O. 5, Pr. Cp. 74), Torda (Ercsei 15 et sub „*A. archangelica*“))

870. *Anethum graveolens* L. — Subspont. Szamosfa-Apahida (!Priszter 89), Kolozs, Torda (Freyn 109)

871. *Selinum carvifolium* L. — Torda (Hayek 467, Ercsei 43, Schur VSV. X. 78)

873. *Ferulago silvatica* (Bess.) Rchb. — Kv. Szénafű, Fejérd (Winkler 5, Soó GM. 88, 91, Pr. Cp. 135—7, auct. plures ap. Ny.

Kv. 400, Ujv. Kv. 663, Ghisa BCl. XXI. 61), Dezmér (Ujv. l. c.), Ajton (Ny. l. c.), Kolozs, K.bós, Virágosv. (Freyn 108), Iklód, Cege, Pujon, Vszt.egyed, Kiskályán (Soó 114), Vszt.gothárd, Feketelak (Janka MTK. XII. 183, Soó 114), Nyulas (Kováts ap. Rehb. Icon. XXII. 55), Bazéd (Lengy. ap. Soó l. c.), Kékes (Pr. Cp. 144), M.vásárh. (Ny. Mv. 80), K.borsa(!), Kecsed, Bádok-Doboka-Moró (Hg. I. 126—9)

874. *Peucedanum carviifolia* (Cr.) Vill. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 99)?, Kolozs (Freyn 109), M.földvár (Pr. Cp. 145), Pujon (Jánka 573), Báld (Pr. FK. 1914. 313), K.borsa (Soó EK. 286).

875. *P. officinale* L. — (AGH. V. 161) — Apahida (Nyár. FER. 1309, Cheia Turzii 264, Richt., Soó AGH. 153, 161, Kv. 402, Consp. 56), Szamosfa (Bélteki ap. Soó l. c.), M.szovát (Pr. Fl. I. 687)

876. *P. tauricum* M. B. — (AGH. V. 161) — Kv. Szénafű, Apahida, Kolozs, K.bós, M.csán, Virágosv., Torda, M.záh, Gerend, M.kök, P.kamarás, Mócs, Báld (pt. f. *anomalum* Nyár.), Kiscég-M.szilvás (pt. f. *anomalum*), M.szovát.

877. *P. latifolium* DC. — (AGH. V. 162) — Kv. Szénafű, Melegv., Szamosfa-Apahida — citata omnia cf. Soó AGH. V: 162, Ny. Kv. 401, etiam Soó Consp. 30, 33—4, 44—5, 50, 56 — Ujv. Kv. 663, Csűrös BCl. XXVII. 80 — Virágosv., M.záh, Szék-Sz.újvár, Dés, Bonchida.

878. *P. oreoselinum* (L.) Mönch — Frequens.

879. *P. cervaria* (L.) Lap. — Kv. Szénafű, Fejér (Winkler 50, Soó GM. 83, Bélteki, Richt., Soó, Ny. Kv. 401), Kolozs, K.bós, Ajton (Freyn 107), K.bós-K.kara (Richt. ap. Ny. l. c.), Sz.újvár, Désakna (Hg. II. 68, 71), B.váralja (Hg. III. 126), Torda (Ercsei 45), Iklód, Szék, Cege, Pujon, Feketelak, Kályán (Soó 114), Bazéd (Lengy. ap. Soó 114)

Dubia : *P. alsaticum* L. — Kolozs, Mezőség (Bgt. I. 217), Torda (Ercsei 85)

880. *P. palustre* (L.) Mönch — A.gyéres, M.záh (Ercsei 43), Báld-N.sármás (Pr. Fl. 1914. 312, Cp. 231, MBL. XV. 255), Vszt.gothárd (Soó 114), et ad limites ditionis : Kv.-Szamosfa (Borb. ap. Soó BK. XXII. 72, Ny. Erd. Muz. 1941. 112)

881. *Pastinaca sativa* L. — Frequens.

882. *Heracleum sphondylium* L. — (EK. 286) — Kv. Szénafű, Fejér, Ajton, Kolozs, Korpád, Bonchida, Iklód, Szék, Cege, Pujon, Vszt.gothárd, Feketelak, Bazéd, Sz.újvár, F.mikola, B.váralja, Coptelke, A.gyéres, Gerend, M.záh, Mojos, P.kamarás, M.vásárh., K.borsa. — Torda (Ercsei 151)

883. *Tordylium maximum* L. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 99)?, Sz.újvár (K. et O. 25)

884. *Laserpitium latifolium* L. — (EK. 286) — Kv. Szénafű, Fejér, Dezmér, Kolozs, K.bós, Ajton, Kályán, Iklód, Bonchida-Szék, Feketelak, Bazéd, F.mikola, Sz.újvár, K.borsa, Doboka-Moró-Tötör. — Vulgaris est a. *asperum* (Cr.) R. et C., rarius b. *glabrum* (Cr.) R. et C. Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 150)

L. pruthenicum L. — Tantum ad fines terr. : Ajton (Freyn 109)

885. *Daucus carota* L. — Frequens. — f. *viridulus* Posp. — Szszt.miklós (Priszter 91)

Cornaceae.

886. *Cornus mas* L. — (EK. 270) — Fejér, Dezmér, Sz.újvár, Kékes, Vszt.iván, M.vásárh. — Torda (Ercsei 138)

887. *C. sanguinea* L. — Frequens.

Pyrolaceae.

888. *Pyrola rotundifolia* L. — Sz.újvár (K. et O. 20, Pr. Cp. 100), Bádok-Doboka (Hg. I. 129)

889. *Monotropa hypopitys* L. — Teke (Borza BCl. VIII. 26)

Primulaceae.

890. *Primula veris* L. — (EK. 286—7) Extra typum b. *canescens* (Opiz) Beck et tr. *calvescens* Pax (cf. Borb. ÖBZ. 1891. 323, Soó BK. XXIII. 157) — Kv. Szénafű, Fejér, Apahida, Kolozs, K.bós, Ajton, Zsuk, Sz.újvár, B.váralja, Szu.németi, Bonchida-Szék, Sz.jenő, Iklód, Cege, Pujon, Vszt.gothárd etc., Berkenyes, M.bánd, Szabéd, M.földvár, M.vásárh., K.borsa, Bádok-Doboka, Moró-Tötör. — Torda(!), Dés (Czetz 19)

P. acaulis (L.) Grubbg. = *P. vulgaris* Huds. — Ad limites : Dés (Czetz l. c., Pr. Cp. 187, Fl. I. 706)

891. *Androsace elongata* L. — Kv.-Szamosfa-Apahida (Ny. FER. 582b., Kv. 407), Apahida (Hayek 465), Kolozs, Torda (Bgt. I. 132), M.záh (Ercsei 108), Sz.újvár (K. et O. 4), Dés (Prod. MBL. V. 33)

892. *Hottonia palustris* L. — Ad fines ditionis : M.vásárh. (Barabás ap. Ny. Mv. 82, FER. 269)

893. *Lysimachia nummularia* L. — Frequens, in formis multis (Soó BK. XXIII. 150, Ny. Kv. 409)

894. *L. vulgaris* L. — Frequens.

895. *L. punctata* L. — Kv. Szénafű (Ny. Kv. 409), Kolozs (Freyn 106), Sz.újvár(!), F.mikola (Hg. II. 66), B.váralja, Szu.németi (Hg. III. 128, 130), Iklód, Cege, Pujon(!), M.vásárh. (Ny. Mv. 82), Torda (Ercsei 96)

896. *Glaux maritima* L. — Szamosfa (Bujorean BCl. XIV. 226, BAcadCl. 1933. 245, FER. 820b, Soó Consp. 30, 34, 44, Ny. Kv. 408)

897. *Anagallis arvensis* L. — Frequens. — b. *coerulea* (Schreb.) Baumg. — Kv. Szénafű (Ny., Soó Kv. 409, Pr. Cp. 166), Kolozs, K.bós (Freyn 106), Torda (Wolff 61), Szamosfa (Priszter 89), M.ludas, Kékes, M.örmenyes (Pr. Cp. 165—8), Gyulatelke (Morariu 190), K.borsa, Bonchida, Szék, Vszt.gothárd-Feketelak(!), Sz.újvár (K. et O. 4), M.vásárh. (Ny. Mv. 83) — c. *carnea* (Schrank) Sch. et K. (*Dörfli* Ronn.) — Kv. Szénafű (Priszter l. c. 91)

897a. *Samolus Valerandi* L. — M.vásárh. (Pr. Fl. I. 711) — Tamen dubia.

Plumbaginaceae.

898. *Statice Gmelini* Willd. — In desertis pratisque siccis salinis frequens : Kv. Szénafű, Melegv., Szamosfa-Apahida, Dezmér, Apahida-

- K.kara, Kolozs, K.bós, K.kara, Virágosv., Torda-Sósf., M.újvár, Sz.újvár, Gyulatelke-Szék, Szék, Dés, Désakna (cf. Bgt. I. 269, Ercsei 94, Andrae BZ. XIII. 898, Schur VSV. X. 112, 79, En. 559, Winkler 49, Freyn 85, Wolff 64, K. et O. 24, Hayek 466—7, Soó GM. 100—1, in Gr. 247—9, AGH. V. 152, Consp. 14, 28—30, 32—4, 44, 50—1, 55, Pr. Cp. 79, 53, 87, Fl. II. 289—297, Ny. EM. 1941. 113—4, FER. 169b., Kv. 410, Csűrös BCl. XXVII. 82) — *lus. nivea* Fuss Kolozs (Janka ÖBZ. VI. 202) — *lus. speciosa* Priszter et Soó Szamosfa-Apahida, Szék-Gyulatelke (AGH. VI. 91)
899. **S. tatarica** L. — (AGH. V. 162—3) — Kv. Szénafü-Melegv.-Apahida-Szamosfa (Landoz Kolozsv. 13, EM. II. 35 etc. — citata omnia vide ap. Soó AGH. I. c., Ny. Kv. 410), Torda, Sósfürdő (Schur VSV. X. 79, Winkler 49, Wolff 64, Hayek 467, auct. multi ap. Soó I. c.), M.záh (Simk. En. 463, Pr. Cp. 146, Alexi ap. Soó I. c.), M.tóhát (Bgt. I. 269), Vszt.gothárd-Pujon (Janka MTK. XII. 176)

Oleaceae.

900. **Fraxinus excelsior** L. — (EK. 1947. 55) — Fejérd (Ny. Kv. 411), Szamosfa-Apahida (Soó GM. 106), Kolozs, Aranykút, Berkenyes (Freyn 97), Bonchida, Sz.jenő(!), N.sármás (Borza BCl. VIII. 20), Kolozs, M.csán, M.őr, Mócs, Sz.nyires, Coptelke, Szt.margita, M.décse, Lövér, N.ölyves, Szabéd (F. et Bl. 690), M.vásárh. (Ny. Mv. 83), Torda(!)

901. **Ligustrum vulgare** L. — Frequens.

Gentianaceae.

902. **Centaurium vulgare** Raf. ssp. *uliginosum* (W. et K.) Soó — (AGH. II. 212) — Szamosfa (Landoz EM. II. 34)?, Torda (Winkler 49)

903. **C. umbellatum** Gilib. = **C. minus** Mönch ssp. *austriacum* Ronn. — Frequens, sed non semper typice. — *f. compactum* (Borb.) Ronn. — Torda (Borb. ap. Egey Index HB. Bpest 1932 16)

904. **C. pulchellum** (Sw.) Druce — Szamosfa-Apahida (Soó BK. XXIII. 150 et *f. maximum* (Schm.) Ronn., GM. 100, in Gr. 250, Consp. 28—30, Borza FER. 1316, Ujv. Kv. 664, Priszter 88), Kv. Szénafü (Ny. Kv. 415), Dezmér (Ujv. I. c.), Apahida-Kolozs (Pr. Fl. II. 293), Kolozs (Schur VSV. X. 112, En. 455, Freyn 98, Soó in Gr. I. c., Haynald ap. Egey 7), K.bós, Virágosv. (Freyn I. c.), Bonchida, Szék-Gyulatelke (Soó 28—30), Torda (Bgt. I. 171, Ercsei 57, Wolff 63, Freyn 98, Soó in Gr. I. c.), Désakna (Hg. II. 70), Vszt.gothárd (Janka 590), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 96)

905. **Gentiana ciliata** L. — Kv. Szénafü, Fejérd (Soó BK. XXIII. 150 cum *f. multiflora* Gaud., GM. 91, Kv. 663, Pop BCl. XIII. 103, Ghisa FER. 2885), Kolozs (Freyn 97), Sz.újvár (K. et O. 13)

906. **G. eruciata** L. — (EK. 287) — Kv. Szénafü, Fejérd, Dezmér, Kolozs, K.bós, Sz.újvár, Buza, Cege, Szabéd, K.borsa. — Torda (Winkler 49)

907. **G. pneumonanthe** L. — Kv. Szénafü (Soó GM. 93, Pr. Cp.

84, auct. plures ap. Ny. Kv. 414 — cum *f. latifolia* Scholl. cf. Soó BK. XXIII. 150), Kolozs, K.bós (Freyn 97), Torda (Ercsei 154), Zsuk, Buza (Pr. Cp. 152, 145), Bazéd (Lengy. ap. Soó 114)

908. **G. praecox** Kern. ssp. *carpathica* Wettst. — Kv. Szénafü „Morgó“ (Soó BK. XXII. 70, Bélteki, Greisiger, Ny. Hg. Kv. 414) *G. ballica* Murb. — Kv. Szénafü (Janka 591, ap. Wettst. Mon. Gentiana-Endotricha 1896. 318, Wolff ap. Ny. Kv. 413) — Tamen delenda!

G. asclepiadea L. — Ad limites : Torda (Wolff 63)

909. **Menyanthes trifoliata** L. — Torda, Egerbegy-M.csán (Ercsei 44), Torda-Sósf. (Borza BCl. XIV. 102), A.polyán (Wolff MNL. I. 62), Sz.nyires (Pr. Cp. 55, unacum Sphagnis, (?) uti dicitur), Bethlen (Pr. MBL. XV. 256)

Apocynaceae.

910. **Vinea minor** L. — (EK. 287) — Bonchida, Cege-Pujon, B.váralja, Coptelke, Kékes, Bádok-Doboka.

911. **V. herbacea** W. et K. — Kv. Szénafü, Fejérd, Melegv. (Bgt. I. 172, Schur En. 453, Soó GM. 90, AGH. V. 146—7, Kv. 664, Pr. Cp. 95, 133—5, Meusel 301, auct. multi ap. Ny. Kv. 416, FER. 665), Apahida (Pr. Cp. 142), Kolozs, K.kara, K.bós, Berkenyes, Virágosv. (Freyn 97), Torda (Ercsei 104, Wolff 62, Janka 590), K.borsa(!), Kecsed (Hg. I. 126), Sz.újvár (K. et O. 27), Bonchida-Kisiklód (Soó 114), máry 118, Lengy. ap. Soó 114), Mojos, Bazéd (Lengy. I. c.), M.bánd-M.bergenye (Pr. Cp. 153), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. Suppl. 41) *f. latifolia* Wierzb. — Kv. Szénafü (Soó BK. I. c., Kv. 664), Bonchida-Kisiklód (Soó 114) — *f. albiloba* Janka — Kv. Szénafü (Soó I. c., Ny. Kv. 416), Vszt.gothárd, Torda (Janka 590)

Asclepiadaceae.

912. **Cynanchum vineotoxicum** (L.) Pers. et b. *laxum* (Bartl.) Hay. — Frequentes *f. rigidum* Nyár. — Fejérd (Richt. ap. Ny. Kv. 417) — *f. scandens* Beckh. — Kv. Szénafü (Priszter 91)

Convolvulaceae.

913. **Cuscuta campestris** Yuncker (*C. pentagona* var. *calycina* Engelm., *C. arvensis* p. p.) — Apahida, Bonchida, Válaszút, Zsuk (Buia Cuscutele Romaniei 51), Sz.újvár, Dés (Degen M. Termt. Ért. 1921. 144, Buia I. c.), K.borsa(!), Moró-Tötör (Hg. I. 127), Mezőpete, Vajdaszeg (Buia I. c.), M.ludas, Teke, Dengeleg, Sz.ilekence, M.bánd, Katona (Lengy.), M.vásárh. (Thaisz ap. Degen I. c., Buia I. c.)

914. **C. suaveolens** Ser. — Vszt.gothárd (Janka ap. Buia I. c. 70)

915. **C. epilinum** Weihe — M.csán (Simk. En. 401), Kv. Szénafü (Pr. Cp. 141, deest ap. Ny. Kv. 417)

916. *C. europaea* L. — Szamosfa, Dés, A.gyéres, Sz.kocsárd (Buia l. c. 84), M.vásárh. (Ny. Mv. 84, Buia I. c.) Torda (Ercsei 58)
917. *C. epithymum* (L.) Murr. — Frequens. — *f. alba* (Presl) Trabut — Kv. Szénafű (Ujv. Kv. 664)
918. *C. trifolii* Bab. — Szamosfa (Buia l. c. 106 *f. longisquama* Buia), Dezmér (Ujv. Kv. 664), Kolozs (Richt. ap. Ny. Kv. 418), Torda (Pr. Fl. II. 290), K.borsa(!), Sz.újvár (K. et O. 9 sub *C. epithymum*, Buia l. c.), Dés, Kékes, Zsuk (Buia l. c. 103), Mezőpete, Vajdaszeg (Buia l. c.), Mócs, Denegeleg, Sz.lekence, M.bánd, Katona, M.ludas (Lengy.), M.vásárh. (Buia l. c. var. *muresensis* Buia)
919. *C. approximata* Bab. (*C. planiflora* Ten. var. *approximata* Engelm.) — Kékes (Pr. ap. Buia l. c. 116, Fl. I. 1250) — *b. urceolata* (Kuntze) Yuncker — Kékes (Pr. l. c.)
- 919a. *C. lupuliformis* Krockner — Szszt.miklós-Apahida (Csűrös ap. Ny. Kv. 642)
920. *Convolvulus arvensis* L. — Frequens, in formis multis, sic *b. sagittatus* Led. — Kv. Szénafű (Ny. Kv. 418)
921. *Calystegia sepium* (L.) R. Br. — Frequens.
- Pharbitis purpurea* (L.) Roth — Subspont. : Szszt.miklós (Priszter 88, 91 cum *f. nana* Priszter)

Boraginaceae.

922. *Heliotropium europaeum* L. — Mezőség, Apahida (Landoz EM. II. 34), Dés (Czetz 15), Sz.újvár (K. et O. 13), Kékes (Pr. Cp. 167), Vszt.gothárd (Janka 591), A.lóna (Wolff 63), M.vásárh. (Fuss VSV. V. 94)
923. *Cynoglossum officinale* L. — Frequens.
924. *Lappula myosotis* Wolff — Frequens.
925. *L. heteracantha* (Led.) Borb. — Kv. Szénafű (Borb. MNL. IX. 38, TTK. Pf. 1891. 14) olim adventiva.
926. *Asperugo procumbens* L. — Torda (Ercsei 10, Wolff 63), Sz.újvár (K. et O. 5), Gerend, M.záh, Vszt.iván (Ercsei 10), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 99)
927. *Symphtum tuberosum* L. ssp. *nodosum* (Schur) Soó (Syn. : *S. foliosum* Rehm.) — (EK. 287) — Kv. Szénafű, Fejér, Dezmér, Ajton, Kolozs, K.bós, Berkenyes, Sz.újvár, F.mikola, B.váralja, Szu.németi, Coptelke, Bonchida-Szék, Sz.jenő, Iklód, Szék-Vszt.egyed-Pujon, Vszt.gothárd, Peketelak, Vszt.gothárd, Kályán, Korpád, M.ménes P.kamarás, M.bánd, M.vásárh., Bánok-Doboka-Moró-Tötör.
928. *S. officinale* L. — Frequens. — *b. ochroleucum* DC. — Kv. Szénafű (Soó Kv. 664)
- 928a. *S. cordatum* W. et K. — Ad limites : Torda „Nagyberek“ (Wolff ap. Janka 592, 63, Simk. En. 403)
929. *Anchusa Barrelieri* (All.) Vitm. — Kv. Szénafű, Melegv. (Schur VSV. X. 105, En 466 cum *f. dilatata* Schur, Landoz EM. II. 34, Soó GM. 98, AGH. V. 148, Pr. Cp. 95—6, 135—8, auct. multi ap. Ny. Kv. 423, EM. 114, Ghisa BCI. XXI. 62), A.zsuk (Ny. l. c.), Apahida (Schur VSV. X. 119, Ny. l. c.), Kolozs, K.bós, Virágosv., Torda (Freyn 101), Gerend (Wolff 63), K.borsa-Válaszút(!), Kecsed, Moró-

- Tötör (Hg. I. 126—8), Kékes (Prod. MBL. V. 32), Szabéd (Szakmáry 117), M.vásárh. (Ny. Mv. 86, Pr. Cp. 96)
930. *A. officinalis* L. — Frequens. — *b. angustifolia* (L.) DC. — Sz.újvár (K. et O. 4 sub „*A. leptophylla*“?)
931. *A. italica* Retz — Kv. Apahida „Siposh.“ (Ny. Kv. 424), Torda (Schur En. 466), Sz.újvár (K. et O. 4)
- Dubia : *Lycopsis arvensis* L. — Torda (Ercsei 111)
932. *Nonnea pulla* (L.) DC. — Frequens.
933. *Pulmonaria officinalis* L. ssp. *obseura* (Dum.) Murbeck — (EK. 287) — Kv. Szénafű, Fejér, Szamosfa, Dezmér, Apahida, Kolozs, K.bós, Sz.újvár, F.mikola, B.váralja, Szu.németi, Coptelke, Bonchida-Szék, Sz.jenő, Iklód, Szék-Vszt.egyed-Pujon, Vszt.gothárd, Kályán, M.szilvás, N.sármás, M.ménes, Teke, Kékes, Berkenyes, M.bánd, M.vásárh., Bánok-Doboka, Moró-Tötör. — Torda (Wolff 63)
935. *P. mollissima* Kern. — (EK. 287) — In silvis omnibus frequens.
936. *Myosotis palustris* (L.) Nath. — Frequens, in formis multis, sic *a. strigulosa* (Rchb.) Hay., *b. memor* Kitt. (cf. Soó BK. XXIII. 150, Ny. Kv. 426) — *c. elatior* Opiz — Kv. Szénafű (Ny. l. c.) — *d. laxiflora* (Rchb.) — Kv. Szénafű (Schur l. c.)
937. *M. caespitosa* Schultz — Kékes (Pr. Cp. 78) an vero?
938. *M. sparsiflora* Mikan f. — Kv. Szt.györgyh. (Soó Kv. 644), Bonchida (Soó 114), Sz.újvár (K. et O. 17, Pr. Cp. 100)
939. *M. mierantha* Pall. — Kv. Szénafű (Soó GM. 87, 91, Ny. Kv. 426, Bélteki ap. Ny. l. c.), Szamosfa-Apahida (Ny. l. c.), Szabéd (Szakmáry 118)
940. *M. collina* Hoffm. ? = *M. hispida* Schlechtd. — Kv. Szénafű (Soó GM. 87, 91, Ny. Kv. 427), Sz.újvár (K. et O. 17), M.vásárh. (Ny. Mv. 88)
941. *M. arvensis* (L.) Hill. — Frequens. — *b. silvestris* Schlecht. — Sz.újvár (Hg. II. 67), Torda (Ercsei 105 sub „*M. silvatrica*“?)
942. *M. alpestris* Schm. ssp. *stenophylla* (Knauf) Vestergr., (*M. montana*, *M. suaveolens* auct.) — Kv. Szénafű (Soó GM. 91, Kv. 427, BK. XXIII. 157, Pr. Cp. 133, auct. plurimi ap. Ny. Kv. 427, FER. 1551), Kolozs, K.bós, Virágosv., (Freyn 102), Doboka-Moró (Hg. I. 128 sub „*M. silvatrica*“ — anne 941b.?)
943. *Lithospermum arvense* L. — Frequens. — *lus. coeruleascens* DC. (*coeruleum* Nyár.) — M.vásárh. (Ny. Mv. 85)
944. *L. officinale* L. — Kv. Szénafű, Melegv. (Pr. Cp. 96, auct. plures, Soó, Ny. Kv. 428, Hg. Kv. 664), A.zsuk (Pr. Cp. 152), Apahida (Pr. ap. Ny. l. c.), Dezmér-Pata (Ny. l. c.), K.bós, Virágosv., Ördön-gosv. (Freyn 101), Torda (Ercsei 85, Wolff 63,), Dés (Czetz 17), M.vásárh. (Ny. Mv. 85), Bonchida(?)
945. *L. purpuro-coeruleum* L. — (EK. 288) — Kv. Szénafű, Fejér, Apahida, Dezmér, Kolozs, Sz.újvár, Szu.németi, Bonchida-Szék, Sz.jenő, Iklód, Szék, Szabéd, Mojos, Gerend, M.bánd, M.vásárh., K.borsa, Moró-Tötör. — Dés (Czetz 17), Torda (Ercsei 86, Wolff 63)
946. *Onosma arenaria* W. et K. ssp. *pseudarenaria* (Schur) Jáv. — (AGH. II. 100) — Kv. Szénafű, Apahida-Korpád, Kolozs, K.bós,

M.szovát-M.gyéres, Torda, Gerend. — Tarcsa (Bélteki ap. Ny. Kv. 428) Szék(!)

947. *Cerinthe minor* L. — Frequens. — b. *indigotisans* (Borb.) Jav. — Kv. Szénafű, Melegv. (Borb. Orvos-Termt. Ért. 1899. 250, Soó BK. XXII. 70, GM. 118, Pr. Cp. 95, Richt., Ny. Kv. 420, Ujv. Kv. 664)

948. *Echium rubrum* Jacq. — Kv. Szénafű, Melegv., Fejér (Schur En. 471, Landoz EM. II. 34, Andrae BZ. XIII. 704, Soó GM. 86—91, Pr. Cp. 95, 134—8, Meusel 201, 301, Ghisa BCl. XXI. 60, auct. multi ap. Ny. Kv. 428, Soó AGH. V. 143—9, Kv. 664 — FER. 1736), A.zsuk (Ny. I. c.), K.borsa-Válaszút (Soó AGH. V. 144), Keesed, Moró-Tötör (Hg. I. 126—7), Kérő (Czetz 14), Ö.füzes (K. et O. 11), Bonchida-Kisiklód-Szék, Cege, Feketelak (Soó 114), Kékes, M.záh (Pr. Cp. 144, 146), M.szovát (Péterfi MBL. XVII. 59, Pop Guide 165, Pr. Fl. II. 212), Apahida (Schur En. 471, Ny. Kv. 428, Soó AGH. V. 144, 153), Kolozs (Schur I. c., Freyn 101), K.bós, Virágosv. (Freyn 101), Torda (Ercsei 82, Wolff 63, FEAH. 2939), Gerend (Wolff I. c.), Báld (Pr. FK. 1914. 314), Szabéd (Szakmáry 118), Mojos (Lengy. ap. Soó 114), Faragó-N.nyulas (Ny. ap. Soó 114), M.vásárh. (Ny. Mv. 86, ap. Pr. Cp. 107)

949. *E. vulgare* L. — Frequens.

Dubia : *E. altissimum* Jacq. — Torda (Ercsei 82)

Verbanaceae.

950. *Verbena officinalis* L. — Frequens.

Labiatae.

951. *Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb. — Frequens.

952. *A. Laxmanni* (L.) Benth. — Kv. Szénafű, Melegv., Tarcsa (Schur VSV. X. 106, Winkler 50, Hayek 466, Soó GM. 91, AGH. V. 143, 148—9, Pr. Cp. 95—6, 135, auct. multi ap. Ny. Kv. 431) — Szmofa (Richt. Hb. Norm. 5311), A.zsuk (Ny. I. c.), Apahida (Soó AGH. V. 144, 149), Kolozs (!Bgt. II. 152, Freyn 101), K.bós, Berkenyes, Virágosv. (Freyn 101), Torda, Gerend, M.tóhát, M.pagocsa (Ercsei 154), M.záh (Ercsei I. c., Pr. Cp. 93), M.kók (Simk. En. 454), M.szovát (Péterfi MBL. XVII. 59, Pop Guide 165, Borza Guide 207, Pr. Fl. II. 212), Kékes, Sz.ençs, Budatelek (Pr. Cp. 92, 94, 145), Sz.újvár (Pr. Cp. 118, Soó AGH. V. 144), K.borsa-Válaszút (Soó I. c.), Doboka-Tötör-Moró, Kecsed (Hg. I. 126—9), Fejér, Telekfarka-Apahida, Bonchida-Kiklód-Szék, Szék, Feketelak, Vszt.gothárd, Omboztelek etc. (Soó 114), Mojos, Szabéd (Lengy. ap. Soó 114), Sóspatak (Ny. ap. Soó 114), M.vásárh. (Ny. Mv. 92, ap. Pr. Cp. 96) — b. *isophylla* Borb. — Kv. Szénafű (Borb. Orvos-Termt. Ért. 1899. 249)

953. *A. genevensis* L. — Frequens. — b. *foliosa* (Tratt.) Beck — Kv. Szénafű (Borb. ap. Ny. Kv. 431, Ujv. Kv. 664) — lus. *roseiflora* Koch — Dezmér (Soó Kv. 664), Virágosv. (Freyn 100)

954. *A. reptans* L. — (EK. 288) — (*A. pyramidalis* auct.) — Kv. Szénafű, Fejér, Ajton, Kolozs, Korpád, Kályán, Bonchida, Sz.jenő, Szék, Cege, Pujon, Vszt.egyed, Sz.újvár, F.mikola, B.váralja, Szu-

németi, Coptelke, Teke, M.vásárh., Bánok-Doboka, Moró-Tötör. — Torda (Ercsei 79), Dés-Somkút (Andrae BZ. XIII. 823)

954a. *A. oblongata* M. B. (*A. salicifolia* auct.) — (AGH. V. 163) — Faragó (Janka 598), Kékes (Pr. MBL. V. 32), Sz.újvár (K. et O. 3) Planta in Transsilvania dubia, exemplaria in herbariis nulla.

955. *A. genevensis* × *reptans* (*A. hybrida* Kern.) — M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 102)

956. *Teucrium montanum* L. — Kv. Szénafű (Soó GM. 92, 98—9, AGH. V. 146, Pr. Cp. 141—2, Ghisa BCl. XXI. 61, Meusel 201, 301, auct. plures ap. Ny. Kv. 432), Apahida (Soó AGH. V. 144, auct. plures ap. Ny. Kv. 432), Kolozs (!Bgt. II. 154, Freyn 100), K.bós (Freyn Ny. I. c.), Berkenyes (Freyn 100), Torda (Bgt. I. c., Freyn 100, Wolff 64), M.csán (Ercsei 154), Fejér, Telekfarka-Apahida-Dezmér, Szék(!), Apahida-Kályán, Bonchida-Kisiklód (Soó 114), M.szovát-M.gyéres (Péterfi MBL. XVII. 59—60, Borza Guide 207, Pr. Fl. II. 212), Mócs, M-bánd-M.bergenye (Pr. Cp. 94, 153), Szabéd (Szakmáry 118), Sz.újvár (!K. et O. 24), K.borsa-Válaszút (Soó AGH. V. 144) Planta nostra ad var. (tr.) *subvillosum* Soó pertinet.

957. *T. chamaedrys* L. — Frequens. — b. *foliicomum* Borb. — Kv. Szénafű (Schmidt ap. Ny. Kv. 432) — e. *glanduliferum* Hausskn. (*viride* Beck) Kolozs, K.bós (Freyn, Ny. ap. Rechinger fil. Bot. Arch. 1941. 356), Torda (Paul ap. Rech. f. I. c.)

958. *T. seordium* L. — Kv. Szénafű (!Ny. FK. 1941. 45, 48, FER. 1558b, auct. plures ap. Ny. Kv. 432), Apahida (Barth 115)

959. *Scutellaria galericulata* L. — Frequens.

960. *S. hastifolia* L. — Kv. Szénafű (Ny. FK. 46, auct. plures ap. Ny. Kv. 433, Ujv. Kv. 644), Apahida (Soó Kv. 644), Kolozs, K.bós (Freyn 99), K.borsa(!), Kecsed (Hg. I. 126), Sz.újvár (K. et O. 23), Szék(!), Torda (Wolff 61), M.vásárh. (Ny. Mv. 89)

961. *S. altissima* L. — G.keresztür (Wolff 64), an vero?

Delenda : *S. supina* L. (AGH. V. 163) — M.vásárh. (Schur En. 542)

962. *Marrubium vulgare* L. — Szmofa, Jósikatanya (Joó, Soó Kv. 433, Ujv. Kv. 644), Kolozs, K.bós, Berkenyes, Virágosv., A.gyéres (Freyn 100), Torda (Ercsei 121), Bonchida(!)

963. *M. peregrinum* L. — Apahida-Kályán (Schur En. 541, Richt., Zsák, Ny. Soó Kv. 433), Kolozs (Schur I. c., Ny. I. c.), Berkenyes, Torda (Freyn 100), A.gyéres (Wolff 64)

964. *M. praecox* Janka — Kolozs, Berkenyes, M.csán (Freyn 100), M.záh (Janka MTK. XII. 181, Barth 115, Pr. Cp. 146), Cseh telke, M.fráta (Janka I. c.), M.tóhát (Barth 115), Gerend-Egerbegy (Wolff 64, ap. Janka I. c.), A.zsuk (Pr. Fl. II. 219)

965. *M. peregrinum* × *vulgare* (*M. remotum* Kit.) — Kv. Szénafű-Kajántó (Landoz EM. II. 35 sub „*M. candidissimo*“ ex Soó BK. XXII. 76, Soó GM. 99), Apahida-Kályán (Soó BK. XXIII. 150, Borza-Péterfi FER. 74, Richt., Ny. Kv. 433), Kolozs (Bgt. II. 176 sub „*M. cretico*“, Schur VSV. X. 112, Ny. I. c.), Mezőség (Bgt. I. c.)

966. *Sideritis montana* L. — Mezőség (Bgt. II. 158), Apahida (Butujás, Pr., Soó, Ny. Kv. 434), Kolozs, K.bós, Berkenyes, Virágosv., A.gyéres (Freyn 100), Torda (Ercsei 26, Wolff 64, Freyn 100),

M.szovát-M.gyéres, Torda, Gerend. — Tarcsa (Bélteki ap. Ny. Kv. 428) Szék(!)

947. *Cerinthe minor* L. — Frequens. — **b. indigotisans** (Borb.) Játv. — Kv. Szénafű, Melegv. (Borb. Orvos-Termt. Ért. 1899. 250, Soó BK. XXII. 70, GM. 118, Pr. Cp. 95, Richt., Ny. Kv. 420, Ujv. Kv. 664)

948. *Echium rubrum* Jacq. — Kv. Szénafű, Melegv., Fejér (Schur En. 471, Landoz EM. II. 34, Andrae BZ. XIII. 704, Soó GM. 86—91, Pr. Cp. 95, 134—8, Meusel 201, 301, Ghisa BCl. XXI. 60, auct. multi ap. Ny. Kv. 428, Soó AGH. V. 143—9, Kv. 664 — FER. 1736), A.zsuk (Ny. I. c.), K.borsa-Válaszút (Soó AGH. V. 144), Keesed, Moró-Tötör (Hg. I. 126—7), Kérő (Czetz 14), Ö.füzes (K. et O. 11), Bonchida-Kisiklód-Szék, Cege, Feketelak (Soó 114), Kékes, M.záh (Pr. Cp. 144, 146), M.szovát (Péterfi MBL. XVII. 59, Pop Guide 165, Pr. Fl. II. 212), Apahida (Schur En. 471, Ny. Kv. 428, Soó AGH. V. 144, 153), Kolozs (Schur I. c., Freyn 101), K.bós, Virágosv. (Freyn 101), Torda (Ercsei 82, Wolff 63, FEAH. 2939), Gerend (Wolff I. c.), Báld (Pr. FK. 1914. 314), Szabéd (Szakmáry 118), Mojos (Lengy. ap. Soó 114), Faragó-N.nyulas (Ny. ap. Soó 114), M.vásárh. (Ny. Mv. 86, ap. Pr. Cp. 107)

949. *E. vulgare* L. — Frequens.

Dubia : *E. altissimum* Jacq. — Torda (Ercsei 82)

Verbanaceae.

950. *Verbena officinalis* L. — Frequens.

Labiatae.

951. *Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb. — Frequens.

952. *A. Laxmanni* (L.) Benth. — Kv. Szénafű, Melegv., Tarcsa (Schur VSV. X. 106, Winkler 50, Hayek 466, Soó GM. 91, AGH. V. 143, 148—9, Pr. Cp. 95—6, 135, auct. multi ap. Ny. Kv. 431) — Szmofa (Richt. Hb. Norm. 5311), A.zsuk (Ny. I. c.), Apahida (Soó AGH. V. 144, 149), Kolozs (!Bgt. II. 152, Freyn 101), K.bós, Berkenyes, Virágosv. (Freyn 101), Torda, Gerend, M.tóhát, M.pagocsa (Ercsei 154), M.záh (Ercsei I. c., Pr. Cp. 93), M.kók (Simk. En. 454), M.szovát (Péterfi MBL. XVII. 59, Pop Guide 165, Borza Guide 207, Pr. Fl. II. 212), Kékes, Sz.encs, Budatelek (Pr. Cp. 92, 94, 145), Sz.újvár (Pr. Cp. 118, Soó AGH. V. 144), K.borsa-Válaszút (Soó I. c.), Doboka-Tötör-Moró, Kecsed (Hg. I. 126—9), Fejér, Telekfarka-Apahida, Bonchida-Kiklód-Szék, Szék, Feketelak, Vszt.gothárd, Omboztelek etc. (Soó 114), Mojos, Szabéd (Lengy. ap. Soó 114), Sóspatak (Ny. ap. Soó 114), M.vásárh. (Ny. Mv. 92, ap. Pr. Cp. 96) — **b. isophylla** Borb. — Kv. Szénafű (Borb. Orvos-Termt. Ért. 1899. 249)

953. *A. genevensis* L. — Frequens. — **b. foliosa** (Tratt.) Beck — Kv. Szénafű (Borb. ap. Ny. Kv. 431, Ujv. Kv. 664) — *lus. roseiflora* Koch — Dezmér (Soó Kv. 664), Virágosv. (Freyn 100)

954. *A. reptans* L. — (EK. 288) — (*A. pyramidalis* auct.) — Kv. Szénafű, Fejér, Ajton, Kolozs, Korpád, Kálván, Bonchida, Sz.jenő, Szék, Cege, Pujon, Vszt.egyed, Sz.újvár, F.mikola, B.váralja, Szu-

németi, Coptelke, Teke, M.vásárh., Bánok-Doboka, Moró-Tötör. — Torda (Ercsei 79), Dés-Somkút (Andrae BZ. XIII. 823)

954a. *A. oblongata* M. B. (*A. salicifolia* auct.) — (AGH. V. 163) — Faragó (Janka 598), Kékes (Pr. MBL. V. 32), Sz.újvár (K. et O. 3) Planta in Transsilvania dubia, exemplaria in herbariis nulla.

955. *A. genevensis* × *reptans* (*A. hybrida* Kern.) — M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 102)

956. *Teucrium montanum* L. — Kv. Szénafű (Soó GM. 92, 98—9, AGH. V. 146, Pr. Cp. 141—2, Ghisa BCl. XXI. 61, Meusel 201, 301, auct. plures ap. Ny. Kv. 432), Apahida (Soó AGH. V. 144, auct. plures ap. Ny. Kv. 432), Kolozs (!Bgt. II. 154, Freyn 100), K.bós (Freyn Ny. I. c.), Berkenyes (Freyn 100), Torda (Bgt. I. c., Freyn 100, Wolff 64), M.csán (Ercsei 154), Fejér, Telekfarka-Apahida-Dezmér, Szék(!), Apahida-Kálván, Bonchida-Kisiklód (Soó 114), M.szovát-M.gyéres (Péterfi MBL. XVII. 59—60, Borza Guide 207, Pr. Fl. II. 212), Mócs, M-bánd-M.bergenye (Pr. Cp. 94, 153), Szabéd (Szakmáry 118), Sz.újvár (!K. et O. 24), K.borsa-Válaszút (Soó AGH. V. 144) Planta nostra ad var. (tr.) *subvillosum* Soó pertinet.

957. *T. chamaedrys* L. — Frequens. — **b. foliicomum** Borb. — Kv. Szénafű (Schmidt ap. Ny. Kv. 432) — **c. glanduliferum** Hausskn. (*viride* Beck) Kolozs, K.bós (Freyn, Ny. ap. Rechinger fil. Bot. Arch. 1941. 356), Torda (Paul ap. Rech. f. I. c.)

958. *T. seordium* L. — Kv. Szénafű (!Ny. FK. 1941. 45, 48, FER. 1558b, auct. plures ap. Ny. Kv. 432), Apahida (Barth 115)

959. *Scutellaria galericulata* L. — Frequens.

960. *S. hastifolia* L. — Kv. Szénafű (Ny. FK. 46, auct. plures ap. Ny. Kv. 433, Ujv. Kv. 644), Apahida (Soó Kv. 644), Kolozs, K.bós (Freyn 99), K.borsa(!), Kecsed (Hg. I. 126), Sz.újvár (K. et O. 23), Szék(!), Torda (Wolff 61), M.vásárh. (Ny. Mv. 89)

961. *S. altissima* L. — G.keresztúr (Wolff 64), an vero?

Delenda : *S. supina* L. (AGH. V. 163) — M.vásárh. (Schur En. 542)

962. *Marrubium vulgare* L. — Szmofa, Jósikatanya (Joó, Soó Kv. 433, Ujv. Kv. 644), Kolozs, K.bós, Berkenyes, Virágosv., A.gyéres (Freyn 100), Torda (Ercsei 121), Bonchida(!)

963. *M. peregrinum* L. — Apahida-Kálván (Schur En. 541, Richt., Zsák, Ny. Soó Kv. 433), Kolozs (Schur I. c., Ny. I. c.), Berkenyes, Torda (Freyn 100), A.gyéres (Wolff 64)

964. *M. praecox* Janka — Kolozs, Berkenyes, M.csán (Freyn 100), M.záh (Janka MTK. XII. 181, Barth 115, Pr. Cp. 146), Cseh telke, M.fráta (Janka I. c.), M.tóhát (Barth 115), Gerend-Egerbegy (Wolff 64, ap. Janka I. c.), A.zsuk (Pr. Fl. II. 219)

965. *M. peregrinum* × *vulgare* (*M. remotum* Kit.) — Kv. Szénafű-Kajántó (Landoz EM. II. 35 sub „*M. candidissimo*“ ex Soó BK. XXII. 76, Soó GM. 99), Apahida-Kálván (Soó BK. XXIII. 150, Borza-Péterfi FER. 74, Richt., Ny. Kv. 433), Kolozs (Bgt. II. 176 sub „*M. cretico*“, Schur VSV. X. 112, Ny. I. c.), Mezőség (Bgt. I. c.)

966. *Sideritis montana* L. — Mezőség (Bgt. II. 158), Apahida (Butujás, Pr., Soó, Ny. Kv. 434), Kolozs, K.bós, Berkenyes, Virágosv., A.gyéres (Freyn 100), Torda (Ercsei 26, Wolff 64, Freyn 100),

Szabéd (Szakmáry 118), M.vásárh.(Ny. Mv. 88), Melegv.-Apahida, Szamosfa, Kályán, Szék(!) — *f. bracteata* Nyár. — Szamosfa (Joó ap. Ny. l. c.), Apahida (Ny. FER. 1320)

967. *Nepeta ueranica* L. — (AGH. V. 163) — Kv. Szénafű „Tekintő-Gella“ (Landoz Kv. I. 13 citata omnia cf. Soó AGH. l. c. V. 147), M.szovát-M.gyéres (Bihari ap. Péterfi MBL. XVII. 59, Pr. Cp. 147, Fl. II. 212), Egerbegy, M.tóhát (Janka 597), Virágosv., „Gorgány“ (Wolff ap. Soó l. c. ap. Ghisa BCI. XXII. 64—66), Csehtelke (Janka ap. Soó l. c.), M.ludas (Alexi ap. Soó l. c.), M.záh, M.fráta (Ghisa l. c.)

968. *N. pannonica* L. — Frequens.

969. *N. eataria* L. — Kolozs, K.bós, Berkenyes, M.csán (Freyn 99), Sz.újvár (K. et O. 17), Torda (Ercsei 41)

Delenda: *Dracocephalum austriacum* L. et *D. moldavica* L. (Torda resp. Gerend : Ercsei 122)

970. *Glechoma hederacea* L. — Frequens, in formis multis (cf. Soó BK. XXIII. 150, Ny. Kv. 436), sic : *b. mierantha* (Bönng.) Rouy, *c. major* Gaud. (incl. *hirtomajor* Nyár.) — Kv. Szénafű, Dezmér (Soó Kv. 664), K.borsa(!) — *d. villosa* Koch — Kv. Szénafű (Ny. Kv. 436)

ssp. hirsuta (W. et K.) Herm. — Kv. Szénafű, Fejér (Soó GM. 83, Kv. 436) — *tr. pannonica* (Borb.) Soó — Kv. Szt.györgyh. (Borb. ap. Ny. Kv. 436), Sz.újvár (K. et O. 13 sub „*G. hirsuta*“), F.mikola (Hg. II. 66)

971. *Prunella vulgaris* L. — Frequens.

972. *P. grandiflora* (L.) Jacq. — Kv. Szénafű, Fejér (Soó GM. 83, 88, 91, Kv. 664, Pr. Cp. 84, auct. multi ap. Ny. Kv. 436, Ujv. Kv. 644, Meusel 201, 300, Ghisa BCI. XXI. 60), Kolozs, K.bós (Freyn 99), Torda (Ercsei 177, Freyn 99), Virágosv. (Ny. FER. 1742), K.borsa-Válaszút(!), Kecsed (Hg. I. 126—7), Sz.újvár (K. et O. 20, Hg. II. 69), Bonchida-Szék, Iklód, Cege, Pujon, Kályán, Korpád (Soó 114)

973. *P. laciniata* L. — Frequens. — *b. subintegra* Hamilt. — Dezmér (Ujv. Kv. 664)

974. *P. grandiflora* × *laciniata* (*P. dissecta* Wender. *a. bicolor* Beck et *b. variabilis* Beck) — Kv. Szénafű (Soó BK. XXII. 72, GM. 91, Kv. 664, Pr. Ny. Kv. 437), Apahida, K.bós (Ny. l. c.), K.borsa(!a.), Kecsed (Hg. I. 127), Sz.újvár (Hg. II. 69), Iklód, Cege (Soó 115)

975. *P. vulgaris* × *laciniata* (*P. pinnatifida* Pers et *b. intermedia* Link) — Kv. Szénafű, Fejér (Soó BK. XXII. 72, GM. 91, Kv. 664, Richt., Greisiger ap. Ny. Kv. 437), Bonchida-K.iklód, Cege (Soó 115)

976. *Melittis melissophyllum* L. — (EK. 288) — Kv. Szénafű, Fejér, Dezmér, Ajton, Apahida, Kolozs, Sz.újvár, F.mikola, B.váralja, Szu.németi, Coptelke, Bonchida-Szék, Iklód, Szék-Vszt.gothárd-Pujon-Cege, Feketelak, Kályán, Korpád, M.szilvás, Báld, P.kamarás, Kékes, Bala-N.ercse, M.vásárh., Bádok-Doboka-Moró. — Torda (Wolff 64)

977. *Phlomis tuberosa* L. — Frequens. — *f. intermedia* Prod. — Torda (Richt. ap. Pr BCI. III. 82) In ditione inter K.borsa et Dés Deesse videtur.

978. *Galeopsis ladanum* L. — *ssp. latifolia* Gaud. — Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 150, cf. Pr. Cp. 166), Szamosfa (Borb. ap. Ny. 438) — *ssp. angustifolia* (Ehrh.) Gaud. *a. canescens* (Schult.) Rchb. —

Frequens. — *b. Kernerii* Briq. — Szamosfa (Soó l. c.), K.bós (Ny. Kv. 438) — *c. campestris* (Timb.) Rouy — Szamosfa (Soó l. c.)

979. *G. tetrahit* L. — Szamosfa (Richt. ap. Ny. Kv. 439), Kolozs (Soó Kv. 645), Sz.újvár (K. et O. 12)

980. *G. speciosa* Mill. — Sz.újvár (K. et O. 12), Bonchida (Soó Erd. Kis. XLVI. 288), Teke (Borza BCI. VIII. 26), Doboka-Moró (Hg. I. 128)

981. *G. pubescens* Bess. — (EK. 288) — Kv. Szénafű, Szamosfa, Sz.újvár, Bonchida, Cege, Vszt.gothárd, Pujon, Apahida, Kályán, Korpád, Kolozs, M.ludas, K.borsa-Válaszút.

982. *Lamium galeobdolon* (L.) Nath. — (EK. 288) — Sz.újvár, Ö.füzes, F.mikola, B.váralja, Szu.németi, Coptelke, Iklód, Szék, Cege-Pujon, Vszt.egyed, Vszt.gothárd, Apahida, Kályán, M.szilvás, M.ménes, Kékes, Berkenyes, M.bánd, Bádok-Doboka-Moró-Tötör. — Torda (Ercsei 102, Wolff 64) — *b. vulgare* (Pers.) Briq. — Fejér (Soó Ujv. Kv. 665), M.vásárh. (Barabás ap. Soó Szf. Suppl. 42)

983. *L. amplexicaule* L. — Frequens.

984. *L. purpureum* L. — Frequens.

985. *L. album* L. — Frequens.

986. *L. maculatum* L. — (EK. 288) — Szamosfa, Sz.újvár, Bonchida, Iklód, Szék, Vszt.gothárd, P.kamarás, N.sármás, Mócs, Szabéd, M.vásárh., Bádok-Doboka-Moró.

987. *Leonurus cardiaca* L. — Frequens, praecipue var. *vilosus* (Desf.) Benth. (cf. Ny. Kv. 441) — *f. integribracteatus* Prod. — Kékes (Pr. BCI. III. 83)

988. *L. marrubiastrum* L. — Kv. Szénafű, Melegv. (Ny. Kv. 440, Pr. Fl. II. 291), Dés (Morariu BCI. XXIII. 178), A.gyéres (Freyn 99), Torda (Borza FER. 1559a.)

989. *Ballota nigra* L. — Frequens.

990. *Stachys officinalis* (L.) Trev. — Frequens. — *b. stricta* (Ait.) Rouy. — Kv. Szénafű (Borb. MNL. X. 117, Soó BK. XXIII. 157), Kályán, Vszt.gothárd (Soó 115)

991. *S. sylvatica* L. — (EK. 289) — Fejér, Dezmér, Sz.újvár, Ö.füzes, F.mikola, B.váralja, Bonchida-Szék, Iklód, Korpád, P.kamarás, Bádok-Doboka.

992. *S. palustris* L. — Frequens. — *f. bracteata* Beck — Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 150)

993. *S. annua* L. — Frequens.

994. *S. recta* L. — Frequens. — *b. stenophylla* (Spr.) Beck. — Kv. Szénafű (Borb. MNL. X. 117 var. *angustata*, Soó BK. XXIII. 150) — *c. epigaea* Griseb. — Kv. Szénafű (Soó BK. XXV. 145)

995. *S. germanica* L. — Frequens.

996. *Salvia glutinosa* L. — (EK. 289) — Sz.újvár, B.váralja, Szu.németi, Coptelke, Vszt.gothárd-Ombozelke. — Ajton (Freyn 98), Torda (Wolff 64, Sebők 35)

997. *S. verticillata* L. — Frequens. — *f. natronata* Pénzes Kv. Melegv. (Simk. ap. Pénzes Borbásia V—VI. 9), *f. quadrauriculata* Pénzes Szabéd (Lengy. ap. Pénzes l. c.)

998. *S. austriaca* Jacq. — Frequens.

999. *S. nutans* L. — (AGH. V. 165—6) — Kv. Szénafű, Fejér,

Melegv. (cf. Soó I. c., etiam Andrae BZ. XIII. 820, Winkler 50, Meusel 201, 301, Soó AGH. V. 145—9, Kv. 665, auct. multi ap. Ny. 444), A.zsuk, Dezmér-Györgyfalva, Apahida, Kolozs, K.bós, Virágosv., Torda, Gerend M.záh, M.szovát, M.gyéres (etiam: Pop, Borza Guide 165, 207, Pr. Fl. II. 212), Vszt.gothárd-Feketelak, Báld, Kékes, Vszt.iván, Faragó-N.nyulas-Körtekapu, Mojos, Bazéd, M.vásárh. — Szabéd (Szakmáry 118), Sz.újvár, K.borsa, K.borsa-Válaszút (Soó AGH. V. 145, 166), Telekfarka-Apahida-Kályán, Bonchida, Kisiklód-Szék, Szék, Pujon, Ombozelke (Soó 115) — b. pseudopendula Schur — Kv. Szénafű (Soó BK. XXII. 72, Bélteki ap. Soó AGH. V. 166), Szék, Pujon (Soó 115) — lus. lilacina Soó — Kv. Szénafű (Soó 115)

1000. S. nemorosa L. — Frequens. — Lusus colorum: albiflora Schur Kv. Szénafű (Richt., Péterfi ap. Ny. Kv. 446, Soó 115, Priszter 91), lus. elövölgynensis Soó Kv. Szénafű (Soó 115), lus. badacsoniensis Soó et lus. purpurea Priszter — Kv. Szt.györgyh. (Priszter I. c.)

1001. S. pratensis L. — Frequens. — b. rostrata (Schm.) Rchb. — Kv. Szénafű (Butujás, Zsák, Ny., Soó Kv. 444) — e. dumetorum (Andrz.) Briq.? (resp. d. parviflora Lec. et Lam.) — Kv. Szénafű (Janka ÖBZ. XVIII. 231), Ö.füzes-Vszt.iván (Janka 594, ÖBZ. XVI. 363), Bonchida-Kisiklód, Szék (Soó 115) — Lusus colorum: rosea Baumg. — Kv. Szénafű, Kajántó (Schmidt ap. Ny. Kv. 444, Ujv. Kv. 665, Soó 115), Cege (Soó 115) — lus. variegata (W. et K.) Ducom. — Virágosv. (Freyen 98)

1002. S. transsilvanica Schur — (AGH. V. 164) — Kv. Szénafű, Melegv. (cf. Soó I. c., etiam Soó AGH. V. 145—7, auct. multi ap. Ny. Kv. 144), Fejér, K.borsa-Válaszút (Soó I. c.), Apahida (etiam Ny. I. c.), Kályán, Kolozs, Korpád, K.bós, K.kara, Virágosv., Torda, Egerbegy (etiam Ghisa BCI. XXII. 64), Gerend, Sz.kocsárd, M.szovát-M.gyéres, Vszt.gothárd, Moró-Tötör, Bonchida-Kisiklód, Kályán, Ombozelke (Soó 115) Szék(!)

1003. S. nemorosa × nutans (S. betonicifolia Etling) et b. Kanitziana Simk. — (AGH. V. 167) — Kv. Szénafű, Melegv., Tarcsa, Fejér (cf. Soó I. c., etiam Andrae BZ. XIII. 820, Winkler 50, auct. multi ap. Ny. Kv. 445, Soó AGH. V. 145, Kv. 665), Apahida, Kolozs, K.bós, Virágosv., Torda, Egerbegy, M.záh, M.szovát-M.gyéres (etiam Pop, Borza Guide 165, 207, Pr. Fl. II. 212), Sz.újvár (Soó AGH. V. 145), Vszt.gothárd-Feketelak, Faragó-N.nyulas-Körtekapu, Bazéd, M.ménes, K.borsa-Válaszút (Soó I. c.), Apahida-Kályán (Soó 115)

1004. S. nemorosa × pratensis (S. silvestris L.) — Kv. Szénafű, Tarcsa (Janka ÖBZ. XVIII. 231, Borb. Orvos-Term. Ért. 1899. 250, Soó GM. 91, Pr. Cp. 95, auct. multi ap. Ny. Kv. 445), Apahida (Csűrös Kv. 665)

1005. S. nemorosa × transsilvanica (S. hybrida Schur) — (AGH. V. 166) — Kv. Szénafű, Jósikatanya, Apahida, Kolozs, Korpád, K.kara, Torda.

1006. S. nutans × pratensis (S. Simonkaiana Borb.) — Kv. Szénafű (Borb. Orvos-Term. Ért. 1899. 250, BK. I. 27, Entz M. ap. Soó BK. XXVIII. 129, Soó GM. 91, Péterfi, Richt., Boros, Ny. ap. Soó AGH. V. 166, Kv. 665, Ujv. Kv. 665), Apahida (Ny. ap. Soó I. c.)

1007. S. nutans × transsilvanica (S. Telekiana Simk. et Thaisz) —

Kv. Szénafű, Jósikatanya (Pr. Cp. 94—5, Péterfi, Soó AGH. V. 166) 1007a. S. nemorosa × nutans × pratensis (S. Soói Vajda) — Kv. Szénafű (Vajda Scripta II. 141)

1008. Satureia vulgaris (L.) Fritsch — (EK. 289) — Kv. Szénafű, Fejér, Sz.újvár, B.váralja, Bonchida-Szék, Iklód, Szék-Vszt.egyed-Pujon, Kályán, Korpád, Kékes, Mócs.

1009. S. acinos (L.) Scheele — Ferquens, etiam b. villosa (Pers.) Hay. S. hortensis L. Subspont. — Kolozsvár-Apahida (Priszter 88)

1010. Origanum vulgare L. — (EK. 289) — Kv. Szénafű, Fejér, Dezmér, Sz.újvár, F.mikola, Bonchida-Szék, Szék-Vszt.egyed etc., Mócs. — Torda (Ercsei 107)

1011. Thymus comosus Heuff. — (a. transsilvanicus Schur) — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 106, ap. Ny. 448, Borb, MTK. XXIV. 2, 111., Soó Kv. 665 : Morgó!)

1012. Th. dacicus Borb. — Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 157 ad Th. glabrescens* pratensis verg.) Torda (Sebők 35) — b. abbreviatus Lyka — Kv. Szénafű (Soó I. c. ad Th. glabr. *csikensis verg.) — c. coronensis Lyka — M.csávás (Lyka in Jav. M. Fl. 899)

1013. Th. ovatus Mill. (Th. chamaedrys auct.) = Th. pulegioides L. em. Ronn. — Sz.újvár (Hg. II. 69 a. Poreii Borb. et b. adscendens W. et Gr.), Kékes (Pr. MBL. V. 32, Pr. Cp. 93 a. Poreii) K.borsa(!), Torda (Ercsei 43 „Havasi démutka“)?

1014. Th. Marschallianus Willd. (incl. Th. brachiphyllus Lyka et auct. Hung. Th. auctus Lyka p. p.) — a. (typicus) M.szovát (Borza Guide 207, Ny. Kv. 451) — b. simulans Lyka Kv. Melegv., M.szovát (Ny. I. c.) — e. calvifrons Borb. et Br. — K.bós (Ny. I. c. non typ.) — d. tornensis Lyka — Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 157) — e. leptcephalus Ronn. (Th. brachiphyllus Lyka non Opiz) — Kv. Szénafű, Ajton, K.bós (Ny. I. c.), Torda-Sós. (Pr. Fl. I. 790) — ea. Koste — letzkyanus auct. non Opiz (quod est Th. pannonicus!) — Kv. Szénafű (Ny. I. c.) — f. angustissimus Borb. (ad Th. pann.) Kv. Szénafű (Ny. I. c.) — g. pratensis Lyka — Szamosfa (Soó Kv. 665) — h. piligerus Opiz (ad Th. pann.) — Kv. Szénafű (Ny. I. c.) — i. aridus Lyka — Szamosfa (Soó I. c., Consp. 56) — j. auctus Lyka — Kv. Szénafű Fejér, Melegv. (Soó, Ny. Kv. 450), Apahida (Soó in Gr. 247), K.bós-Virágosv. (Ny. I. c.), K.borsa(!), Kecsed, Moró-Tötör (Hg. I. 126—7 cum?), B.váralja (Hg. III. 126), M.szovát (Pop Guide 165, Pr. Fl. II. 212), A.zsuk, Kolozs (Pr. I. c. 219, 295) — k. dasypogon Lyka — M.szovát (Pr. Fl. I. 1252) — l. Eisensteinianus Opiz (ad Th. pann.) — K.bós-Virágosv. (Ny. I. c., Pr. Fl. I. 1251) — m. grandis Lyka — Apahida (Soó Kv. 665), Nyulas-Faragó (Pr. Fl. I. 1252) — n. Moeszii Lyka (ad Th. pann.) — Kecsed (Hg. I. 126) — o. elongatus Opiz — K.bós-Virágosv. (Ny. I. c.) — p. arenicola H. Br. — Szamosfa (Soó BK. I. c.), Kecsed (Hg. I. c.)

1015. Th. pannonicus All. em. Ronn. (Th. lanuginosus auct.) continet var.-es ea., f., h., k., m. speciei praecedentis.*)

1016. Th. glabrescens Willd. (Th. collinus auct.) — Frequens, in

* Th. lanuginosus auct. (Pr. MBL. V. 32, FK. 1914. 313, Cp. 92—153 plur. loc.) e Kotozsvár, Kékes, Báld, M.záh, Sz.eucs, Mócs, M.bánd M.bergenye. Apahida ad Th. pannonicum vel ad Th. austriacum pertinet

formis multis. **a.** (typicus) — Kv. Szénafü, A.zsuk, Apahida (Ny. Kv. 449) — **b. Lövyanus** Opiz — Kv. Szénafü (Issler BCI. XI. 65) — **e. sparsipilus** Borb. (ad *Th. austriacum Th. lanuginosus* auct.*.) — Kv. Szénafü (Ny. FER. 2055, Issler I. c., Ghisa BCI. XXI. 60) — **d. euryphyllus** Borb. — Kv. Szénafü (Soó BK. XXIII. 157 non typ.) — **e. eu-**
l. c. — **f. firmus** Lyka — Faragó (Jáv. Magy. Fl. 894), Kv. Szénafü (Soó I. c. non typ.) — **g. serpens** Opiz — Kv. Szénafü, Fejér, Ajton (Ny. I. c.), Szszt.miklós-Apahida, Kolozs (Soó Kv. 665), B.váralja (Hg. III. 125—8) — **h. claudiopolitanus** Nyár. — Kv. Szénafü (Ny. I. c.) — **i. esikensis** Lyka — Kv. Szénafü (Soó BK. I. c.), Apahida (Soó Kv. 665) — **j. loessaceus** Lyka — Kv. Szénafü (Ny. I. c.), Kolozs (Soó Kv. 665), B.váralja (Hg. III. 126) — **k. austriacus** Bernh. (species propinqua) — (*Th. lanuginosus* auct.*.) Kv. Szénafü (Richt. Soó, Ny. Kv. 450, Pr. Cp. 135—142?), Kolozs (Soó Kv. 665 ad I. verg.), Torda, Felvinc (Haynald ap. Borb. MTK. XXIV/2. 103) — **l. Nyárádyanus** 1017. **Th. austriacus** Bernh. (*Th. lanuginosus* auct.) — continent var.-es **e. e. k. l.** speciei praecentis.

1018. **Th. glabrescens × Marschallianus.** (Huc: *brachiphyllus* × I. c.) *glabrescens et auctus × glabrescens* Nyár. Kv. 452) — Kv. Szénafü (Ny. I. c.)

1018a. **Th. ovatus × auctus.** Kékes (Pr. Fl. I. 1253)

1019. **Lycopus europaeus** L. — Frequens, in formis multis: *pubescens* et *glabrescens* Schmidely — **b. semipinnatus** Borb. — Kv. — Szamosfa (Ny. Kv. 453)

1012. **L. exaltatus** L. f. — Kv. Szénafü (Soó GM. 95, Ny. FK.) 43, 48, Kv. 453), Kv.-Szamosfa (Wolff, Joó, Bélteki ap. Ny. I. c.) Bonchida(!)

1021. **Mentha pulegium** L. — Szamosfa, Apahida (Soó BK. XXV. 145 in Gr. 250, Ny. Kv. 453 — **b. erecta** Wirtg., **c. thymoides** Opiz), Kolozs (Schur En. 519), Magasmart (Pr. ap. Topitz MBL. XV. 166, Top.), Cege (Pr. Cp. 50), Szújvár (K. et O. 20), Torda (Ercsei 104) — *M. rotundifolia* (L.) Huds. — Virágosv. (Barth. ap. Ny. Kv. 453) — *f. gracilis* Malinv.) Spontanea?

M. piperita L. — Torda (Sebők 35) Subspontanea?

1022. **M. longifolia** (L.) Nath. — Frequens, in formis plurimis. — (cf. Soó Scripta I. 109, Ny. Kv. 458—63)

Silvestres: (*ssp. longifolia* Briq.) **b. brevifrons** (Borb.) Briq. — Apahida (Soó Scr. I. 110 f. *pseudo-Richteri* Trautm.) — **e. dentifera** Nyár. et Ujvárosi Apahida (Ujv. Kv. 655) — **d. falcata** Trautm. — Kajántóvölgy (Soó I. c. 109 f. *claudiopolitanus* Soó) — **e. hapalophylla** Briq. — Szénafü (Soó Kv. 460) — **f. jurana** (Ses. et Dur.), Briq. — Kv. Szénafü (Soó BK. XXV. 146), Apahida (Soó Scr. I. c. sub „*M. coeruleascens*” Opiz“?) cf. Ny. Kv. 460 — **g. Laggeri** (Des. et Dur.), Briq. — Szamosfa (Borb. ap. Ny. I. c.) — **h. pascua** Top. — Szamosfa (Soó BK. I. c.) — **i. szamosiana** Top. — Szamosfa (Pr. ap. Top. MBL. XV. 126, Fl. I. 803)

Grisellae (*ssp. grisella* Briq.): **b. brassóensis** Top. — M.ludas

(Ny. ap. Top. 108, MBL. XV. 136) — **e. firmieaulis** Briq. — Kv. Szénafü (Soó BK. I. c., Scr. I. c. cum *f. Landozii* Soó) — **d. Hollósyana** Kékes (Pr. BCI. V. 112, Fl. I. 818, *f. angustifolia* Prod.) — **g. leio-neura** (Borb.) Top. — Torda (L. Richt. ap. Top. I. c. 136 *f. hebosa* Top.), Cege (Pr. MBL. XV. 256, *f. hebosa*) — **h. pachystachya** (Borb.) — Kv. Szénafü (Soó Kv. 462) — **i. paramecophyllum** — Top. Szamosfa (Soó Kv. 461), M.ludas (Ny. ap. Top. I. c. 135), *f. szolnokensis* Top. — Kékes (Prod. ap. Top. I. c. 125, Fl. I. 817) — **j. phaecoma** Briq. — Apahida, Kolozs (Richt. ap. Ny. Kv. 461) — **ja. Fussii** Trautm. — Kv. Szénafü (Soó BK. I. c., Scr. I. c.) — **k. Rocheliana** Borb. et Br. — Szamosfa (Butujás ap. Ny. Kv. 461) — **l. striata** Prod. — A.zsuk (Pr. BCI. V. 112, Fl. I. 814) — **m. striatula** Prod. — A.zsuk (Pr. I. c. 812) — **n. subviridis** Borb. (*viridescens* Borb.) — M.ludas (Ny. ap. Top. I. c. 134) — **o. subamplexifolia** Prod. — A.zsuk (Pr. BCI. V. 113, Fl. I. 817), Dezmér (Pr. I. c. *f. rotundibracteata* Prod.) — **p. tenuior** Prod. — Szújvár (Pr. BCI. V. 112, Fl. I. 812) — **f. melesensis** Prod. — Kékes (Pr. I. c.) — **f. campiensis** Prod. — Apáti-M.borzás (Pr. BCI. V. 111, Fl. 814) — **r. Wierzbickiana** (Opiz) Briq. — M.ludas (Ny. ap. Top. I. c.)

Molles: **a. acuminata** Top. — Kékes (Pr. ap. Top. I. c. 132, Fl. I. 821 f. *arthrostachya* Top.) — **b. Amaliae** Prod. — Kékes (Prod. BCI. V. 105, Fl. 819) — **c. dejmerii** Prod. — Szamosfa (Soó Kv. 462), Dezmér (Pr. BCI. V. 106, Fl. I. 820) — **d. lignosa** Prod. — A.zsuk (Pr. I. c.) — **e. retinervis** Borb. — Kv. Szénafü (Soó Scr. I. 108 *f. multiramosa* Trautm.) — **f. subpyramidalis** Prod. — Kv. Szénafü (Pr. BCI. V. 107, Fl. I. 822 cum *f. irregularis* et *paucidentata* Prod.) ad *var. Dumortieri* (Des. et Dur.) Top.? — **g. subpyramidaliformis** Prod. — Kv. Szénafü (Pr. I. c.)

1023. **M. dumetorum (aquatica — longifolia)** Schult. — **a. Emiliae** Prod. — Kékes (Pr. BCI. V. 115, Fl. I. 834 cum *f. minor* Pr.) — **b. Grintesui** Prod. — Dés-Désakna (Pr. I. c. 116, Fl. I. 835) — **c. Nyárádyana** Pr. — Kékes (Pr. I. c. 117, Fl. I. 836) Etiam ad fines terr. Kv. Várostója (Borb. ap. Ny. Kv. 455, Pr. Fl. II. 342)*

1024. **M. aquatica** L. — Kv. Szénafü (Soó GM. 95), Ajton (Ny. EM. 1914. 129), Vszt.iván (K. et O. 17), Vszt.gothárd (Janka 593, ÖBZ. VIII. 366), M.záh (Simk. En. 437), Cege, Báld-N.sármás (Pr. Cp. 50, 59), Torda (Ercsei 104) — **b. capitata** (Opiz) Top. — M.záh (Simk. ap. Top. 139, Pr. Fl. I. 824) — **c. denticulata** (Strail.) Apahida (Soó Scr. I. 110) — **d. limosa** Schur — Apahida (Csűrös Kv. 655) — ad c. vel **e. illensis** Top. — M.ujvár (Ny. ap. Top. I. c. 142) — **f. polyanthetica** Top. — Apahida (Csűrös Kv. 655) — **g. riparia** Schreb. — Szamosfa (Butujás, Schmidt ap. Ny. Kv. 454), M.vásárh. (Bgt. II. 163) — **h. Stoderiana** Top. — M.záh (Ny. ap. Top. I. c. 141)

1025. **M. arvensis** L.

ssp. agrestis (Sole) Briq. — Torda (Ercsei 104) — **b. nummularia** (Schreb.) Top. — Kékes (Pr. ap. Top. I. c. 146, Pr. Fl. I. 829) — **e. sil-**

* Anne ad *M. dumetorum* pertinent: Szújvár (K. et O. 17 sub „*M. nepetoides*“) Kolozs, M.ujvár (Schur En. 514 sub *M. parvifolia* Schur sec. Borb. TF. XIII. 79 : *M. dumetorum brachystachya* Borb. var. *stenodonta* Borb.) — sed *stenodonta* Borb. sec. Trautm. ad *M. arvense* L. pertinet.)

vieola (H. Br.) Top. — Sz.kocsárd (Ny. ap. Top. 145), M.vásárh. (Ny. ap. Tóp. l. c., Pr. l. c.)

ssp. austriaca (Jacq.) Briq. — Kékes (Pr. ap. Top. 146, Fl. I. 831, MBL. XV. 256) — **b. pegaia** Top. — Kékes (Pr. l. c.)

1026. **M. verticillata (aquatica — arvensis)** L. — Kv. Szénafű (Soó GM. 93, 95, Kv. 456 : **b. reversa** (Rochel) Top., **c. serotina** (Host) Top.), Kv.-Szamosfa, Apahida (Soó in Gr. 250, Priszter 89), M.kece (Ny. ap. Top. l. c. 155) — **d. ballotaeifolia** (Opiz) Top. f. *dorealis* (Top.), Magasmart (Pr. ap. Top. 155, 160, Fl. I. 840 et **e.**, **e. elata** (Host) HBr. f. *rubro-hirta* (Lej. et Court.) Trautm.), M.Judas (Ny. ap. Top. 160 **f. montana** (Host) H.Br.), Sz.újvár (K. et O. 17), M.vásárh. (Bgt. II. 162), Torda (Ercsei 104)

1027. **M. dalmatica (arvensis — longifolia)** Tausch — Sz.újvár (Pr. BCI. V. 123 b. **Teodorescui** Prod., **c. Solacolui** Prod.), Dés (Pr. l. c. 118, 120 **d. Skofitziana** (Kern.) Top. f. *peracutaeformis* Prod., **e. dejensis** Prod.), Göc (Pr. l. c. 121 **f. Borzaena** Prod.), Kékes (Pr. l. c. 119—121 **g. eineraeens** (HBr.) Top. f. *dubia* Prod., **h. cheuchisensis** Prod., **i. grandissima** Prod.) cf. Pr. Fl. I. 844—851.

1028. **M. carinthiaca (arvensis — rotundifolia)** Host **b. diespasma** Briq. — M.kece (Ny. ap. Top. l. c. 166, ap. Pr. l. c. 853, an subspontanea?)

Additamenta dubia : *M. pubescens* Torda (Schur VSV. X. 79), *M. excedens* Trautm. × *illyrica* Borb. et Br., *M. excedens* Trautm. × *Barthiana* Borb. Apahida (Soó Scr. I. 110), *M. excedens* Trautm. est hucusque non descripta.

Solanaceae.

1029. **Lycium halimifolium** Mill. — Frequens.

1030. **Atropa belladonna** L. — Ö.füzes (K. et O. 19, Pr. Cp. 100)

1031. **Hyoscyamus niger** L. — Frequens.

1032. **Physalis alkekengi** L. — Sz.újvár (K. et O. 19), Szék (Soó 115), Torda (Ércsei 120, Wolff MNL. I. 63)

Nicandra physalodes (L.) Gártm. — Dés (Czetz 18 subspontanea?)

1033. **Solanum dulcamara** L. — Frequens.

1034. **S. nigrum** L. — Frequens.

1035. **S. luteum** Mill. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 105)?, Torda (Bgt. I. 170, Ercsei 42) Dubia

S. lycopersicum L. Subspont. — Szamosfa (Freyn 103) Apahida (Priszter 89)

1036. **Datura stramonium** L. — Frequens.

Petunia Alkinsiana Don. (*P. hybrida* hort.) — Subspont. Sz-szt.miklós (!Priszter l. c.)

Scrophulariaceae.

1037. **Verbascum phoeniceum** L. — Frequens. Florum colore variat (cf. Priszter 91)

1038. **V. blattaria** L. — Frequens. — **b. blattariforme** (Grish.)

Hal. — Kv. Szénafű (Borb. ÖBZ. XXVIII. 279, Simk. MNL. II. 150, Soó BK. XXIII. 150), Apahida (Soó Kv. 467)

1039. **V. thapsiforme** Schrad. (AGH. II. 233) — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 105)?, Kolozs (Schur En. 481, Freyn 103, sub *V. thapso*?), Torda (Wolff 63, Freyn 103 sub *V. thapso*) Dubia.

1040. **V. phlomoides** L. — Frequens, in formis pluribus, sic **a. sessile** (Schrad.) Neirl. (*nemorosum* (Schrad.) Pfund) : Kv. Szénafű (Soó), Dezmér (Ujv. Kv. 666), K.bós-Virágosv. (Ny. Kv. 468) — **b. australis** (Schrad.) Grish.

1041. **V. lychnitis** L. — Frequens. — **b. Kanitzianum** (Simk.) Murb. (? *hungaricum* Rochel) — Kv. Szénafű (Morgó, Siposh.), Apahida (Ny. Kv. 467)

1042. **V. nigrum** L. — Apahida-Kályán(!), Kolozs (Pr. ap. Ny. Kv. 468), K.bós, Virágosv. (Freyn 103), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 107), Torda (Ercsei 48) — **b. Barthii** Schur — M.vásárh. (Barth 114)

1043. **V. austriacum** Schott — Frequens.

1044. **V. phoeniceum** × **austriacum** (*V. rubiginosum* W. et K.) — Kv. Szénafű (Soó BK. XXII. 72, Wolff in Kv. 468), Torda-Sósf. (Wolff 63), Sz.újvár (K. et O. 26)

1045. **V. phoeniceum** × **lychnitis** (*V. igneae* Tausch, *V. Schmidii* Kern.) — Kv. Szénafű (Simk. MNL. II. 149, Borb. ap. Ny. Kv. 469, Soó GM. 91, Pr. Cp. 142), Kolozs, Virágosv. (Freyn 103), Torda (Pax ap. Boros BK. XLIV. 20) — **b. elaudopolitanum** Simk. — Kv. Melegv. (Simk. MNL. II. 150, En. 416, Butujás ap. Ny. Kv. 469)

1046. **V. lychnitis** × **austriacum** (*V. braeatum* Presl) — Kv. Szénafű (Borb. TF. IX. 276, Soó GM. 91)

1047. **V. lychnitis** × **nigrum** (*V. Schiedeanum* Koch) — K.bós-Virágosv. (Ny. Kv. 469)

V. phoeniceum × *blattaria* (*V. pseudophoeniceum* Reich.) — Kv. Szénafű : Előv. (Pr. Cp. 137) sed ex Pr. Fl. I. 879 et Ny. Kv. 469 = *V. phoeniceum* × *nigrum* (*V. commutatum* Kern.) — *V. nigrum* tamen in valle Elővölgy hucusque non inventa.

1048. **Kickxia spuria** (L.) Dum. — Kv. Szénafű (Wolff, Soó, Ny. XXII. 190), Vszt.iván (K. et O. 16), Désakna (Hg. II. 71), Szamosfa-Apahida (!Priszter 88), Dezmér(!), Torda (Wolff 63)

1049. **K. elatine** (L.) Dum. — Frequens.

Chaenorhinum minus (L.) Lange — Ad limites Kv.-Szamosfa (Topa BCI. XXVII. 186)

1050. **Linaria vulgaris** Mill. et **b. glabra** Peterm. — Frequentes.

1051. **L. Kocianoviae** Asch. (*L. angustissima* (Lois.) Borb. ssp.

Kocian). Soó — *L. kösensis* Simk., *L. rufa* Janka, *L. salsa* Borb., *L. strictissima* Schur, *L. angustissima* × *vulgaris* ?, *L. gentilifolia* × *vulgaris* ? cf. Tatár AGH. II. 100, Ny. Kv. 470 — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 105 sub „*L. italicica*“, Pr. Cp. 142 sub „*L. italicica*“, Simk. pl. ap. Tatár l. c. et Ny. Kv. 470, Borb., Bélteki ap. Ny. 470 sub „*L. genistif.*“ Melegv.-Szamosfa-Apahida (Soó), Apahida (!Butujás l. c.), K.bós (Freyn 103 sub „*L. gen.*“, Ny. l. c.), Kolozs (Freyn l. c.), Torda (Borb. Term. Ért. IX. no. 15. 64, Csató ap. Tatár l. c.),

Telekfarka, Bonchida-K.iklód (Soó 115), Cege, Vszt.gothárd, Feketelak (!Janka TF. IV. 305), M.szovát-M.gyéres (Péterfi MBL. XVII. 59 sub „*L. gen.*“ ap. Ny. I. c.), M.záh (Pr. Cp. 93 sub „*L. gen.*“ ?) — **b. stenophylla** Simk. — Kv. Szénafű-Szamosfa (Simk. MNL. II. 150, Soó BK. I. c., auct. pl. ap. Ny. Kv. 471), K.bós-Virágosv. (Ny. I. c.), M.szovát (Péterfi ap. Ny. I. c.) — *f. mollifolia* Nyár. — Kv. Szénafű-Szamosfa, Apahida (Ny. Acta Botan. Szeged I. 44, Kv. 471) — *f. sco-paeformis* Nyár. — Kv. Szénafű-Szamosfa (Ny. I. c.), Apahida (Ujv. Kv. 666)

1052. *L. genistifolia* (L.) Mill. — Torda (Bgt. II. 206, Wolff 62, Freyn 103, Simk. En. 419 — anne p. p. ad praecedentem?) — **b. pro-cera** Sims. — Torda (Winkler ÖBZ. XVI. 48, Simk. I. c.)

L. angustissima (Lois.) Borb. — Ad limites : M.vásárh. (Ny. ap. Soó Scr. I. 48) anne 1051. b.?

Anfirrhinum majus L. — Subspont., Kv. Szt.györgyh. (Priszter 91)

1053. *Serophularia Scopolii* Hoppe — (EK. 289) — Kv. Szénafű, Kolozs, K.bós, Berkenyes, Virágosv., Cege, Vszt.gothárd, Báld, N.sármás, K.borsa. — Dezmér (Pr. Fl. II. 292), Kv.-Szamosfa (Priszter 89), Torda (Ercsei 151?, Wolff 63)

1054. *S. nodosa* L. — (EK. 289) — saepius quasi *f. glandulosa* (Schustler) Soó — Kv. Szénafű, Fejér, Kolozs, Korpád, Ajton, Szújvár, B.váralja, Bonchida-Szék, Iklód, Szék-Vszt.egyed-Pujon, Vszt.gothárd, Báld, N.sármás, Vszt.iván, Doboka-Moró. — Torda (Ercsei 150)

1055. *S. alata* Gilib. = *S. umbrosa* Dum. — Kv. Szénafű (Soó 96, Kv. 472), Torda (Ercsei 151, Wolff 63)

1056. *Gratiola officinalis* L. — Apahida (Ny. Kv. 472), Szújvár (!K. et O. 13), Dés (Czetz 15), Torda (Ercsei 40)

1057. *Limosella aquatica* L. — Kv. (Schur VSV. X. 105) : Szszt.miklós (Soó ap. Priszter 89), Torda (Ercsei 77)

1058. *Veronica scutellata* L. — Kv. Szénafű (Soó GM. 97, ap. Keller Scr. Bot. Mus. Trans. II. 97, Ny. FK. 1941. 45, 51, Ujv. Kv. 666), Kajántó (Ny. ap. Keller I. c.), Apahida (Soó Kv. 666), Torda (Wolff MNL. I. 63), Kékes (Pr. Cp. 145), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 109, ap. Keller I. c.)

1059. *V. anagallis-aquatica* L. — Frequens, in formis multis : *f. angustifolia* Krösche — Kv. Szénafű (Ny. Kv. 474) — *f. limosa* Krösche — Désakna (Richt. ap. Keller BK. XXXIX. 145) — *f. maxima* (Schur) — Torda (Haynald ap. Keller I. c.) — *f. tenerrima* (Schm.) Vahl — Kv. Szénafű, Szamosfa (Soó in Gr. 250)

1060. *V. anagalloides* Guss. — Kv. Szénafű (Ny. ap. Keller Scr. II. 97, Kv. 474) **b. pubescens** (Béguinot) Keller, M.záh (Simk. En. 421)

1061. *V. comosa* Richt. (*V. aquatica* Bernh.) — Apahida (Ny. ap. Keller I. c. 98, Kv. 475), M.ménes (Borza FER. 1751)

1062. *V. seardica* Griseb. — Kolozs (Pr. Cp. 87, FER. 671 *f. Ko-vácsii* (Borb.) Jáv. sec. Keller BK. I. c. 153 magis typus), Virágosv. (Freyn ap. Keller Scr. I. c. 98 *f. Jávorcae* Keller)

1063. *V. beccabunga* L. — Kv. Szénafű (Soó GM. 95, ap. Keller I. c. 99 *f. limosa* (Lej.) Todor ap. Keller I. c., Ujv. Kv. 666), Dezmér-

Pata (Ny. Kv. 475), Apahida (Priszter 89), Torda (Ercsei 176, Wolff 63), Szújvár (K. et O. 26), M.vásárh. (Ny. Mv. 95)

1064. **V. chamaedrys** L. — Frequens.

1065. **V. officinalis** L. — (EK. 289) — Kv. Szénafű-Fejér, Ajton, Korpád, Sz.jenő, Vszt.egyed-Pujon, F.mikola, Szu.németi, Báld, Teke, Bádok-Doboka-Moró. — Torda (Ercsei 176)

1066. **V. prostrata** L. — Frequens.

1067. **V. austriaca** L. (*ssp. dentata* (Schm.) Watzl) — Kv. Szénafű, Melegv.-Szamosfa (Andrae BZ. XIII. 740, Soó, AGH. V. 147, Kv. 666, Pr. Cp. 95, 134, 142, Knapp, Barth ap. Keller Scr. I. c. 92, auct. plures ap. Ny. Kv. 477, Ghisa BCI. XXI. 62, Ujv. Kv. 666), Szamosfa (Csüros BCI. XXVII. 82), Apahida (Soó AGH. V. 145, Ny. Kv. 477), Dezmér (Ujv. I. c.), A.zsuk, Ajton (Ny. I. c.), Kolozs (Soó Kv. 666), Szújvár (Soó AGH. V. 145, Hg. II. 69), Bonchida-Szék-Iklód, Vszt.-gothárd (Soó 116), Pujon, Ombozelke(!), Szabéd (Szakmáry 118), Bala-Pusztaalmás, N.nyulas, M.fele (Ny. ap. Soó 116), M.vásárh. (Ny. Mv. 96, ap. Pr. Cp. 107), Torda (Fuss Transs. 176)? — *f. latiuscula* Borb. — Kv. Szénafű (Butujás ap. Keller I. c.) — **tr. bihariensis** (Kern) Hay. — Kolozs (Schur En. 494 sub „*V. multifida*“)?

1068. **V. teucrium** L. — (EK. 289) — Kv. Szénafű, Fejér (et *f. lasiocalyx* (Beck) Watzl) — Szamosfa, Dezmér, Kolozs, K.bós, K.kara, Szújvár, Szék, Cege, Pujon, Feketelak, Bala-Pusztaalmás, Kékes, Bazéd, Szabéd, Mojos, Toldalag, K.borsa-Válaszút. M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 110), Torda (Ercsei 176, Wolff 63) — *f. elongata* Nyár. — Szu.németi (Hg. III. 130)

1069. **V. longifolia** L. (*V. maritima* L.) — Kv. Szénafű (Andrae BZ. XIII. 740 anne e.?, Soó BK. XXIII. 150, GM. 93), Szújvár (Schur VSV. X. 113 sub „*V. arguta*“, K. et O. 26), P.kamarás (Borza BCI. VIII. 24), Kékes (Pr. Cp. 78), Torda (Ercsei 176), M.vásárh. (Barth 114, Ny. ap. Soó Szf. 110) — **b. media** (Schrad). Koch — Kv. Szénafű (Soó BK. I. c., Butujás ap. Ny. Kv. 477), Korpád (Soó 116) — **c. salicifolia** (Wallr.) Hay. — Kv. Szénafű (Soó I. c.)

1070. **V. spuria** L. (*ssp. foliosa* (W. et K.) Härlé) — Kv. Szénafű (Bgt. I. 17, Andrae XIII. 740, Schur VSV. X. 105, En. 498, Winkler 50, Soó GM. 91, auct. pl. ap. Ny. Kv. 477), Kálván (Soó 116), Kolozs, Virágosv. (Freyn 104), K.bós (Ny. I. c.), Szújvár (K. et O. 26), M.záh (Borza FER. 1754), Torda (Ercsei 176, Wolff 63) — *f. brevifolia* (M. B.) — Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 150)

1071. **V. spicata** L. — Frequens, in formis multis, sic **a. vulgaris** Koch : *f. major* Rchb. (*persicifolia* (Wallr.) Gaud.), *f. minor* Rchb. (Kv. Szénafű!) — **b. latifolia** Koch (*stachyoides* Schur) — Gerend (Simk. En. 425) — **e. nitens** (Host) Koch — Kv. Melegv. (Ny. Kv. 478)

1072. **V. orchidea** Cr. (typus : *pseudocrassifolia* Borb.) = **V. spicata** L. (*ssp. orchidea* Hay. quia in praecedentem transit : **tr. decipiens** (Nyár.) Soó : Kv. Szénafű!

1073. **V. triphyllus** L. — Torda (Ercsei 176, Wolff 63), M.vásárh. (Ny. Mv. 97)

1074. **V. verna** L. — Kolozs, K.bós (Freyn 104), Torda (Borb. TF. XXI. 51)

1075. *V. arvensis* L. — Frequens.

1076. *V. serpyllifolia* L. — Kv. Szénafű (Soó, Bélteki Kv. 473), Szszt.miklós, Apahida (Ny. I. c.), Kékes (Pr. Cp. 145), K.borsa-Válaszút(!), Torda (Ercsei 176) — f. *Wolffiana* Schur — Kv. Szénafű (Schur En. 500)

1077. *V. hederifolia* L. — (EK. 289) — Szamosfa-Apahida, Bonchida, M.vásárh., Sz.újvár (K. et O. 26 sub „*V. cymbalaria*“), Torda (Ercsei 176) — b. *triloba* Opiz — M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 110)

1078. *V. persica* Poir. (*V. byzantina* (Sibth. et Sm.) Mazz.) — Frequens.*

1079. *V. polita* Fr. — Frequens.*

1080. *V. austriaca* × *teuerium* (*V. Handelii* Watzl) — Kv. Szénafű (Borb., Soó ap. Keller Scr. I. c. 93, Soó, Ujv. Kv. 666)

1081. *Digitalis grandiflora* Mill. — (EK. 289) — Ky Szénafű, Fejér, Dezmér, K.bós, Ajton, Gyulatelke, M.záh, Buza, Gerend, Apahida, Kályán, Korpád, Iklód, Sz.jenő, Szék, Vszt.egyed, Pujon, Vszt.gothárd, Feketelak. — Dés (Czetz 14), Torda (Sebők 45)

Delenda : D. *ferruginea* L. — Mezőség (Bgt. II. 212)

1082. *Melampyrum cristatum* L. — Kv. Szénafű, Fejér (Wolff, Ny. Kv. 480 typus), Sz.újvár (K. et O. 17), Gerend (Wolff 64), Sz.lekence (Lengy.) — b. (ssp.) *Ronnigeri* (Poevertl Rönn. — Kv. Szénafű (Ny. I. c.), Cege (Soó 116), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Rep. sp. nov. XXIV. 144.) — c. (ssp.) *solstitiale* Rönn. — Kv. Szénafű, Fejér (Soó K. 480, Ujv. Kv. 666)

1083. *M. arvense* L. — Frequens, sed magis b. (ssp.) *pseudobarbatum* (Schur) Wettst. Typus (*ssp. arvense* Rönn.) certe in Kv. Szénafű, Apahida (Ny. Kv. 481), Torda (Richt. ap Soó Rep. I. c. 132), K.borsa(!) — b. (ssp.) *pseudobarbatum* : Kv. Szénafű (Soó GM. 92, 98, AGH. V. 148, Rep. I. c. 133), Apahida (!Richt. ap. Soó I. c., Ny. FER. 1332), Kolozs (Barth ap. Soó I. c.), Kályán (!Ny. ap. Soó I. c.), Kékes (Pr. ap. Soó I. c.), Teke (Römer ap. Soó I. c.), Torda (Wolff ap. Soó I. c.), Sz.újvár (Hg. II. 68), Fejér, Telekfarka-Apahida, Bonchida, Szék, Cege, Vszt.gothárd, Pujon-Ombozelke (Soó) — lus. *albicans* Porc. cum ssp. b. fere semper „*argyrocomum*“ Kv. 481, 666) — e. (ssp.) *Sehinzii* Rönn. — Kv. Szénafű (Soó I. c. 134), Apahida (Soó Kv. 666)

1084. *M. barbatum* W. et K. — (AGH. II. 112) — Kv. Szénafű, Melegv.-Szamosfa (Ny. „Soó Kv. 481), Apahida (Ny. FER. 1335b., Kv. 481), Faragó, M.vásárh. (Ny. ap. Soó Rep. I. c. 138), M.ludas (Lengy.), Cege (Soó 116)

1085. *M. bihariense* Kern. — (EK. 289—290) ssp. *Römeri* (Rönn.) Soó — In silvis frequens — f. *Nyárádyanum* Soó — Ky. Szénafű, N.nyulas, Faragó, Bala, Pusztaalmás, Gerend, Kékes. — b. (ssp.) *Kümmerlei* Soó — Kv. Jósikatanya(?), Bonchida-Szék (non typ.), Feketelak. — e. (ssp.) *coronense* O. Dahl Ad limites : M.vásárh. (Ny. ap. Soó Rep. I. c. 159)**

* Additamenta tantum nonnulla, sed uti plantae praecoces, raro collectae.

** *M. „nemorosum v. albicans“* in agris: Gyulatelke (Morariu BGI. XXIII. 190)? = *M. arvense lus. argyrocomum* Fisch.

1086. *M. pratense* L. ssp. *vulgatum* (Pers) Rönn. — Kv. Szénafű (Hg. Kv. 666), Ajton (Freyn 105)

1087. *Euphrasia Rostkoviana* Hayne — Kv. Szénafű (Ny. Kv. 483, Soó Kv. 483, 666) — b. *minoriflora* Borb. — Kv. Szénafű (Borb., Ny. Kv. 483), Cege (Soó 116), Bazéd (Lengy. ap. Soó 116), Balapusztaalmás (Ny. ap. Soó 116) — ssp. *montana* (Jord.) Wettst. — Dohoka-Moró (Hg. I. 128) an vero?

1088. *E. officinalis* L. em. Mansfeld (*E. stricta* Host, *E. ericetorum* Jord.) — Frequens. Nec ssp. *suecica* Wettst. et Murb., nec ssp. *tatarica* (Fisch.) e territorio nostro certe nota.

1089. *Odontites lutea* (L.) Stev. — Mezőség (Bgt. II. 196) : Kv. Szénafű (Soó GM. 98, Kv. 484, AGH. V. 147, Pop BCI. XIII. 103. Pr. Cp. 84, Meusel 201, Bélteki ap. Ny. I. c.), Kolozs, K.bós, Berkenyes (Freyn 105), Torda (Wolff 64, Freyn 105), Sz.újvár (K. et O. Pr. Cp. 118—19), M.záh, M.szengyel, M.kapus (Ercsei 140), Désakna (Hg. II. 71), Sz.enes (Pr. Cp. 94)

1090. *O. rubra* Gilib. — Frequens.

1091. *Rhinanthus crista-galli* L. (*Rh. minor* L.) — Typus (ssp. *minor* Soó) Frequens. — f. *minimus* Schur Kv. Szénafű (Soó BK. XXV. 145, Kv. 485)

b. (ssp.) *elatior* (Schur) Soó Kv. Szénafű, Apahida (Soó Kv. 485, cf. Soó Rep. sp. nov. XXVI. 208), Sz.újvár (Hg. II. 68)

1092. *Rh. glaber* Lam. (*Rh. major* Ehrh.) praecipue ssp. *bosnensis* (Behr. et Stern.) Soó (*ssp. eumajorem* e ditione non vidi) — Frequens.

b. *siculorum* Soó — Kv. Szénafű (Schmidt, Soó Kv. 486), Apahida (Ny. Kv. 486), Kályán, Bonchida (Soó 116) — e. *polycladus* (Chabert) Soó — Fejér (Ny. Kv. 485)

1093. *Rh. rumelicus* Velen. — Kv. Szénafű (Soó Kv. 666), Szamosfa, Apahida (Borb., Soó Rep. I. c. 212 cum b. Consp. 44), Sz.újvár, F.mikola (Hg. II. 66, 68), Vszt.iván (K. et O. 3), Pujon, Bonchida-Szék, K.iklód, Cege, Vszt.gothárd (Soó 116 cum b.), Torda (Wolff FEAH. 2605), Bazéd, Szabéd (Lengy. ap. Soó I. c. cum b.), M.vásárh. (Ny. Mv. 97) anne partim *anceps*? — b. *Simonkaianus* Soó — K.bós (Ny. Kv. 486) — e. *abbreviatus* (Murb.) Soó — Kv. Szénafű, Apahida (Soó Rep. I. c. 213, Soó 116 : f. *banaticus* Soó)

ssp. *Wagneri* (Degen em. Maly) Soó a. *anceps* (Behr.) Soó — Typo frequentius. Kv. Szénafű, Melegv. (Borb., Richt.; Soó Rep. I. c., Kv. 487, 666, Consp. 56), Szamosfa (Borb. ap. Ny. Kv. 486), Apahida (Ny. I. c., Soó Kv. 666), Bonchida-Szék (Soó 116), B.váralja (Hg. III. 125), Bádok, K.borsa(!), Szabéd (Lengy. ap. Soó Rep. I. c.) — b. *Caroli-Henrici* Soó Kv. Szénafű (Borb., Richt., Soó Rep. I. c., Kv. 486), Kecsed (Hg. I. 126), Sz.újvár (Hg. II. 68) — e. *Wagneri* (Degen) Soó — Apahida (Soó 116)

1094. *Pedicularis palustris* L. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 105, Pr. ap. Ny. Kv. 487?), K.bós (Pr. Cp. 139), Ajton (Freyn 105), Torda (Ercsei 79), A.polyán (Wolff 64)

Dubia: *P. exaltata* Bess. — Vszt.iván „Hangyavár“ (Janka MTK. XII. 182)

1095. **P. comosa** L. ssp. **campestris** (Griseb. et Sch.) Jáv. — Kv Szénafű, Fejér (Schur VSV. X. 105, En. 508, Janka 592, Soó GM. 88, 91, AGH. V. 148, VI. 27, Pr. Cp. 133—5, Ghisa BCI. XXI. 62, Péterfi FER. 181, Richt. Hb. norm. 5504, auct. multi ap. Ny. Kv. 487), K.bós, Virágosv. (Freyn 105), Ajton, A.zsuk (Ny. I. c.), Gerend, Torda (Ercsei 80).

1096. **Lathraea squamaria** L. — (EK. 290) — Fejér (Soó, Ujv. Kv. 667), F.mikola (Hg. II. 65), Dés (Czetz 16), Torda (Ercsei 180, Wolff 64, Sebők 40)

Orobanchaceae.

1097. **Orobanche ramosa** L. — Szamosfa (Landoz I. 12), Torda (Ercsei 175, Wolff 64), M.örményes (Simk. En. 434), Sz.újvár (K. et O. 19), Kékes (Pr. Cp. 167), Szabéd (Ny. FER. 185)

1098. **O. arenaria** Borkh. — Kv. Szénafű (Beck Orobanche 131, Soó GM. 98, Kv. 488), A.gyéres (Ercsei 175 sub „*O. coerulea*“, Kováts in Sternheim 22), Sz.újvár (K. et O. 19), Torda (Sebők 45)

1099. **O. caesia** Rehb. — Kv. Szénafű (Knapp ap. Beck. I. c. 153, Soó GM. 98, AGH. V. 148)

1100. **O. purpurea** Jacq. — Kv. Szénafű (Ny. Kv. 489, Soó AGH. V. 147 sub „*O. caesia*“, Kv. 667, Ujv. Kv. 667), Kolozs, K.bós (Freyn ap. Simk. En. 434, ap. Beck I. c. 126 b. *hirsuta* Beck), M.szovát (Ny. I. c. b.)

1101. **O. alba** Steph. — Frequens, in formis multis (cf. Ny. Kv. 489) *f. capitata* Beck, *f. bidentata* Beck : Kv. Szénafű (Ny. I. c.) — *f. leptocalamus* Beck Kv. Szénafű (Ny. I. c. Soó Kv. 667), K.bós (Freyn ap. Ny. I. c.), Virágosv. (Ny. I. c.), — *f. rubra* Hook. — Bonchida-Kisiklód (Soó 116)

1102. **O. reticulata** Wallr. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 105, Simk. En. 436), Apahida (Soó Kv. 667), K.borsa-Válaszút(!)

1103. **O. Pieridis** F. Schultz — Kv. Szénafű, Jósikatanya (Winkler 50, Butujás ap. Ny. Kv. 490), Torda (Sebők 38). — Huc pertinet „*O. loricata*“ Simk. En. 436.

1104. **O. gracilis** Sm. — Kolozs, K.bós (Freyn 105)

1105. **O. lutea** Baumg. — Kv. Szénafű (Soó GM. 86, 91, Kv. 490, Bélteki ap. Ny. Kv. 490, Ujv. Kv. 667, Zsák ap. Beck MBL. XXV. 159), Kolozs (Freyn 105), Ajton (Ny. I. c.), Torda (Ercsei 175) — *f. liliacea* Beck — K.bós-Virágosv. (Ny. I. c.)

1106. **O. vulgaris** Poir. (*O. caryophyllacea* Sm.) — Kv. Szénafű (Soó GM. 86, Kv. 667, Zsák ap. Beck I. c.), Torda (Ercsei 175, Beck Orob. Pflanzenr. 228), Gerend. M.záh (Ercsei 175), M.vásárh. (Ny. Mv. 98)?, K.borsa, Válaszút, Apahida-Kályán(!)

1107. **O. Teuerii** Holandre — Kolozs (Freyn 105)

1108. **O. major** L. — Kv. Szénafű (Ujv. Kv. 667), Kolozs (Freyn 105), Szamosfa (Beck Orob. Pflanzenr. 249), Apahida (Ny. FER. 2898), Torda (Ercsei 175, Beck Orobanche 172, Pflanzenr. 207), Dés (Czetz 18)

Lentibulariaceae.

1109. **Utricularia vulgaris** L. — Kv. Szénafű (Soó GM. 97, MBIM. II. 77, Richt. ap. Ny. Kv. 492), Kajántó, Diósi tó(!), Szamosfa (Andrae BZ. XIII. 861), Apahida (Soó I. c., Ny. EM. 1941. 114) — non Kolozs, uti Ny. 492, citavit — Sz.kocsárd (Csató ap. Simk. En. 656), Bonchida (Pr. Fl. II. 340), Cege (Pr. MBL. V. 32, Soó I. c.), Vajda szt.ívány (Nagy ap. Ercsei 125), M.őr (Bihari ap. Soó Arch. Biol. XVII. 98), Vszt.íván (Györffy ap. Soó I. c.), M.vásárh. (Barabás ap. Soó I. c.)

1110. **U. Bremii** Heer — Kajántó (Ny. EM. 1941. 107—8), Apahida (Soó MBIM. I. c., BK. XXII. 76, Pr. BCI. 1933. 249) — *U. minor* L. e Szamosfalva et M.szovát a Jávorka (Magy. Fl. 1028) erroneo indicata (cf. Soó I. c.)

Acanthaceae.

Acanthus longifolius Host — Mezőség (Ercsei 14) Delenda.

Plantaginaceae.

1111. **Plantago maritima** L. — Kv. Szénafű, Melegv. (Schur VSV. X. 107, Hayek 466, Wolff, Butujás, Ny., Soó Kv. 492, Consp. 28—9, 56, Pr. Fl. II. 291), Szamosfa-Szszt.miklós-Apahida (Schur I. c. 112, Freyn 85, Haynald ap. Simk. En. 465, Soó GM. 100, in Gr. 247—9, AGH. V. 153, Consp. 28—9, 32—4, 44, 50—1, 56, Bujorean BCI. XIV. 227, Ny. EM. 1941. 112, Kv. 492, Pr. Cp. 86, Csűrös BCI. XXVII. 82), Kolozs (Bgt. I. 90, Soó in Gr. 248, Pr. Fl. II. 296), Dezmér-Pata (Ny. I. c.), Torda (Bgt. I. c., Ercsei 162, Wolff 65, Hayek 466), delenda e Sz.újvár (Schur En. 565 loco Szamosfa) — b. *Wulfenii* Spr. — Szamosfa (Schur VSV. I. c., Soó BK. XXIII. 150, Kv. 493), Kolozs (Schur En. 565), Torda (Schur VSV. X. 79) — e. *dentata* (Roth) Koch — Kv. Szénafű (Schur VSV. I. c. 42?)

1112. **P. Schwarzenbergiana** Schur — (AGH. II. 105) — Kv. Szénafű (Brassai ap. Janka ÖBZ. VI. 195, Janka, Richt. ap. Tatár AGH. I. c.), Torda (Schur VSV. VI. 3, Winkler 49, Freyn 85, Barth 115, Wolff 65, FEAH. 1436, Janka 598, Hayek 466, Pr. Fl. II. 290, Borza et Grint. FER. 82, ap. Tatár I. c., Pilger Plantaginac. 271), Désakna, Dés-Sz.újvár (Janka ÖBZ. VI. 194, Pr. Cp. 86)

1113. **P. argentea** Chaix — Kv. Szénafű (Andrae BZ. XIII. 899, Schur VSV. X. 107, En. 564, Winkler 50, Soó GM. 98, AGH. V. 145—8, Pr. Cp. 95, 132, 134, Meusel 301, Pr. et Borza FER. 187, auct. mult. ap. Ny. Kv. 493), A.zsuk (Ny. I. c.), Kolozs (Schur En. 564, Freyn 85), Korpád, K.bós, Virágosv. (Freyn 85), Apahida (Freyn 85, Soó AGH. V. 153, Richt. ap. Ny. I. c.), Torda (Freyn 85, Wolff 65), Gerend (Simk. En. 464), M.záh (Pr. Cp. 93, 146), M.szovát (Péterfi MBL. XVII. 59), M.vásárh. (Ny. ap. Pr. Cp. 96)

1114. **P. lanceolata** L. — Frequens. — b. *sphaerostachya* M. et K. — Kv. Szénafű : Melegv. (Soó Consp. 34, 56), Szamosfa, Szék (Soó I. c. 50—1, 56, Csűrös BCI. XXVII. 82) — f. *decumbens* Bernh. —

Szamosfa, Apahida, Kolozs, Torda (Soó GM. 101 in Gr. 248) — **e. eriophylla** Dec. (*var. dubia* (L.) Beg.) — Kv. Szénafű, Melegv. (Simk. En. 464, Soó BK. XXIII. 150), Kolozs (Schur En. 564), Torda (Schur ÖBZ. X. 249), M.záh (Simk. En. 464)

1115. **P. altissima** L. — Szamosfa (Butujás ap. Ny. Kv. 494), Kolozs (L. Richt. ap. Ny. I. c.), M.vásárh. (Ny. Mv. 98)

1116. **P. media** L. — Frequens. — **b. Urvilleana** Rapin — Kv. Szénafű (Ghisa ap. Ny. I. c., Ujv. Kv. 667), Torda (Schur ÖBZ. X. 249)

1117. **P. Cornuti** Gouan — (AGH. V. 167) — Kv. Szénafű, Melegv. Szamosfa, Apahida, K.bós, Virágosv., Berkenyes, Kolozs, Torda, Dezmér-Györgyfalva, P.kamarás-K.sármás, Sz.újvár, Dés, Désakna. — Fejérd-Telekfarka, Szék-Gyulatellek (Soó 116), Hesdát (Pr. Fl. II. 296), Bonchida-Szék (Soó Consp. 28—9, cf. etiam Soó I. c. 30, 32—4, 44—5, 50, 56, Ny. Kv. 494—5, EM. 1941. 110—5, Csűrös BCl. XXVII. 81) — *f. alismaefolia* Schur — Szamosfa (Soó BK. XXIII. 150, in Gr. 247)

1118. **P. major** L. — Frequens, in formis multis. — *f. angustata* Schur — Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 150) — *l. phyllostachya* Wallr. — Kv. Szt.györgyh. (Ny. Kv. 495) — *b. ssp. intermedia* (Gilib.) Lange. — Melegv. (Soó Consp. 56), Szamosfa (Soó I. c.), Apahida (Priszter 89 sub *f. nana* Dvorak) Dubia, an *ssp. intermedia* vera (*P. pauciflora* Gilib., *P. major* ssp. *pleiosperma* Pilger) vel var. alia statura humili et inflorescentia pauciflora (uti var.-es *microstachya* Hayne, *lepto-stachya* Wallr, *pumila* Custer etc.)

Dubiae : *P. indica* L. — Kolozs, Vszt.iván (Bgt. I. 91); Torda (Ercsei 162)

P. tenuiflora W. et K. — Mezőség (Janka ap. Schur En. 562), Vszt.iván (K. et O. 19 sub *P. victoriali*)

Rubiaceae.

1119. **Sherardia arvensis** L. — Sz.lekence (Lengy.)

1120. **Asperula odorata** L. — (EK. 290) — Sz.újvár, Ö.füzes, F.mikola, Szu.németi, Coptelke, Bádok-Doboka. — Torda (Ercsei 108, Wolff 60)

1121. **A. rivalis** Sibth. et Sm. — Kv. Szénafű (Soó Kv. 496, 667, Borb. ap. Ny. Kv. 496), Fejérd, Bonchida(!), Vszt.gothárd (Soó 117), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 114)

1122. **A. arvensis** L. — Kv. Szénafű (Landoz EM. II. 31, Soó GM. 99, Kv. 496, Knapp, Joó, Bélteki ap. Ny. Kv. 496), Apahida (Ny. FER. 995b.), Kolozs, K.bós (Freyn 96), Sz.újvár (K. et O. 5), Kékes (Pr. Cp. 165), M.vásárh. (Ny. Mv. 99), Torda (Ercsei 108)

1123. **A. glauca** (L.) Bess. — Frequens. — *b. hirsuta* Wallr. — Kv. Szénafű, Melegv. (Simk. MNL. VIII. 111, Pr. Cp. 142, Richt., Ny. Kv. 496, Soó Kv. 667), Apahida, Kolozs (Soó I. c.), M.szovát-M.gyéres (Péterfi MBL. XVII. 59, Pop Guide 165, Borza Guide 207; M.vásárh. (Ny. Mv. 99), Bonchida, Szék(!), Kékes (Pr. Cp. 92)

1124. **A. tinctoria** L. var. *intermedia* Simk. — (EK. 290) — Kv. Szénafű, Apahida, Iklód, Bonchida-Szék, Szék, Cege, Feketelak. —

Torda (Borb. MNL. X. 116), Additamenta typi verisimiliter ad var.-em pertinent : Kv. Szénafű, Apahida, Kolozs, K.bós, Sóspatak, Vszt.iván. — M.záh (Ercsei 108)?

1125. **A. cynanchica** L. — Frequens.

1126. **Gallium vernum** Scop. — (EK. 290) — Kv. Szénafű, Fejérd, Dezmér, Apahida, Ajton, Kolozs, K.bós, Berkenyes, F.mikola, B.váralja, Szu.németi, P.kamarás, Bonchida, Iklód, Szék, Feketelak, M.vásárh., Bádok-Doboka-Moró. — Torda (Ercsei 174, Wolff 60), Báld (Pr. FK. 1914. 353)

1127. **G. eruciata** (L.) Scop. — Frequens.

1128. **G. boreale** L. — Kv. Szénafű, Melegv. (Soó GM. 91, BK. XXII. 73, XXIII. 150, Kv. 667, Borb., Richt. Ny. Kv. 498, Meusel 301), Apahida (Ny. I. c., Soó Kv. 667), Kolozs, Virágosv. (Freyn 96), K.bós (Freyn 96, Ny. I. c.), Torda (Wolff 60, Freyn 96), Kecsed (Hg. I. 126), K.borsa(!), Iklód, Bonchida-Szék (Soó 117)

tr. pseudorubioides (Schur) Soó — Kv. Szénafű (Soó, Ny. Kv. 498), K.bós (Ny. I. c.), Pujon, Korpád (Soó 117) — *f. angustatum* Nyár. — Kv. Szénafű (Ny. I. c.), Bonchida-Szék (Soó 117)

1129. **G. rubioides** L. — (EK. 290) — Kv. Szénafű, Fejérd, Apahida, Kolozs, K.bós, Berkenyes, Sz.jenő, Iklód, Bonchida-Szék, Bala-Nercse, K.borsa, M.vásárh. — Virágosv. (Freyn 96), Torda (Wolff 60, Freyn 96)

1130. **G. tricorne** Stokes — Kv. Szénafű-Szamosfa (Ny. Kv. 499, Soó Kv. 667, Pr. Fl. II. 414), Apahida (Ny. FER. 1355, Soó AGH. V. 149), Virágosv. (Freyn 96), Torda (Simk. MNL. VIII. 115), K.borsa(!), B.váralja (Hg. III. 129), M.örmenyes (Pr. Cp. 168), M.vásárh. (Ny. Mv. 100)

1131. **G. aparine** L. — Frequens. — *ssp. spuriu* (L.) Hartm. — Szamosfa (Richt. ap. Ny. 499), Válaszút(!), Torda (Ercsei 60) — **b. Vaillantii** (DC.) Koch — B.váralja (Hg. III. 126)

1132. **G. palustre** L. — Frequens. **b. seabrum** Neilr. — Kajántó, Kv. Szénafű (Ny. Kv. 499) — ad **e. maximum** (Moris) H. Br. verg. — Bonchida, Vszt.gothárd (Soó 117)

1133. **G. uliginosum** L. — Kajántó (Ny. EM. 1941. 108—9), Kv. Szénafű : Harmadv. (Ny. FK. 1941. 51—2), Torda (Ercsei 60)

1134. **G. Schultesii** Vest. — (EK. 290) — Kv. Szénafű, Fejérd, Dezmér, Apahida, Ajton, Kolozs, Sz.újvár, F.mikola, B.váralja, Coptelke, Bonchida-Szék, Sz.jenő, K.iklód, Szék-Vszt.egyed-Ombozelkel-Pujon-Cege, Feketelak, Vszt.gothárd, Kályán, Korpád, M.szilvás, Báld, P.kamarás, M.ménes, Kékes, Mócs, Bádok-Doboka. — Torda (Ercsei 60) — **b. angustifolium** (Heuf) Soó — Vszt.gothárd „Ombozi malom“ (Soó 117)

1135. **G. pseudoaristatum** Schur — Vszt.gothárd, cum praec. (Soó 117), Doboka-Moró (Hg. I. 128)

1136. **G. verum** L. — Frequens in formis multis. — **b. podolicum** Bess. — Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 151, Kv. 502), Torda (Borb. TF. XVI. 50) — **e. angustissimum** Wallr. — Szamosfa, Apahida (Soó GM. 101, in Gr. 147—8) — *ssp. Wirtgeni* (Schultz) Oborny : *praecox* (Lang) Petrak — Kv. Szénafű (Soó GM. 91, BK. XXII. 73, Ujv. Kv. 667), Apahida (Soó Kv. 502), Virágosv. (Ny. Kv. 502)

1137. *G. mollugo* L. — Frequens, in formis multis. — **b. angustifolium** Roth Kv. Szénafű (Butujás ap. Ny. Kv. 502, Soó Kv. 667), Szamosfa-Apahida (Soó in Gr. 247), Sz.újvár (Hg. II. 69) — **c. elatum** Thuill. vel ssp. *elatum* Lange Kv. Szénafű (Ujv. Kv. 607), K.borsa, Cege, Bonchida(!), B.váralja (Hg. III. 126—9) — **f. brevifrons** Borb. — Apahida-Kályán, Szék (Soó 117) — **d. nemorosum** Wierzb. Bonchida-Szék (Soó 117) — **f. Obornyanum** H. Br. Kecsed (Hg. I. 126)

ssp. erectum (Huds.) Syme — Kv. Szénafű, Fejérd, Apahida, Ajton (Ny. Kv. 501), M.vásárh. (Ny. Mv. 101) — **b. vestitum** Schur — Kv. Szénafű (Ny. I. c.) — **f. deminutum** Nyár. — K.bós-Virágosv. (Ny. BCl. XVI. 65, Kv. 501) E ditione non vidi, planta a Ny. indicata *G. mollugo* var. *nemorosum* vel *dumetorum* (Thuill.) H. Br. esse videtur.

1138. *G. mollugo* × *verum* (*G. ochroleueum* Wolff) — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 99 sub „*G. ochroleuco*“, Soó BK. XXII. 73, GM. 91, Butujás ap. Ny. Kv. 502), Apahida-Korpád (Richt. ap. Ny. I. c.)

1138a. *G. mollugo* ssp. *erectum* × *verum* (*G. eminens* Gr. et Godr.) — Kv. Szénafű (Borb. Ny. Kv. 503), K.bós-Virágosv. (Ny. I. c.) *G. pedemontanum* (Bell.) All. **b. retrorsum** DC. — Ad limites : Torda-Sósf. (Janka 574)

Delenda : *G. Kitaibelianum* Schultes — Sz.újvár (Pr. Fl. II. 932)

Caprifoliaceae.

1139. *Sambucus ebulus* L. — Frequens.

1140. *S. nigra* L. — (EK. 270) — Frequens.

1141. *Viburnum lantana* L. — (EK. 270) — Kv. Szénafű, Fejérd, Dezmér, Apahida, Sz.újvár, Szu.németi, Bonchida-Szék, Szék-Vszt.-egyed, Korpád, Kolozs, M.szilvás, P.kamarás, M.méhes, Kékes, M.záh, M.bánd, M.vásárh., Bádok-Doboka. — Torda (Ercsei 19, Györffy Szegedi F. II. 167)

1142. *V. opulus* L. — (EK. 270) — Kv. Szénafű, Fejérd, Szamosfa, Ajton, Kolozs, Sz.újvár, Szu.németi, Bonchida-Szék, Sz.jenő, Iklód, Szék, Vszt.gothárd, M.szilvás, P.kamarás, M.bánd. — Torda (Ercsei 19, Györffy I. c.)

1143. *Lonicera xylosteum* L. — (EK. 270) — Fejérd, Sz.újvár, Bonchida, Iklód, Szék, Apahida, Kályán, M.szilvás, Teke, M.bánd. — Torda (Ercsei 98, Freyn 109, Todor FER. 2585b.)

Araliaceae.

1144. *Adoxa moschatellina* L. — Iklód „Hársastető“ (Soó 117), Torda, ad fluv. Aranyos (Wolff 60, ap. Freyn 109)

Valerianaceae.

1145. *Valerianella dentata* (L.) Poll. — Frequens. (**a. dasycarpa** Rchb.)

1146. *V. rimosa* Bast. — Kv. Szénafű, Melegv. (Simk. MNL. II.

148, Soó Kv. 505, 667, Ujv. Kv. 667), Vszt.gothárd (Janka MTK. XII. 176, ap. Fuss VSV. XXII. 48)

1147. *V. olitoria* (L.) Poll. — Kv. Szénafű (Soó BK. XXII. 73, Pr. Cp. 168), Sz.újvár (K. et O. 25), Apahida-Szszt.miklós (Ny. Kv. 506)

1148. *V. carinata* Lois. — Kv. (Kováts in Sternheim 17, Schur En. 291), Sz.máté (Pr. MBL. V. 32)

1149. *Valeriana officinalis* L. — Kv. Szénafű (Soó GM. 95—6, Kv. 506, Pr. Cp. 135, Todor FER. 1771, Ny. FK. 1941. 46, 50), A.zsuk, Ajton (Ny. Kv. 506), Apahida (Soó Kv. 667), Cege, Pujon, Vszt.gothárd(!), Torda (Ercsei 67), Buza (Pr. Cp. 145), Désakna (Hg. II. 71), M.vásárh : Bese (Ny. Mv. 106) — **b. altissima** (Horn.) Koch — Bonchida (Soó 117) — **e. tenuifolia** Vahl — Kv. Szénafű (Borb., Butujás, Soó Kv. 506, 667, Barth 111), Sz.újvár (K. et O. 25), Szu.németi (Hg. III. 130), Cege, Pujon(!), Torda (Freyn 85, Pr. Fl. II. 290), M.vásárh. (Ny. Mv. 103)

Dipsacaceae.

1150. *Dipsacus pilosus* L. — Bonchida (Soó 175), Torda (Wolff 60)

1151. *D. laciniatus* L. — Frequens.

1152. *D. silvester* Huds. — Frequens.

1153. *D. laciniatus* × *silvester* (**D. pseudosilvester** Schur) — Kv. Szénafű (Soó BK. XXII. 73, Ny. Kv. 508)

1154. *Cephalaria transsilvanica* (L.) Schrad. — Mezőség (Bgt. I. 73) : M.szovát (Pr. Cp. 94, Pop Guide 165), Torda (Ercsei 135),

1155. *C. radiata* Griseb. — (AGH. V. 168) — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 92, Hayek 466, Pr. Cp. 142, Joó ap. Soó I. c.), Apahida (Janka ap. Szabó Cephalaria 248) — Kályán (Janka ap. Soó I. c.), Kolozs (Freyn 86), Sz.újvár (K. et O. 8, Haynald ap. Szabó I. c.), Vszt.egyed Janka ap. Soó I. c.), Vszt.gothárd (Janka 574, ap. Szabó I. c.), M.szovát (Péterfi MBL. XVII. 59, Pop, Borza Guide 165, 207), M.záh, M.örményes (Simk. En. 292), Palatka, Királyfalva (Janka 574), Torda (Schur En. 293, Borza, Richt., Wolff ap. Szabó I. c. pt. certe e Tordai-hasadék), Báld (Pr. FK. 1914. 314)

1156. *C. uralensis* (Murr.) R. et Sch. — (AGH. V. 160) — Kv. Szénafű (Wolff ap. Andrae BZ. XIII. 294, Landoz EM. II. 31, Schur VSV. X. 99, Janka ÖBZ. VIII. 200, Barth 111, Soó GM. 98, AGH. V. 148, 169, Pr. Cp. 95—6, 141, auct. plures ap. Soó I. c. et Ny. Kv. 509), Apahida (Schur VSV. X. 117, Soó AGH. V. 145, 169, Ny. ap. Soó I. c., Freyn 86), K.bós (Freyn 86, Ny. I. c.), Kolozs (!Schur En. 294, Freyn 86, Ny. I. c.), M.csán, Aranykút, Berkenyes (Freyn 86), Virágosv. (Freyn 86, Ny. I. c. FER. 296a.), Dezmér-Pata, Apahida-Korpád (Ny. I. c.), Fejérd, Bonchida-Iklód-Szék(!), Telekfarka-Apahida, Vszt.-gothárd, M.szava-Ombozelke (Soó 117), M.kók (Simk. En. 293), Gerend (Simk. I. c., Ny. I. c.), Torda (Ercsei 135, Janka ÖBZ. VIII. 199, Barth 111), Zsuk (Pr. Cp. 152), M.szovát (Pr. Cp. 94, Pop Guide 165), Kékes, Mócs, Báld (Pr. Cp. 92—4, 146), Vszt.gothárd (Janka I. c. 366, Hb. norm. 63), Szabéd (Lengyel FEH. 985), Bazéd, M.ménes (Lengy. ap. Soó I. c.), N.nyulas (Kováts ap. Soó I. c.)

1157. *Succisa pratensis* Mönch var. *glabrata* Schott — Kv. Szénafű, Fejér (Ny. Kv. 509, Soó Kv. 667), Ajton (Freyn 86), Torda (Ercsei 135), M.záh (Ercsei 135), Pujon-Cege(!)

1158. *Knautia arvensis* (L.) Coul. — Frequens, in formis multis. *f. pratensis* (Schm.) Szb. — Torda (Winkler ap. Szabó 232), Kv. Szénafű, Mefegv. (Butujás ap. Szb. I. c., Soó Kv. 510) — *f. agrestis* (Schm.) Szb. — Kv. Szénafű (Soó I. c. Kv. 667) — *b. glandulifera* (Schur) Gremli (*glandulosa* Froelich cf. Soó Ser. I. 49) Frequens (cf. Szabó 242, Borb. Rev. Knautia 74, Soó BK. XXIII. 151, Ny. Kv. 310, 667, FER. 1775) — *f. integrata* Briq. Kv. Szénafű (Soó Kv. 667) — *lus. lilacina* Soó — Vszt.gothárd-Feketelak (Soó 117) — *c. (ssp.) rosea* (Bgt.) Borb. — Szújvár (Hg. II. 69), Vszt.gothárd (Janka ap. Borb. 77, ap. Szabó 249), N.cég (Janka ap. Szabó I. c.) — *f. heterotoma* (Borb.) Kecses (Hg. I. 126) — monstr. *eupularis* Janka — Mezőség (Janka ap. Simk. En. 294), Vszt.gothárd, Katona, K.-N.cég (Janka ap. Borb. Knautia 66 incl. *f. Jankae* Borb.)

Dubia : *K. sylvatica* (L.) Duby — Szújvár (K. et O. 15), Buza (Pr. Cp. 145), Torda (Ercsei 135)

1159. *Seabiosa ochroleuca* L. — Frequens. — *b. Scopolii* Link — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 99, Bélteki, Butujás, Soó Kv. 511), Apahida-Kolozs (Richt. I. c.), A.szermiklós (Pr. Cp. 93), Dés (Schur VSV. X. 115)

Delenda : *S. banatica* W. et K. vel *S. columbaria* L. var. *pseudobanatica* Schur — Kv. Szénafű (Bgt. Mant. 7)

S. canescens W. et K. — Torda (Ercsei 135)

Cucurbitaceae.

1160. *Bryonia alba* L. — Füzes (Janka 568), Szújvár (K. et O. 6), Vszt.gothárd(!), Torda (Ercsei 65, Sebők 34 et sub „*B. dioica*“) certe magis distributa.

Sicyos angulatus L. — Kv. Szt.györgyh. (Priszter 89) Ad limites, subspontanea. — *Cucurbita pepo* L. — Subspont. Szamosfa (Priszter I. c.)

Campanulaceae.

1161. *Campanula glomerata* L. — Frequens, in formis multis. (cf. Ny. Kv. 515) *b. glabra* Bluff et Fingerh. — Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 158, Ny. Kv. 515), Kolozs (Richt. ap. Ny. I. c.) — *c. aggregata* (Willd.) Koch (sec. Ny.) — Kv. Szénafű (Richt., Butujás, Ny. I. c.), K.bós (Ny. I. c.), Szújvár (K. et O. 6) — *d. elliptica* (Kit.) Koch (sec. Ny.) — Kv. Szénafű (Soó I. c., auct. pl. ap. Ny. I. c., Ujv. Kv. 667), Dezmér (Ujv. I. c.)

1162. *C. cervicaria* L. — Kv. Szénafű, Fejér (Soó GM. 83, Kv. 515, 667, Pr. Cp. 117, Ny. FER. 1369, auct. multi ap. Ny. Kv. 515, Ghisa BCI. XXI. 61), Szújvár (K. et O. 7, Hg. II. 67), Kékes (Pr. Cp. 144), Iklód, Cege, Pujon (Soó 117), Torda (Ercsei 37)

1163. *C. sibirica* L. — Frequens.

1164. *C. rapunculoides* L. — (EK. 291) — Fejér, Dezmér, Apahida, Kolozs, Szújvár, M.ménes, Kékes, Bonchida, Szék-Vszt.egyed-Pujon, Vszt.gothárd, Korpád, Apahida-Kályán, Szabéd. — Torda (Ercsei 37, Wolff 62, Freyn 95)

1165. *C. trachelium* L. — (EK. 291) — Kv. Szénafű, Fejér, Dezmér, Kolozs, Berkenyes, Szújvár, Vszt.iván, F.mikola, Szék, K.kályán, Korpád, M.szilvás, P.kamarás, Kékes, Bazéd, Szabéd, Bala-N.ercse. — Torda (Ercsei 37, Freyn 95)

1166. *C. bononiensis* L. — Kv. Szénafű, Fejér (Bgt. I. 150, Winkler 50, Soó GM. 83, 91, AGH. V. 146, Kv. 517, Richt., Ny. Kv. 517, Ujv. Kv. 667), Szamosfa, Apahida (Borb., Zsák, Soó Kv. 517), K.bós (Freyn 95, Ny. I. c.), Kolozs, Berkenyes, Virágosv. (Freyn 95), Torda (Ercsei 37, Freyn 95), Gerend (Simk. En. 382), M.záh, Kékes (Pr. Cp. 93, 144), Bonchida-Szék, Cege-Pujon(!), Kályán (Soó 117), Bazéd, Szabéd (Lengy. ap. Soó 117), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 121)

1167. *C. rotundifolia* L. — (EK. 291) — Kv. Szénafű (*b. dentata* Schur), Kolozs, K.bós, Berkenyes, Virágosv., Ajton (*f. graminifolia* Hrubby sec. Ny.), Szújvár, Kékes, Buza. — Torda (Freyn 95)

1168. *C. persicifolia* L. et *b. dasycarpa* (Kit.) Beck. — Frequentes.

1169. *C. rapunculus* L. — Apahida (Ny. Kv. 517), Szújvár (K. et O. 7), Torda (Ercsei 37)

1170. *C. patula* L. — *a. stricta* Wallr. Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 158) — *b. sextoeaulon* Beck. — Frequens.

1171. *C. latifolia* L. — Ad limites : Torda (Wolff 62)

Quid sit *C. elatine* e Vszt.iván (K. et O. 6) nescio.

Dubia: *C. macrostachya* Kit. — Kolozs, K.bós, Virágosv. (Freyn 95)

Delenda : *C. carpatica* Jacq. — Torda (Ercsei 37, Sebők 45)

1172. *Adenophora liliifolia* (L.) Bess. — (EK. 291) — Kv. Szénafű (typus, *f. perpallens* Borb., *f. stylosa* (Lam.) et *f. intermedia* R. et Sch.) — recentius non inventa — Kolozs, K.bós (etiam *f. stylosa*), Ajton, Buza. — Torda (Bgt. I. 148, Ercsei 37)

1173. *Asyneuma canescens* (W. et K.) Gr. et Sch. (Kv. Szénafű, Fejér (Schur VSV. X. 105, Soó GM. 98, AGH. V. 116, Pr. Cp. 117, auct. plures ap. Ny. Kv. 513), Apahida(!), Dezmér-Pata (Ny. I. c.), Kolozs (Freyn 95), K.bós (Freyn 95, Richt. ap. Ny. I. c.), K.kara (Richt. I. c.), Torda, M.záh, M.Iudas (Ercsei 124), Gerend (Wolff 62), Apahida-Kályán, Korpád, Iklód, Szék, Cege (Soó 117), Vszt.gothárd, Vszt.egyed (Janka 589), Szújvár (K. et O. 5), Kékes (Pr. Cp. 144), Bál (Pr. FK. 1914. 313), Bazéd (Lengy. ap. Soó 117) — *b. salicifolium* (Kit.) Játv. — Kv. Szénafű (Ujv. Kv. 667), K.bós (Ny. I. c.)

1174. *Phyteuma tetramerum* Schur. — Szújvár (K. et O. 19), Szék (Janka 583 sub „*Ph. spicato*“)

Compositae.

1175. *Eupatorium cannabinum* L. --- Frequens. (*f. puberulum* Beck)

1176. *Solidago virga-aurea* L. — Frequens.

1177. *S. canadensis* L. — Kv. Szszt.miklós (Soó 118, Priszter 91) Adventiva.
 1178. *S. gigantea* Ait. var. *leiophylla* Fernald (*S. serotina* auct.) — Kv. — Szszt.miklós-Apahida (Soó 118, Priszter l. c.) Adventiva.
 1179. *Bellis perennis* L. — Kv. Szamosv. (Soó Consp. 44), F.mikola (Hg. II. 66), Bonchida (!Györffy Szegedi F. II. 67), Cege(!), Torda (Ercsei 143)
 1180. *Stenactis annua* (L.) Nees — Bonchida : Bánffy-park (Soó 118)
 1181. *Erigeron canadensis* L. — Frequens.
 1182. *E. acer* L. — Frequens. — *b. corymbosus* (Wallr.) — Kv. Szénafű (Borb. Balaton fl. 527, deest in Ny. Kv. 527), Dés (Schur VSV. X. 115) — *c. serotinus* (Weihe) Wirtg. — Kv. Szénafű, Szamosfa (cf. Soó BK. XXIII. 151)
 1183. *Aster linosyris* (L.) Bernh. — Kv. Szénafű, Melegv. (Soó GM. 98, 101, in Gr. 248, AGH. V. 148—9, Kv. 525, 667, Consp. 56, Pr. Cp. 84, 140—1, Fl. II. 292, Ny. FK. 1941. 46, Kv. 525, Meusel 201, 301, Ghisa BCl. XXI. 60), Szamosfa, Apahida (Soó BK. XXV. 145, Consp. 50—1, 56, Ny. Kv. 525, Ujv. Kv. 667, Csűrös BCl. XXVII. 83), Kolozs (Bgt. III. 85, Soó in Gr. l. c., Consp. 50, Pr. Fl. II. 295), K.bós, Ajton, Berkenyes, Virágosv. (Freyn 86), Torda (Bgt. l. c., Ercsei 15, Wolff 61, Freyn 86, Borza FER. 193, Pr. Cp. 53, Fl. l. c.), Bonchida-Szék(!), Szék (!Janka 576, ÖBZ. VI. 363), Sz.újvár (K. et O. 16), Hesdát (Pr. Cp. 87), Dés (Czetz 13, Janka 576), Kékes, M.záh, A.zsuk (Pr. Cp. 92, 146, 152)
 1184. *A. punctatus* W. et K. — Kv. Szénafű, Melegv. (Andrae BZ. XIII. 305, Schur VSV. X. 104, Simk. En. 300, Barth 112 sub „*A. exaltato*“, Hayek 466, Soó GM. 93, Pr. Cp. 88, 140, Ny. Kv. 526, FK. 1941. 46), Szamosfa (Landoz Kv. I. 9), Apahida (Soó Consp. 56), Kolozs (Bgt. III. 127), K.bós (Freyn 86), Virágosv. (Freyn 86, FER. 671), Torda (Bgt. l. c., Ercsei 61, Barth 112), M.záh (Simk. En. 300), Dés (Czetz 15, Pr. Cp. 79, 88) In formis : *angustifolius* (Roch.) et *latisiliolius* (Roch.) Borb. (cf. Soó BK. XXII. 61)
 1185. *A. amellus* L. — Kv. Szénafű (Soó GM. 91, 98, AGH. V. 146, 149, Kv. 526, Pr. Cp. 84, Ny. Kv. 526, Meusel 300), Fejér, K.bós, K.kara (Richt., Ny. Kv. l. c.), Torda (Ercsei 61, Wolff I. 61), Apahida, Bonchida-Szék(!), M.záh (Pr. Cp. 93, 147), Vszt.gothárd (Janka ÖBZ. VIII. 366), Vszt.iván (K. et O. 5), Dés (Czetz 11), M.vásárh. (Barabás ap. Wagner TTK. 1900 PF. 46) — *b. amelloides* (Bess.) — Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 151)
 1186. *A. tripolium* L. — In pratis humidis salinis frequens. (Citata uti ap. species *Triglochin maritima*, *Lotus tenuis* etc.) — *ssp. pannonicus* (Jacq.) Soó Formae similes : Szamosfa (Soó GM. 100), Dés (Schur, En. 304)
 1187. *Filago arvensis* L. — Frequens, sed in ditione rarius — *b. gracillima* Schur — Szamosfa (Soó BK. XXV. 145, in Gr. 249)
 1188. *F. germanica* L. (*a. canescens* (Jord.) Gr. et Godr.) — Kv. Szénafű (Pr. Cp. 168), Szamosfa (Soó Kv. 528), M.vásárh. (Ny. Mv. 106) — *b. vireseens* W. et Gr.: *lutescens* (Jord.) Gr. et Godr. — Szamosfa

- Apahida (Schur En. 318, sec Soó BK. XXII. 77 dubia), Torda (Bgt. III. 100)
Dubia : *F. montana* L. — Torda (Ercsei 67)
 1189. *Antennaria dioica* (L.) Gärtn. — (EK. 291) — Kv. Szénafű (Richt., Ny. Kv. 528, Soó Kv. 528, 668), Kályán (Soó 118), Sz.újvár (K. et O. 4)
 1190. *Gnaphalium silvaticum* L. — Ajton (Freyn 89), Kékes (Pr. Cp. 101), Pókakeresztúr (Lengy. ap. Soó 118), Torda (Ercsei 68)
 1191. *G. uliginosum* L. — Szamosfa (Ny. Kv. 528 f. *strictum* Nyár.) Kv. — Apahida (!Priszter AGH. VI. 89), Fejér (Soó Kv. 688), K.borsa-Válaszút, Bonchida(!), Ajton (Freyn 89), Kékes (Pr. Cp. 101), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 123)
Dubia : *Helichrysum arenarium* (L.) Mönch — Torda (Bgt. III. 95, Ercsei 68)
 1192. *Inula helenium* L. — (EK. 291) — Kv. Szénafű, Fejér, Sz.jenő, Bonchida-Szék, Sz.újvár, Doboka-Moró-Kecsed. — Torda (Ercsei 134), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. Suppl. 50)
 1193. *I. bifrons* (L.) Bernh. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 102, Borb. ap. Ny. Kv. 529), Torda (Bgt. III. 102, Freyn 87, Borb. in Engl. Jahrb. XVIII. 243), Harasztos, Gerend (Simk. En. 306), M.vásárh.-Szászrégen (Ny. ap. Pr. Cp. 95)
 1194. *I. eonyza* DC. — Kolozs (Freyn 87), Torda (Bgt. l. c., Ercsei 84, Freyn 87), Sz.újvár (K. et O. 14)
 1195. *I. ensifolia* L. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 102, Soó GM. 88, 91, 98, AGH. V. 146—8, Kv. 531, auct. multi ap. Ny. Kv. 531, Pr. Cp. 142, Meusel 201, 300, Ghisa BCl. XXI. 61, FER. 1784b.), Apahida-Telekfarka, Pujon, Szék (Soó 118), Kolozs, K.bós (Freyn 87, Ny. l. c.), Ajton, Virágosv. (Freyn 87), Torda (Winkler 48, Wolff 61), M.szovát (Pop Guide 165), Vszt.iván (K. et O. 14), Kékes, M.záh, Báld, A.zsuk (Pr. Cp. 92—3, 146—7, 152), Désakna (Hg. II. 71) — *f. pinifolia* Beck et *f. latifolia* Schur cum typo, sic Kv. Szénafű(!)
 1196. *I. salicina* L. *b. aspera* (Poir.) Beck. — Frequens. Typus rarius (Kv. Szénafű —!, Ny. Kv. 530), Sz.újvár (K. et O. 14?) — *c. pseudosalicina* Simk. — Kv. Szénafű (Simk. TF. II. 151, En. 305) — *d. subhirta* C. A. May. — Kv. Szénafű (Soó GM. 91, 98, Kv. 531), K.bós, Virágosv. (Ny. Kv. 531)
 1197. *I. hirta* L. — Frequens.
 1198. *I. germanica* L. — Kv. Szénafű, Melegv. (Schur VSV. X. 102, Soó GM. 98, Kv. 530, 668, Pr. Cp. 83, auct. multi ap. Ny. Kv. 530, Meusel 201, 301), Apahida (Soó AGH. V. 149), Kolozs, Virágosv. (Freyn 87), Torda (Bgt. III. 130, Ercsei 134, Winkler 48, Wolff 61), Gerend (Simk. En. 304), M.szovát (Péterfi MBL. XVII. 59), Kékes, M.záh, A.zsuk, Sóspatak (Pr. Cp. 92, 146—7, 152—3), Sz.újvár (K. et O. 14, Pr. Cp. 118), Fejér, Bonchida-Szék, Szék, Telekfarka-Apahida, Korpád, Feketelak (Soó 118)
 1199. *I. britannica* L. — Frequens. — *f. monocephala* Schur — Szamosfa, Apahida (Soó BK. XXIII. 145, in Gr. 248, GM. 101) — *b. viridis* (Wahlbg.) A. et Gr. — Vszt.iván (K. et O. 14)
 1200. *I. ensifolia* × *germanica* (*I. hybrida* Baumgt.) *a. transsilvanica* (Schur) Zsák — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 102, Simk. MNL. II.

148, En. 304, Soó GM. 98, Kv. 531, Bélteki, Gugler in Kv. 531, Ujv. Kv. 668), Torda (Winkler 48, Wolff 61), Telekfarka-Apahida (Soó 118), Gerend (Nyár. ap. Soó 118), Vszt.iván (Pr. MBL. XII. 126), Vszt.gothárd-Feketelak (Janka ap. Borb. I. c. 229), Szék(!), M.záh Pr. Cp. 147) — **b. pseudoensiformis** Schur — Kv. Szénafű (Simk. I. c., Borb. I. c., Ujv. I. c.), Telekfarka-Apahida (Soó 118) — cf. Zsák MBL. XXV. 395.

1201. **I. ensifolia** × **salicina** **b. aspera** (**I. Vrabélyiana** Kern.) — Kv. Szénafű (Simk. MNL. I. c., Borb. I. c. 236, Soó GM. 91, 98, Pr. Cp. 142, Ny. Kv. 532), Apahida (Ujv. Kv. 668), Kolozs (Freyn 87) — **b. Bart-hiana** Schur — Kv. Szénafű (Simk. I. c., Soó GM. I. c., Pr. Cp. 142) — **c. Neilereichii** Beck (*ensiſ.* × *salicina?*) — Kv. Szénafű (Ny. Kv. 532), Szék (Soó 118)

1202. **I. hirta** × **salicina** **b. aspera** (**I. hispida** Schur) × Kv. Szénafű (Simk. En. 305, Soó GM. 91, Kv. 531, Pr. Cp. 136, Ujv. Kv. 668), K.bós-Virágosv. (Ny. Kv. 531), — **b. semicordata** Borb. — Kv. Szénafű (Borb. I. c. 241)

1203. **I. germanica** × **salicina** **b. aspera** (**I. media** M. B.) — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 102, Simk. MNL. II. 148, Borb. I. c. 228, Soó GM. 98, Pr. Cp. 142), Torda (Winkler 48) — **b. pseudogermanica** Beck — Kv. Szénafű (Simk. I. c., Borb. I. c., Soó I. c.)

I. oculus-Christi L. — (EK. 281) — Sz.újvár (K. et O. 15), Mócs (Pr. MBL. V. 32), Torda (Ercsei 134) certe delenda.

1204. **Pulicaria vulgaris** Gärtn. — *Vulgaris*, sed in ditione nostra rarius.

1205. **P. dysenterica** (L.) Bernh. — Kv. Szénafű (Ny. Kv. 532, Soó Kv. 668), Szamosfa, Szt.györgyh. (Ny. EM. 1941, 119, Borb. ap. Ny. Kv. 532) — **b. dentata** (Sibth. et Sm.) DC. (*P. uliginosa* auct.) — Vszt.gothárd (Janka 581)?

1205a. **Telekia speciosa** (Schreb.) Baumg. — Ad limites : Torda (Wolff 61, FEAH. 661, Freyn 87)

1206. **Xanthium spinosum** L. — Frequens.

1207. **X. strumarium** L. — Frequens.

1208. **Rudbeckia laciniata** L. — Kv. — Apahida (Soó BK. XXII. 73, Kv. 533, Bélteki, Richt. Ny. Kv. 533), Bonchida (Soó 118)

1209. **Bidens tripartita** L. — Frequens. — *f. pumila* Roth Kv. — Apahida (Priszter AGH. VI. 89)

1210. **B. cernua** L. — Kv. Szénafű (Soó GM. 95, Kv. 668), Szamosfa (auct. pl. ap. Ny. Kv. 534, Priszter I. c. cum *f. nana* Neirl.), Apahida (Priszter I. c.), Sz.újvár (K. et O. 6), Torda (Ercsei 178)

Helianthus annuus L. — Subspont. : Kv.-Apahida (Soó BK. XXIII. 151, Priszter I. c.), Kolozs, Berkenyes, Torda, A.gyéres (Freyn 87)

Coreopsis tinctoria Null. (*bicolor* Rchb.) — Subspont. Szszt.miklós (Priszter I. c.)

1211. **Galinsoga parviflora** Cav. — Frequens.

1211a. **G. quadriradiata** Ruiz et Pavon = **G. aristulata** Bickn. — Szszt.miklós (Priszter I. c. sub *G. ciliata*), anne *ssp. hispida* (DC.) Thell. (*G. ciliata* (Raf.) Blake)

1212. **Anthemis cotula** L. — Frequens.

1213. **A. tinctoria** L. — Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 151, cum *f. pallida* DC., GM. 87, Wolff, Richt., Ny. Kv. 531), Szamosfa (Borb. Kolozs (Soó Kv. 668), Torda (Bgt. III. 147, Ercsei 106, Janka 579 cum *f. monocephala*), M.záh, M.pagocsa (Ercsei 106), M.szilvás (Borza BK. VIII. 18), Kékes, A.szszmiklós (Pr. Cp. 92—3), Szék, Cege (Soó 118), Pujon, Vszt.gothárd, Korpád, Telekfarka-Apahida(!), Bazéd, Szabéd (Lengy. ap. Soó 118), Bala (Ny. ap. Soó I. c.), M.vásárh. (Ny. Mv. 108), Kecsed, Doboka-Bádok (Hg. I. 126, 129) — *f. discoidea* (Willd.) Vahl — Kv. Szénafű (Winkler 50)

1214. **A. arvensis** L. — Frequens. — **b. Haynaldii** (Janka) Simk. — Kv. Szénafű (Pr. Cp. 168, Ny. Kv. 535), Torda (Schur VSV. X. 78), Vszt.iván (K. et O. 4), Vszt.gothárd (Janka ÖBZ. VI. 1), Pujon (Janka 578, ÖBZ. VI. 363 sub „*A. nullicauli*“), Mezőbő (Simk. En. 314)

1215. **A. ruthenica** M. B. — Kv. (Schur ap. Ortmann ÖBZ. VI. 154, Pr. Cp. 168)?, Torda, Mezőség (Schur En. 332), Ölfüzes, Kolozsnéma (K. et O. 4) — magis *dubia* (cf. Soó BK. XXII. 77)
A. austriaca Jacq. — M.vásárh. (Ny. ap. Soó Scripta I. 51) Adventiva?

1216. **Matricaria matricarioides** (Less.) Port. (*M. discoidea* DC.) — Kv.-Apahida (Soó BK. XXII. 70, Bot. Arch. XIX. 360, Priszter 90), K.bós-Virágosv. (Ny. Kv. 538), M.vásárh. (Ny. Mv. 108, Barabás ap. Wagner TTK. 1909. PF. 46), Cege, Vszt.gothárd (Soó 118)

1217. **M. maritima** L. ssp. *inodora* (L.) Soó — Frequens. — *f. bicostata* Nyár. Kv. Szénafű (Ny. Kv. 539)

1218. **M. chamomilla** L. — Frequens. — **b. salina** Schur — Szamosfa (Soó BK. XXV. 145, in Gr. 248, GM. 101, Consp. 50, 56), Kolozs (Schur VSV. X. 111, Soó Consp. 33, 51), Szék-Gyulatelke (Soó Consp. 33), Torda (Soó in Gr. 248)

1219. **Achillea setacea** W. et K. — Kv. Szénafű, Melegy. (Schur VSV. X. 103, Barth 112, Soó Kv. 537, Consp. 50—1, 56, Ny. Kv. 537, Meusel 301, Ujv. Kv. 668), A.zsuk (Pr. Achillea 37), Szamosfa, Apahida (Schur En. 328, Freyn 88, Soó I. c., GM. 101, in Gr. 248, Pr. I. c., Ny. I. c.), Kolozs (Schur I. c., Janka ap. Pr. I. c., Soó in Gr. I. c., Consp. 56), Virágosv. (Freyn 88, Pr. I. c.), Torda (Schur VSV. X. 78, En. 328, auct. plures ap. Pr. I. c., Soó I. c.), M.csán (Ercsei 33), M.záh (Ny. ap. Pr. I. c.), M.szovát (Péterfi MBL. XVII. 59, Pop Guide 165), Szék (Soó Consp. 51), M.vásárh. (Ny. ap. Pr. I. c.) — *f. salina* Schur — Szamosfa (Soó Kv. 536), Kolozs (Schur En. 328)

1220. **A. millefolium** L. — Typice raro : Kv. Szénafű, Fejér, Szt.györgyh. (Wolff, Ny. Kv. 537, Soó Kv. 668, cf. GM. 84—93), Kolozs (Soó Kv. 668), K.bós, Virágosv. (Ny. ap. Pr. Achillea 41), Kékes (Pr. I. c., Cp. 77), Sz.újvár, A.zsuk (Pr. Cp. 74, 152 anne typus?), B.váralja (Hg. III. 129), K.borsa(!), Kecsed (Hg. I. 126)

ssp. *collina* (Becker) Weiss — Frequens, etiam transitus ad typum et ad *ssp. pannonicam* (cf. Ny. Kv. 538) *f. luxurians* Nyár. — Szamosfa (Soó Kv. 537) — **b. tenuis** (Schur) : tr. ad *A. asplenifolium* Vent. — Kv. (Simk. En. 318), Szamosfa (Soó GM. 101, BK. XXV. 145), Kékes (Pr. MBL. V. 32)

1245. *S. erraticus* Bert. ssp. *barbareifolius* (W. et Gr.) Hegi — Frequens. — Sec. Ny. Kv. 518 etiam typus (Szszt.miklós)
1246. *S. doria* Nath. var. *Biebersteinii* Lindm. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 103, Hayek 466, Soó GM. 93, AGH. V. 149, Kv. 668, Ny. FK. 1941. 46, Kv. 516—7 — auct. plures —, Pr. Cp. 84, 96), Ny. FK. 1941. 46, Kv. 516—7 — auct. plures —, Pr. Cp. 84, 96), Szamosfa (Freyn 90, Borb. ap. Ny. Kv. 546), Kolozs, K.bós (Freyn 90, Ny. I. c.), Virágosv. (Freyn 90), Torda (Eresei 164, Wolff 61, Schur VSV. X. 78, Hayek 466), Gerend, M.záh (Simk. En. 329), M.szovát (Pr. Cp. 91, Pop Guide 165), Vszt.gothárd, Kékes (Pr. MBL. V. 32, Pr. Cp. 92), Sz.écs (Pr. Cp. 91), Sz.újvár (K. et O. 23) — **b. transiens** (Nyár.) Soó — Kv. Szénafű (Ny. Soó Kv. 547)
- ssp. *umbrosus* (W. et K.) Soó — (EK. 282) — Kv. Szénafű (etiam Barth 113), Kolozs, K.bós, Berkenyes, Fejér, Sz.jenő, Feketelak, Vszt.gothárd-Feketelak.
1247. *S. nemorensis* L. — (EK. 282) — Kolozs, Ajton, Sz.újvár, Kékes, Szabéd. — Torda (Eresei 165, Wolff 61).
1248. *S. fluvialis* Wallr. — (EK. 282) — Kv. Szénafű, Szszt.-miklós-Apahida, Kereklo, Bonchida. — Szamosfa-Apahida (Priszter 90), Torda (Freyn 90), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 128) Dubia : *S. paludosus* L. — M.záh (Eresei 164), Torda (Sebők 31)
1249. *Echinops sphaerocephalus* L. — Kv. Szénafű, Fejér (Schur VSV. X. 99, Soó GM. 87, 91, Kv. 549, 668, Bélt. Ny. Kv. 549), Kolozs, K.bós, Ajton, Berkenyes (Freyn 90), Torda (Barth 113, Wolff 61), M.záh (Eresei 92), Vszt.gothárd (Janka 582), Szabéd (Szakmáry 119), Sz.újvár (K. et O. 11), Pujon-Ombozelke(!), Iklód (Soó 119), P.kamara, M.kece (Nyár. ap. Soó 119), Désakna (Hg. II. 71)
1250. *E. ecommutatus* Juratzka — Kv. Szénafű (Ny. Kv. 549, Ghisa FER. 2298b.), Mócs (Pr. Cp. 109, 119), Sz.újvár (K. et O. 11, Pr. Cp. 119), Torda (Winkler 49), Freyn 90) — **b. eglandulosus** (Schur) Soó (*E. globifer* Janka) — Kv. Szénafű (Borb. ap. Ny. Kv. 550), Vszt.-gothárd (Janka 582)
- Calendula officinalis* L. — Subspont. : Apahida (Priszter 90)
1251. *Xeranthemum foetidum* Mönch — Kályán, Ombozelke (Soó 119), Teke-Erked (Balázsp. Ny. Kv. 550), Mócs, Teke-M.királyfa (Pr. Fl. I. 1030), Sz.újvár (K. et O. 27), Kékes (Pr. Cp. 93) — Kv. (Wolff, Schur VSV. X. 104)?
1252. *Carlina acaulis* L. — Kv. Szénafű „Morgó“ (Ny. Kv. 550), Kolozs, K.bós; Berkenyes, Ajton (Freyn 90) — **b. alpina** (Jacq.) Beck — Kolozs, K.bós (Freyn 90)
1253. *C. vulgaris* L. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 99, Ny. Kv. 550), Dezmér (Ny. I. c.), Torda (Eresei 88)?, Sz.újvár (K. et O. 7, Pr. Cp. 118), Kékes (Pr. Cp. 144), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 129) ssp. *intermedia* (Schur) Hay. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 99, Soó GM. 87, 91, AGH. V. 146, Ny. Kv. 550), Szamosfa, Apahida (Soó BK. XXV. 145, in Gr. 248 *f. salina*), Kolozs (Soó Kv. 668), Bonchida-K.iklód, Szék (Soó 119), Dés (Schur VSV. X. 115), Fejér, Torda(!), Szabéd (Lengy. ap. Soó 119)
1254. *Arctium lappa* L. — Frequens.
1255. *A. minus* (Hill) Bernh. — Kv.-Szamosfa(!), Apahida (Ny. Kv. 551), Kolozs (Schur En. 414), Sz.újvár (K. et O. 3), Bonc-

- hida, Désakna (Morariu BCl. XXIII. T. V.), Torda (Schur VSV. X. 79), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 130)
1256. **A. tomentosum** Mill. — Frequens.
1257. **A. lappa** × **tomentosum** (**A. ambiguum** (Cel.) Nym.) — Szamosfa (Soó Kv. 551, Priszter 91), Dezmér (Priszter I. c.)
1258. *Jurinea mollis* (Torner) Rchb. ssp. *transsilvanica* (Spr.) Hay. (*J. Simonkaiana* Nyár.) — In formis multis : *f. tenuisecta* Schur, *f. Nyárádyana* Soó, *f. integrifolia* Schur, *f. heterophylla* Schur, *f. major* Nyár. — (AGH. V. 170—1) — Kv. Szénafű, Apahida, Dezmér-Györgyfalva, A.zsuk, Szamosújvár, K.borsa-Válaszút, K.borsa, K.bós-Virágosv., M.szovát, M.záh, Vszt.gothárd, Kékes, A.sztmiklós, Sz.écs, Bál, Sz.máté, Szabéd, Faragó-N.nyulas, M.vásárh., Torda. — Kolozs, K.bós, Berkenyes, Virágosv. (Freyn 90), Gerend (Simk. En. 344), Kecsed (Hg. I. 126), Fejér(!), Szék, Pujon, Cege, Feketelak, Ombozelke, M.szava, Kályán (Soó 119), cf. et Ny. Kv. 551—554, Soó Kv. 668 — **b. tr. pareetomentosa** (Nyár.) Soó — Kv. Szénafű (Pr., Butujás ap. Ny. Kv. 551, Soó AGH. V. 171), K.borsa-Válaszút (Soó I. c.), Fejér (Soó 119), Mójos (Lengy. ap. Soó 119) — **e. tr. macrolepis** Simk. — M.záh (Alexi ap. Soó I. c.)
1259. *Carduus hamulosus* Ehrh. — Kv. Szénafű, Fejér (Landoz I. 10, Andrae BZ. XIII. 312, Schur VSV. X. 99, Barth 113, Winkler 50, Soó GM. 91, AGH. V. 149, Pr. Cp. 83, 136—7, 141, auct. plures ap. Ny. Kv. 554, Ghisa BCl. XXI. 62), Apahida (Freyn 91, Barth 113, Soó AGH. V. 150, Ny. I. c. cum *lus. albus* Nyár.), Kolozs (Schur En. 415, Barth 113, Freyn 91) -K.bós (Ny. FER. 2082), K.bós, Berkenyes, Virágosv. (Freyn 91), Torda (Bgt. III. 56, Wolff 61, Freyn 90), Gerend (Wolff I. c.), M.záh (Pr. Cp. 93, 147), M.szovát (Pr. Fl. II. 212), Kékes, Bál (Pr. FK. 1914. 314, Cp. 92, 146), Vszt.gothárd (Janka MTK. XII. 180), Sz.újvár (K. et O. 7 sub „*C. collino*“, Pr. Cp. 118), Apahida-Kályán, Bonchida-Szék, K.iklód, Szék, Pujon, Feketelak, Ombozelke, M.szava (Soó 119), Szabéd (Lengy. ap. Soó 119), Bala (Nyár. ap. Soó 119), K.borsa-Válaszút(!)
1260. *C. erispus* L. — (EK. 282) — Dezmér, Apahida, Kolozs-K.bós, Korpád, Bonchida-Szék, Vszt.gothárd, Sz.újvár, Gyeke-N.sármás. — **b. multilorus** (Gaud.) DC. — Sz.újvár (K. et O. 7)
1261. *C. acanthoides* L. — Frequens. — *lus. albiflorus* Schur — Kv. Szénafű (Soó BK. XXV. 145)
1262. *C. personata* (L.) Jac. — Kv. Szénafű „Harmadv.“ (Ny. Kv. 555), *f. simplicifolius* Sang. (an recte determinata?, magis 1240b.) — Torda (Wolff 61)
1263. *C. nutans* L. — Torda (Ercsei 24), M.vásárh. (Ny. Mv. 107)
1264. *C. acanthoides* × *hamulosus* (*pseudohamulosus* Schur) — Kv. Szénafű (Borb., Ny. Kv. 554), Bonchida-Szék (Soó 119)
1265. *Cirsium vulgare* (Savi) Ten. — Frequens.
1266. *C. furiens* Griseb. et Schenk — (AGH. V. 172—173) — Kv. Szénafű, Kolozs, Torda, M.záh, M.ludas, M.kece, Bazéd, M.szovát, Sz.újvár-K.borsa-Válaszút, Apahida-Kályán(!), K.bós, Berkenyes, Virágosv. (Freyn 90), Vszt.iván (K. et O. 8), Vszt.gothárd (Janka ÖBZ. VI. 204), Nyulas (Kovács), M.vásárh. (Ny. ap. Soó Szf. 131) Huc pertinere videtur *C. decussatum* (Pr. Cp. 152) ex A.zsuk.

1283. *C. indurata* Janka (*C. phrygia* ssp. — Stoj. et Acht.) — Kv. Szénafű (Soó GM. 84, 87, 91) sec. Ny. l. c. magis *C. pugioniformis* — Vszt.gothárd (Janka 584, Cp. 101, Flora 1858. 444, ap. Wagn. 164), Dés, Sz.újvár, Kékes, Buza, Szék (Pr. C. 214, Cp. 101, ap. Wagn. 164), K.bórsa(!)

1283a. *C. pugioniformis* Nyár. (cf. Ny. BK. I. c. 28 sub *C. oxylepide*, Kv. 568, Borbásia Nova № 19, B. Cl. XXV. 221) — Kv. Szénafű (Ny. I. c., Soó ap. Ny. I. c., et *f. pratensis* Nyár.), Kolozs (Pr. ap. Ny. I. c., Soó Kv. 668 et *f. minoriceps* Nyár.) — **b. basilata** Nyár. — Kv. Szénafű (Ny. I. c., Soó ap. Ny. I. c.), M.szovát (Pr. ap. Ny. BK. XL. 29) — **c. porrecta** Nyár. Kv. Szénafű (Soó ap. Ny. I. c. *f. albociliata* Nyár.) — **d. lanuginosa** Nyár. — Kv. Szénafű (Gugler ap. Ny. I. c. *f. fastigiata* Nyár.) Transiti vel hybrides secundarii :

1283b. *C. Landoziana* Nyár. (*pugioniformis* — *indurata*) Kv. Szénafű (Ny. BK. I. c. 35, Kv. 580, Soó ap. Ny. I. c.), K.bós (Ny. I. c.), Kolozs (Pr. ap. Ny. I. c.)

1283c. *C. Béltekiana* Nyár. (*pugioniformis* — *pseudophrygia*) Kv. Szénafű (Soó ap. Ny. I. c.), Kolozs-K.bós (Ny. I. c.)

1284. *C. pseudophrygia* C. A. Mey. (*C. phrygia* ssp. — Gugl.) — Kv. Szénafű (Soó BK. XXV. 145, GM. 87, 91 sec. Ny. I. c. non typice), Buza (Pr. C. 207)

1284a. *C. Baumgarteniana* Wagn. (*C. pseudophrygia* — *indurata*) — Kv. Szénafű (Soó BK. I. c., ap. Ny. I. c.)

1285. *C. austriaca* Willd. — Kv. Szénafű (Soó GM. 84, 91, ap. Ny. I. c., Pr. Cp. 134—137, Pr. C. 204, Ny. I. c., Richt., Hg. ap. Ny. I. c., Ghisa BCl. XXI. 62), Kolozs (Pr. ap. Ny. I. c.), Kolozs-K.bós (Ny. I. c.), M.bánd, Dés (Pr. C. 204), Sz.újvár, Vszt.iván (K. et O. 7)

1285a. *C. semiaustriaca* Nyár. (*austriaca* — *pugioniformis*) — Kv. Szénafű (Richt., Ny., Soó, Borza ap. Ny. BK. XI. 36, Kv. 580 et *f. nigriceps* Nyár.), K.bós (Ny. I. c.)

1286. *C. Prodanii* Wagn. (*austriaca* × *indurata*) — Kv. Szénafű (Soó BK. XXV. 145, GM. 91, Kv. 581, L. Richt., Hg., Ny. ap. Ny. BK. XI. 36, Kv. 581), K.bós (Ny. I. c.), Kékes (Pr. C. 216), Csákigorbo (Pr. ap. Wagn. 161, Pr. C. 216)

1286a. *C. Erdneri* Wagn. (*austriaca* × *pseudophrygia*) × Kv. Szénafű (Soó, Hg., Ny. ap. Ny. BK. XI. 33, Kv. 578, Pr. C. 209)

1286b. *C. splendida* Nyár. (*austriaca* — *pugioniformis*-*pseudophrygia*) — Kv. Szénafű „Pokolköz” (Ny. BK. XI. 31, Kv. 577)

1287. *C. melanocalathia* Borb. (*C. phrygia* ssp. — Stof. et Ach.) Typica non indicata.

1287a. *C. brasoviana* Nyár. (*melanocalathia* — *pseudophrygia*) resp. *C. Erdneri b. brasoviana* Soó — Kv. Szénafű „Pokolköz” (Ny. BK. XI. 32, Kv. 578)

1287b. *C. bükkensis* Nyár. (*melanocalathia* — *pugioniformis*) resp. *C. semiaustriaca b. bükkensis* Soó — Kv. Szénafű (Ny., Soó ap. Ny. I. c. 31, Kv. 577)

1288. *C. cyanus* L. — Frequens.

1289. *C. trinervia* Steph. — (AGH. V. 175—6) — Kv. Szénafű, Apahida, Kolozs, Egerbegy, Gerend, Torda, M.záh-Budatelke, Kályán,

Katona, Kiscég, Nagycég, Báld, M.ludas. — Citata cf. Soó AGH. I. c., Ny. Kv. 572, etiam Barth 113, Meusel 301, K.bós (Pr. Fl. II. 212)

1290. *C. axillaris* Willd. resp. *C. Triumfetti* All. ssp. *axillaris* Stoj. et Georg. a. *euaxillaris* Stoj. et Georg. (ssp. *axillaris* Dostal) — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 99, En. 405 sub „*C. molli*“, Andrae BZ. XIII. 323, Soó Kv. 573), Kályán (Soó 119) — **b. striata** (W. et K.) Jáv. — Kv. Szénafű (Bgt. III. 74, Schur I. c., Barth 113, Soó BK. XXV. 145, AGH. V. 149, GM. 91, Pr. Cp. 95, 134—137, auct. multi ap. Ny. Kv. 572, FER. 2071, Ghisa BCl. XXI. 62, Pr. C. 65), Taresa (Borza ap. Ny. I. c.), Kolozs (Freyn 90, Barth 113), K.kara, K.bós, Berkenyes, Virágosv. (Freyn 90), Torda (Ercsei 30, Wolff 62, Freyn 90, Barth 113), Gerend (Wolff I. c.), Kékes (Pr. C. 65), Sz.újvár (K. et O. 7, Pr. Cp. 118, C. 65), K.borsa, Kályán(!), Iklód, Pujon, Feketelak (Soó 119) — *f. multicaulis* Schur — Kv. Szénafű, Apahida (Schur VNV. Brünn 1903. 249) — *f. transsilvanica* Hay. — Kv. Szénafű (Soó BK. I. c., Ujv. Kv. 669, Pr. C. 66 sub *f. viridifolia*), Kékes (Pr. I. c.) — *lus. atropurpurea* Prod. — Kékes (Pr. MBL. V. 32, I. c.) — *lus. rosea*, *lus. lilacina* — Kv. Szénafű (Priszter 91) — **c. tr. pseudoaxillaris** Dostal — Kv. Szénafű (Soó, Borza Kv. 573), Pujon (Soó 119)

1291. *C. stoebe* L. ssp. *mieranthos* (Gmel.) Hay. resp. *C. maculosa* Lam. ssp. — Gugl. Frequens. — *f. subpallida* Gugl. — Szamosfa (Soó BK. XXV. 145) — *f. subcanescens* Gugl. — Kv. Szénafű (Soó I. c.) — *f. spinescens* Borb. — Szamosfa, Apahida (Richt., Soó Kv. 574) — *f. scopaeformis* Wagn. — Kv. Szénafű (Soó BK. I. c., Wolff Kv. 574, Pr. Cp. 141), Mócs, Kékes, Sz.máté (Pr. C. 142, ap. Wagn. 109), Torda (Borza ap. Pr. C. I. c.) — *f. fastigiata* (Mor.) Gugl. — Szék, Vszt.gothárd (Janka ÖBZ. VI. 363, MTK. XII. 179), Kékes, N.devescser (Pr. MBL. V. 32) — *C. tenuiflora* auct. ex Pr. C. 151—153, vix a praecedenti differt.

ssp. *rhenana* (Bor.) Sch. et Th. (*C. maculosa* ssp. — Gugl.) — Kv. Szénafű (Pr. Cp. 83, Meusel 301) -Szamosfa (Ny. Kv. 574), Szamosfa-Apahida (Pr. Cp. 138), M.záh, Mócs, Sz.újvár Báld (Pr. Cp. 93—4, 118, 146—7 verisim. b.), Kékes (Pr. MBL. V. 32 *f. umbrosa* Simk.) — Kolozs-K.bós (Ny. I. c. *f. megamelas* Borb.)

b. tr. micro-rhenana Nyár. — Kv. Szénafű, Taresa (Richt., Borza, Soó Kv. 575), Apahida-Kolozs-K.bós (Richt., Ny. Kv. 574)

1292. *C. seabiosa* L. — (ssp. *vulgaris* (Koch) Hay.) — Kv. Szénafű (Bgt. III. 77, Schur VSV. X. 101, Soó GM. 91, 98, AGH. V. 145—7, Kv. 575, Bélt., Ny. I. c.), Sz.újvár (K. et O. 8), Kolozs (Bgt. I. c.), Torda, Gerend, M.záh (Ercsei 30), sed loca natalia posteriora magis ad ssp. B. pertinent. — *f. angustifrons* Gugl. — Kv. Szénafű, Taresa (Soó BK. XXIII. 145, Ny. I. c.), Apahida (Zsák ap. Ny. I. c.)

b. eretacea (Woerl.) — Kv. Szénafű (Soó I. c.) — **c. silesiaca** Borb. — Kv. Szénafű (Soó I. c., Richt. ap. Ny. I. c., cf. Wagn. 82, Pr. C. 104), Kékes (Pr. I. c.)

d. tr. pseudospinulosa Borb. — Kv. Szénafű (Soó BK. I. c., Pr. C. 97, auct. multi ap. Ny. Kv. 576), Dezmér (Ujv. Kv. 576), Apahida (Pr. C. 97, Ny. I. c.), Kolozs (Richt. ap. Ny. I. c.), K.bós (Ny. I. c.), Légen, Kékes (Pr. C. 97), Désakna (Hg. II. 71)

ssp. **B. spinulosa** (Rochel) Hay. — Frequens, in formis multis

(*f. curtispina* Gugl. : *typus*) — *f. validispina* Gugl. — Kv. Szénafű (Soó BK. I. c., Pr. ap. Ny. KV. 576), Kolozs (Pr. I. c.) — **b. infertexta** Gugl. — Kv. Szénafű (Soó I. c., Ujv. I. c.), Dezmér (Ujv. I. c.), Apahida (Ny. I. c.)

1293. *C. iberica* × *mieranthos* (*C. Rozaliae* Prod.) — Sz.újvár-Hesdát (Pr. C. 56)

1294. *C. jacea* × *nigreseens* (*C. extranea* Beck) — Kv. Szénafű (Ny. BK. XL. 38, KV. 581), Apahida (Soó ap. Ny. I. c.), Kolozs (Pr. ap. Ny. I. c.)

1294a. *C. jacea* ssp. *pannonica* × *nigreseens* (*C. Thaiszii* Wagn.) — Kv. Szénafű (Soó ap. Ny. I. c. 38, KV. 581)

1294b. *C. jacea* ssp. *banatica* × *nigreseens* (*C. orodensis* Wagn.) — ad limites ditionis (Kv.) indicata.

1295. *C. jacea* × *indurata* (*C. Wagneri* Gugl.) — Kv. Szénafű, Fejérd (Gugler Ann. Mus. N. 1907. 222, Soó GM. 91, BK. XXV. 145, Pr. Cp. 83, C. 215), in formis **a. tenuior** Nyár. et **b. latisquama** Nyár. (cf. Ny. BK. XL. 44, KV. 587 : Gugl., Soó, Hg., Ny.), Kolozs (Pr. ap. Ny. I. c. b.), Vszt.gothárd (Janka ap. Pr. C. 215), Kékes (Pr. Cp. 108, 144, C. 215), Mócs (Pr. Cp. 119), Báld (Pr. FK. 1914, 314), Noszoly, M.veresegyháza M.vásárh. (Pr. C. 215)

1295a. *C. jacea* ssp. *pannonica* × *indurata* (*C. Szöllőssii* Wagn.) — Kv. Szénafű (Soó BK. XXV. 145, GM. 87, 91, ap. Ny. BK. XL. 44, KV. 586, Ghisa BCl. XXI. 62), Szamosfa (Wagn. C. 159, Pr. C. 214, Soó in Gr. 250), Apahida (Soó I. c.), Bethlen (Reithoffer ap. Pr. C. 159), Kékes, M.veresegyháza (Pr. I. c.), M.vásárh. (Ny. ap. Pr. I. c.), Báld (Pr. FK. 1914. 314)

1296. *C. jacea* × *pugioniformis* (*C. sub-Fleischeri* Nyár.) — Kv. Szénafű (Richt., Soó, Hg., Ujv., Borza, Ny. ap. Ny. BK. XL. 40—1, KV. 584, Soó KV. 669 etiam *f. crispulosa* Nyár. et *f. lanuginosa* Nyár. — Borb. ap. Ny. I. c.), Kolozs (Pr. ap. Ny. I. c.), K.bós (Ny. I. c.), Szamosfa (Soó ap. Ny. I. c.) — **b. subdensior** Nyár. — Kv. Szénafű (Ny. I. c., Ujv. KV. 584) — **c. densior** Nyár. — Kv. Szénafű (Ujv. I. c., Ny. BK. I. c. *f. semipratensis* Nyár.)

1296a. *C. jacea* ssp. *pannonica* × *pugioniformis* (*C. flavidia* Nyár.) — Kv. Szénafű (Soó ap. Ny. BK. XL. 41 sub *C. casureperla*, KV. 585), Apahida (Ny. I. c.), Kolozs (Soó KV. 689) — **b. vulpina** (Nyár.) — Kolozs (Soó KV. 689)

1296b. *C. jacea* ssp. *banatica* × *pugioniformis* (*C. aurata* Nyár.) — Kv. Szénafű (Borb., Hg. ap. Ny. BK. XL. 43, KV. 586 et *f. obscura* Nyár.), K.bós (Ny. I. c.)

1297. *C. jacea* × *pseudophrygia* (*C. similata* Hausskn.) — Kv. Szénafű (Soó GM. 87, Ny. BK. XL. 38, KV. 582), Virágosv. (Pr. C. 208)

1298. *C. jacea* × *austriaca* (*C. austriaceoides* Wol.) — Kv. Szénafű (Richt., Zsák ap. Ny. BK. XL. 42, KV. 585), Dezmér (Ujv. KV. 585), Kolozs (Pr. ap. Ny. I. c.)

1299. *C. jacea* × *melanocalathia* (*C. Nyárádyana* Wagn.) — Kv. Szénafű (Richt., Ny. BK. XL. 39, KV. 583)

1299a. *C. jacea* ssp. *pannonica* × *melanocalathia* (*C. melanoma-eroptilon* Nyár.) — Kv. Szénafű (Borza ap. Ny. I. c.)

1300. *C. nigreseens* × *pugioniformis* (*C. pleeskensis* Nyár.) — Kv. Szénafű (Ny. BK. XL. 34, KV. 579)

1301. *C. jacea* × *mierantha* (vel *rhenana*?) *C. fortinata* Wagn.) — Kékes (Pr. ap. Wagn. 131, cf. sequentes), Bethlen (Pr. C. 190) — **b. jacea** (*pannonica*?) × *rhenana* (*Hödliana* Wagn.) Bethlen (Pr. C. 191) — **c. pannonicæ** × *mierantha* (*C. Lykana* Wagn. resp. *C. Amaliae* Prod.) — Kékes (Pr. C. 191)

1302. *C. indurata* × *mierantha* (*C. Kleiniana* Wagn.) — Kékes (Pr. C. 218)

1303. *C. indurata* × *pannonica*(?) × *mierantha* (*C. Emiliae* Prod.) — Kékes (Pr. C. 218)

1304. *C. mierantha* × *spinulosa* (*C. Herbichii* Janka) — Mezőség (Janka Flora 1858. 441), Vszt.gothárd (Janka ap. Pr. C. 96, Wagn. 76), Szék-Sz.újvár (Janka ap. Wagn. 76)

Delenda : *C. atropurpurea* W. et K. — Kv. Szénafű (Richt. ap. Ny. KV. 573)

C. salicifolia auct. (non MB.) — Kv. Szénafű (Janka 584, ÖBZ. VIII. 20), Kolozs, K.bós, Ajton (Freyn 90) ad *C. induratam* et formas affines hybridogenas pertinent.

C. stereophylla Bess. — Vszt.gothárd (Janka MTK. XII. 179) olim subspontanea.

1305. *Cichorium intybus* L. — Frequens.

1306. *Lapsana communis* L. — (EK. 282) — Kv. Szénafű, Fejérd, Dezmér, Apahida, Sz.újvár, F.mikola, Bonchida-Szék, Cege, Pujon, Vszt.gothárd, Kályán, Korpád, N.sármás, Teke, M.vásárh., K.borsa, Doboka-Moró. — Torda (Wolff 62), Dés (Czetz 16)

1307. *Aposeris foetida* (L.) Less. — (EK. 282) — Kv. Szénafű, Fejérd, Ajton, Sz.újvár, Mócs, Bethlen, B.váralja, Szu.németi, Bánok-Doboka-Moró-Tötör. — Dés, Bethlen (!Pr. Cp. 187), Torda (Wolff 62)

1308. *Hypochaeris radicata* L. — Kv. Szénafű, Fejérd (Pr. Cp. 134, Ny. KV. 589, Soó, Ujv. 669), Ród (Ny. I. c.), Cege-Pujon(!), Ö.füzes (K. et O. 14), Torda (Wolff 62), M.vásárh. (Ny. Mv. 109)

1309. *H. maculata* L. — Kv. Szénafű (Soó GM. 91, Pr. Cp. 134—7, Hayek 466, Meusel 201, 300, Ghisa BCl. XXI. 62, Ny. KV. 589) — etiam *f. immaculata* — Apahida, A.zsuk (Ny. I. c.), Kolozs (Freyn 92), K.bós (Freyn 92, Ny. I. c.), Torda (Wolff 62, Freyn 92), Sz.újvár (Hg. II. 68), K.borsa(!), M.vásárh. (Ny. Mv. 109), Bonchida, Cege, Pujon, Vszt.gothárd, Feketelak(!)

1310. *Leontodon autumnalis* L. — Frequens, in formis multis. — *f. kolozsváriensis* Soó — Kv. Szénafű (Soó BK. XXV. 145), Szamosfa, Apahida (Soó in Gr. 249, GM. 100) — *f. pinnatifidus* (Opiz) Schur — Apahida (Soó KV. 590) — **b. hajdonialis** Rapcs. — Szamosfa (Soó BK. I. c., in Gr. 248, GM. 102), Kékes (Prodan!)

1311. *L. hispidus* L. — Frequens, in formis multis, sic *f. denticulatus* Csóngor — Kv. Szénafű, Korpád(!), Kékes (Pr.!) — *f. variifolius* Nyár. — Kv. Szénafű, F.mikola(!), Kékes (Pr.!), Kolozs-K.bós (Nyár.) — *f. ericetorum* (Klett et Richt.) Rchb. — Kv. Szénafű(!)

ssp. danubialis (Jacq.) Soó — Kv. Szénafű (Soó BK. XXV. 145, KV. 590, Borb., Ny. I. c.), Kékes (Pr.!) et *f. xerophilus* Csóng., Fejérd,

Kályán (Soó 120), Sz.újvár (Pr. Cp. 74, 143), M.vásárh. (Ny. Mv. 109, Pr. Cp. 96) — *f. integrifolius* Csongor — F.mikola(!), Kékes (Pr.!)
 1312. *L. asper* (W. et K.) Poir. — Kv. Szénafű (Bgt. III. 18, Schur VSV. X. 101, VNV. Brünn 1897. 187, Pr. Cp. 134, 142, Soó GM. 87, 91, AGH. V. 147, Ny. Kv. 591, FER. 1588), Apahida (Soó AGH. V. 145), Kolozs(!), K.bós (Freyn 92, Ny. I. c.), Vszt.gothárd (Janka ÖBZ. VIII. 366), M.záh (Simk. En. 354), Sz.újvár (Hg. II. 69), Budatölke (Pr. Cp. 145), Fejér, Telekfarka-Apahida-Kályán, Bonchida-Iklód, Szék, Pujon, Feketelak, Omboztelek (Soó 120), Szabéd (Thaisz!), Kékes (Pr.!), M.vásárh. (Ny. Mv. 110)

1313. *Pieris hieracoides* L. — Frequens — *b. umbellata* Schrank — Kv. Szénafű (Richt., Ny. Kv. 592)

1314. *Tragopogon dubius* Scop. — Kv. Szénafű, Melegv. (Barth 113, Soó GM. 88, 91, AGH. V. 147, 150, Kv. 669, Ny. Kv. 592, Ghisa BCI. XXI. 62), Apahida (Soó AGH. V. 150), A.zsuk (Pr. Fl. II. 210), M.szovát (Pr. I. c. 212), Kolozs (Janka ÖBZ. XVIII. 266, Freyn 92), K.bós (Freyn 92, Ny. I. c.), Berkenyes, Virágosv. (Freyn 92), Torda (Ercsei 80, Wolff 62), Vszt.gothárd (Janka ap. Fuss VSV. XIX. 207), M.vásárh. (Ny. Mv. 110), K.borsa, Bonchida(!) — *b. pratensis* (Bess.) — Kv. Szénafű (Soó Kv. 593), K.borsa(!)

1315. *T. orientalis* L. — Frequens. (*T. pratensis* auct. sic Pr.)
 ssp. *Hayekii* Soó — Kv. Szénafű (Hay. Rep. XVII. 36, Soó GM. 98, AGH. V. 176, Simk. Ny. ap. Soó I. c.), K.bós (Ny. ap. Soó I. c., Kv. 593), M.vásárh. (Barabás ap. Soó I. c.)

1316. *Seorzonera purpurea* L. — Kv. Szénafű (Soó GM. 92, AGH. V. 149, Pr. Cp. 135, 138, auct. multi ap. Ny. Kv. 593, Meusel 201), A.zsuk, Ajton (Ny. I. c.), Apahida (!Pr. Cp. 143, Ny. I. c.), Kolozs, K.bós, Berkenyes, Virágosv. (Freyn 92), Torda (Ercsei 123 sub „*S. rosea*“, Wolff MNL. I. 62, Freyn 92), Gerend (Ercsei 123 sub „*S. rosea*“, Wolff I. c.), Kékes (Pr. Cp. 144), Szék, Cege, Feketelak, Pujon (Soó 120), Mojos, Szabéd (Lengy. ap. Soó 120), Bala, Faragónnyulas (Ny. ap. Soó 120), M.vásárh. (Ny. Mv. 105)

1317. *S. hispanica* L. — Kv. Szénafű, Fejér (Soó GM. 88, 92, 99, AGH. V. 147, Pr. Cp. 134—143, auct. multi ap. Ny. Kv. 593), Melegv.(!), Apahida (Pr. Cp. 143), Dezmér(!), A.zsuk, Ajton (Ny. I. c.), K.bós (Freyn 92, Ny. I. c.), Kolozs, Berkenyes, Virágosv. (Freyn 92), Torda (Unverricht ap. Fuss VSV. XIV. 197, Wolff 62), M.szovát (Borza Guide 207), Gerend (Wolff I. c.), Báld (Pr. Cp. 146), Fejér, Telekfarka-Apahida, Bonchida-Szék, Szék (Soó 120), Bazéd, Szabéd (Lengy. ap. Soó 120) — *b. glastifolia* (Willd.) Wallr. — Kv. Szénafű (Soó BK. XXV. 145) — *e. sinuata* Wallr. — Mezőség (Schur En. 363)

ssp. *strictiformis* Domin — Kv. Szénafű (Wolff ap. Janka 587, Simk. En. 199, Soó GM. 98, Joó ap. Soó AGH. V. 176), Vszt.gothárd, Katona-Kiscég, M.záh (Janka MTK. XII. 180)

1318. *S. humilis* L. — Kv. Szénafű, Fejér (Landoz Kv. I. 10, EM. II. 33, Simk. En. 355, Joó GM. 92, Kv. 669, Ny. — Pop FER. 693, Pr. Fl. I. 1078, auct. multi ap. Ny. Kv. 594), Torda (Fuss Transs. 384) — *b. angustifolia* Horn. — Kv. Szénafű (Soó Kv. 669)

1319. *S. parviflora* Jacq. — Kv. Szénafű, Melegv. (Andrae BZ. XIII. 324, Ny. FK. 1941. 46—9, Pr. Cp. 140, Fl. II. 292, auct. multi

ap. Ny. Kv. 594, Soó Consp. 12—3, 28, Todor FER. 2493), Kv.-Szamosfa-Apahida (Simk. En. 355, Soó GM. 100, in Gr. 249, AGH. V. 152—3, Consp. 28—9, 32—4, 44—5, Bujorean BCI. XIV. 227, Ny. EM. 1941. 113—5, auct. multi ap. Ny. Kv. 594, Csürös BCI. XXVII. 80), Kolozs (Bgt. III. 10, Freyn 92, Soó in Gr. 249), K.kara, K.bós, Virágosv. (Freyn 92), Torda (Bgt. I. c., Schur VSV. X. 79, Wolff MNL. I. 62, Freyn 92, Hayek 467, Soó in Gr. 249), M.záh (Simk. En. 355), Bonchida (Pr. Fl. II. 340, Soó Consp. 28), Szék-Gyulafelke (Soó Consp. 28—9, 33—4, 44—5), Hesdát (Pr. Fl. II. 297), Szék-Sz.újvár (Pr. MBL. V. 32), Désakna (Bgt. I. c., Pr. Fl. II. 289)

1320. *S. cana* (C. A. Mey.) Hoffm. — Frequens, praecipue in salinis. — *f. simplex* (Birsch.) Hay. — Szamosfa (Soó BK. XXIII. 145, in Gr. 248, GM. 102, Csürös BCI. XXVII. 82) — *f. tenuissima* (Borb.) Rapes. — Szamosfa, Apahida, Kolozs, Torda (Soó I. c.), Kv. Melegv. (Simk. En. 357 sub „*Pod. laciniato v. integrifolio*“)

1321. *Chondrilla juncea* L. — Vszt.iván (K. et O. 8), Feketelak, Vszt.gothárd (Soó 119), M.ludas, M.ugra (Ny. ap. Soó 119)

1322. *Taraxacum hessarabicum* (Horn.) Hand.-Mazz. — Kv. Szénafű „Elővölgy“ (Ny. FK. 1941. 46, 52, Kv. 595, Soó Consp. 13), Dés (Pr. Cp. 79), Szamosfa, Apahida (Pr. Fl. I. 1081)

1323. *T. laevigatum* (Willd.) DC. — Kv. Szt.györgyh. (Soó Kv. 669), Dezmér (Ny. Kv. 595), Szamosfa (Soó Consp. 51, 56), Kecsed (Hg. I. 126), Vszt.gothárd (Janka MTK. XII. 180), K.borsa-Válaszút(!)

1324. *T. officinale* Webb. — Frequens.

1325. *T. palustre* (Lyons) Lam. et DC. — Szamosfa (Soó AGH. V. 152, Consp. 28, 34, 46), Kv. Melegv. (Soó I. c. 29), Előv. (Soó Kv. 669) — *b. seorzonera* Gaud. — Kv. Előv. (Ny. FER. 1586), Szszt.miklós-Apahida (Ny. Kv. 596), Szamosfa (Soó Kv. 669)

1326. *Mycelis muralis* (L.) Dum. — (EK. 283) — Sz.újvár, F.mikola, B.váralja, Bonchida-Szék, Sz.jenő, Cege, P.kamarás. — Torda (Freyn 93)

1327. *Laetitia quercina* L. — (EK. 283) — Dezmér, Apahida, Korpád, Ö.füzes, Bazéd. — Torda (Todor FER. 2596 *f. appendiculata* Bujorean et Todor)

1328. *L. Chaixii* Vill. : *L. quercina* L. ssp. *Chaixii* Hayek — (EK. 283) — Dezmér, Apahida, K.bós, Kolozs, Pujon, Vszt.egyed, Vszt.gothárd, Kályán, Korpád, P.kamarás, M.ménes, M.kök, K.borsa. — Torda (Wolff 62)

1329. *L. saligna* L. — Frequens. cum *b. runcinata* Gr. et Godr. Kv. Szénafű (Ny., Soó Kv. 599), Szamosfa (Richt. ap. Ny. I. c.), Apahida (Ujv. Kv. 669), K.bós (Ny. I. c.)

1330. *L. serriola* Torn. (*L. virosa* auct.) — Frequens, — *b. integrata* Gr. et Godr. — Kv. Szt.györgyh. (Wolff ap. Soó BK. XXIII. 158)

1331. *L. viminea* (L.) Presl — Torda (Freyn 93, Simk. En. 360), N.sármás (Borza BCI. VIII. 21)

L. sativa L. — Subspont. : Szamosfa-Apahida (Priszter 90).

1332. *L. saligna* × *serriola* (*L. dichotoma* Simk.) — Apahida (Ny. Ujv. Kv. 599)

1333. *Sonchus paluster* L. — Szamosfa (Bujorean BCI. XIV. 227),

Torda (Wolff 62), Apahida „Kerekítő“ (Pr. Cp. 53, deest in Ny. Kv.), Désakna (Hg. II. 70 f. *xanthotrichus* Kárp.), Sz.újvár (K. et O. 23)?

1334. *S. arvensis* L. — Frequens, in formis multis : **b. uliginosus** (MB.) : *laevipes* Koch vulgatissima. — *f. major* Neir. — Kv. Szénafű (Soó GM. 597), Szamosfa (Soó in Gr. 251), — *f. pseuduliginosus* Soó — Kolozs (Schur VSV. X. 111 sub *v. intermedio*)

1335. *S. oleraceus* L. — Frequens, in formis : *integrifolius* Wallr., *triangularis* (Willd.) Wallr., *lacerus* (Willd.) Wallr. (cf. Ny. Kv. 597)

1336. *S. asper* (L.) Hill. — Frequens, in formis : *inermis* et *pungens* Bischoff (cf. Ny. I. c.)

1337. *Crepis rhoeadifolia* M. B. — Frequens. — *f. sinuato-dentata* Schur — Kolozs (Schur En. 373)

1338. *C. setosa* Hall. f. — Kv. Szénafű (Pr. Cp. 96, Soó Kv. 599), Fejér(!), Szamosfa (Richt. ap. Ny. I. c.), Kolozs, K.bós, Virágosv. (Freyn 93), Sz.újvár (K. et O. 4, Pr. Cp. 46), Mócs, M.ludas, M.örményes (Pr. Cp. 109, 166—8), Torda (Schur VSV. X. 78, Hayek 467), M.vásárh. (Ny. Mv. 116), Dés (Lengy.)

1339. *C. praemorsa* (L.) Tausch — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 101, Soó GM. 88, 92, AGH. V. 148, Pr. Cp. 138, (Freyn 93, Meusel 301), auct. plures ap. Ny. Kv. 599—600), Dezmér, Ajton (Ny. I. c.), Kolozs Torda (Freyn 93), Sz.újvár (K. et O. 13, Pr. Cp. 118), M.vásárh. (Ny. Kv. 117)

1340. *C. pannonica* (Jacq.) C. Koch — K.bós (Freyn 93), Kolozs, Korpád, Vszt.gothárd-Feketelak (Janka MTK. XII. 180), Katona-Kiscég (Janka ÖBZ. XVIII. 233), Torda (Janka MTK. I. c.) -Virágosv. (Wolff 62)

1341. *C. pulchra* L. — Kv. Szénafű, Szt.györgyh. (Schur VSV. X. 101, En. 373, Nagy ap. Andrae BZ. XIII. 325, Landoz EM. II. 32, Soó GM. 92), Gerend (Wolff 62)

1342. *C. nieaeensis* Balb. — Kolozs, Virágosv. (Freyn 93), Korpád (Freyn ap. Ny. Kv. 600), M.vásárh. (Ny. Mv. 117)

1343. *C. biennis* L. — Frequens, in formis multis : **a. dentata** Koch (non indicata) **b. lacera** W. et Gr. (incl. *banatica* Rochel) — Kv. Szénafű (Soó BK. XXIII. 158, Kv. 669, Péterfi, Richt., Ny. Kv. 601), Apahida (Ny. I. c.), Virágosv. (Ny. FER. 1592), Doboka-Moró (Hg. I. 128) — **c. runcinata** Koch — Kv. Szénafű (Schur En. 375, Richt., Soó, Ny. I. c.), K.bós-Virágosv. (Ny. I. c.), A.zsuk (Borza FER. 2093), Szamosfa (Soó Kv. 669) — *f. leptophylla* Wallr. — Kv. Szénafű (Richt. ap. Ny. I. c.)

1344. *C. tectorum* L. — Frequens, sed in terr. rarius. — Kv. Szénafű, Szamosfa (Ny. Kv. 601)

1345. *C. paludosa* L. Mönch — Apahida (Priszter AGH. VI. 90)

1346. *Prenanthes purpurea* L. — Ad limites Torda (Wolff MNL.

I. 62)

1347. *Hieracium Hoppeanum* Schult. — Kv. Szénafű (Pr. Cp. 134), M.vásárh. (Ny. Mv. 112 b. *leucolepioides* Deg. et Z. sub *H. pilosella* ssp.)

1348. *H. pilosella* L. — Frequens, in formis multis, indicata e Kolozsvár-Szénafű : *obseurisquamum* N. P. (Pr. Fl. I. 1118), *stroblium* N. P. (Ny. Kv. 604), Szamosfa : *inalpestriforme* Z. (Borb. ap.

Ny. Kv. 605), *rosulinum* Z. (Soó Kv. I. c.), Szabéd: *trichosecapum* N. P., *szabédense* Lengy. et Z. (Lengy. MBL. XXV. 286—7), M.vásárh. : *latiuseulum* N. P., *parviflorum* N. P., *subvireseens* N. P., *trichophorum* N. P., *tricholepium* N. P., *trichocephaloides* Z. (Ny. Mv. 112), Sz.újvár : *rigidipilum* N. P., (Hg. II. 68), B.váralja : *subparviflorum* Z. (Hg. III. 126)

1349. *H. aurantiacum* L. — Kv. Szénafű (Pr. Cp. 133, Fl. I. 1122, Ny. Kv. 606), Szamosfa, Dezmér (Soó Scr. II. 104 *carpathieola* N. P., *subkajanense* Z.), Ajton (Freyn 94)

1350. *H. aurantiacum* > *auricula* (*H. fuseum* Vill.) — Kv. Szénafű (Ny. Kv. 608)

1351. *H. auricula* Lam. et DC. — Kv. Szénafű (Schur VSV. X. 101, Soó GM. 87, Pr. Fl. I. 1121 *f. epilosum*, *subpilosum*, *marginatum* N. P.), Melegv.(!), Szamosfa (Soó Scr. II. 106 *melaneilema* N. P.), Apahida-K.kara (Pr. Cp. 98), Kékes (Pr. Cp. 92), M.vásárh. (Ny. Mv. 114 *acutisquamum* N. P., *melaneilema* N. P.), Szabéd (Szakmáry 119), Torda (Ercsei 74) K.borsa(!)

1352. *H. auricula* — Bauhini (*H. Koernickeanum* (N. P.) Z. — Kv. Szénafű (Ny. Kv. 611 *bauhiniforme* Nyár.), B.váralja (Hg. III. 127)

1353. *H. auricula* — *pilosella* (*H. Schultesii* F. Schultz) — Kv. Szénafű (Pr. Fl. I. 1122 *megalophyllum* N. P.)

1354. *H. pilosella* — *Bauhini* (*H. brachiatum* Bert.) — Kv. Szénafű (Soó GM. 87, 92, Pr. Cp. 136, Fl. I. 1141 *subtile* N. P. II. 444, 457, Ujv. ap. Ny. Kv. 623 (*eu-brachiatum* Z.), Ny. I. c. *brachiatoides* Hofm.), Szamosfa-Dezmér (Soó Scr. II. 106, Kv. 623 *tapinum* N. P., Borb. ap. Ny. I. c. *brachiatiforme* N. P., *pseudobrachiatum* (Cel.) N. P. *f. brevipilum* N. P.), Apahida (Ny. I. c.), M.szovát (Borza Guide 208, N.y I. c. *pieniakense* Rehm.), B.váralja (Hg. III. 128 *obseurum* Rchb.), Sz.újvár (K. et O. 14)?, Kolozs (Bgt. III. 22), Torda (Bgt. I. c., Ercsei 74, Sebők 31), M.záh, M. pagocsa (Ercsei 74), M.vásárh. (Ny. Mv. 114 *brachiatiforme*, *pieniakense*, *pseudobrachiatum*)

1355. *H. pilosella* < *Bauhini* (*H. leptophyton* N. P.) — M.szovát (Pop Guide 165), B.váralja (Hg. III. 125), M.vásárh. (Ny. Mv. 114 *anoeladrum* N. P., *bauhiniformum* N. P., *euleptophyton* Z.)

1356. *H. pilosella* — *echooides* (*H. bifureum* M. B.) — Szabéd (Lengy. et Z. MBL. XXV. 292 *szabedinum* Lengy. et Z.)

1357. *H. Bauhini* Schult. ap. Bess. — Frequens, in formis multis. **ssp. aeristolonum** Z. — Kv. Szénafű (Pr. Fl. I. 1134 typus : *eu-aerost. Z.*, Soó Scr. II. 109 *pseudosparsum* Z. : *sparsum* N. P.)

ssp. magyaricum (N. P.) Z. — *adenocymum* N. P. — Apahida, Borsa (Soó Scr. II. 10) — *adenocymigeriforme* Lengy. et Z. — Kv. Szénafű-Szamosfa-Apahida (Soó I. c., Kv. 669) — *Besserianum* (Spr.) N. P. — Apahida (Soó I. c.), Szabéd (Lengy. MBL. XXV. 293), M.vásárh. (Ny. Mv. 116) — *decolor* N. P. — Apahida (Soó I. c.) — *dobokanum* Nyár. et Soó — Sz.újvár, Apahida (Soó I. c.) — *heothinum* N. P. — Kv. Szénafű (Pr. Fl. I. 1136), M.vásárh. (Ny. Mv. 116) — *holopilon* N. P. — Apahida, K.borsa (Soó I. c.) — *magyaricum* N. P. (*eu-magy. Z.*) — Kv. Szénafű (Borza ap. Ny. Kv. 614), K.bós (Ny. I. c.), Kékes (Pr. MBL. X. 135), M.vásárh. (Ny. Mv. 116) — *megalomastix* N. P. — Sz.újvár (Hg. II. 68) — *nigrisetum* N. P. — Kv. Szénafű

(Borb. ap. Ny. Kv. 614) — **pseudo-Kerneri Z.** (*Kerneri N. P.*) — Kv. Szénafű (Soó l. c. 109, Ny. l. c.) — **submagyaricum N. P.** — Kv. Szénafű (Soó l. c.) — **tephrops N. P.** — Kv. Szénafű (Borb. ap. Ny. l. c. 613), Apahida (Soó Kv. 613), M.szovát (Ny. l. c.)

 ssp. **eu-Bauhini Z.** — **auriculoidiforme Z.** — Szabéd (Lengy. MBL. XXV. 293) — **Bauhini N. P. (eu-B. Z.)** — Kv. Szénafű (Soó Scr. II. 108) — **cymanthum N. P.** — Kv. Szénafű (Borb. ap. Ny. Kv. 615) — **maerum N. P.** — Kv. Szénafű (Ny. l. c.), K.borsa, Bánok, Sz.-újvár (Soó l. c.), M.vásárh. (Ny. Mv. 116) — **melachaetum** (Tausch) N.P. — Kv. Szénafű (Soó l. c.) — **radioeaule** (Tausch) N. P. — B.váralja (Hg. III. 128) — **polyanthemum N. P.** — M.vásárh. (Ny. Mv. 116) — **sedutrix Rehm.** — Kv. Szénafű, Tarcsa (Borb., Soó ap. Ny. Kv. 15) — **transgressum N. P.** — Kv. Szénafű (Soó l. c.) — **viseidulum** (Tausch) N. P. — M.vásárh. (Ny. Mv. 116)

1358. **H. Bauhini** — **echooides** (*H. auriculoides* Láng) — Kv. Szénafű (Pr. Cp. 134, Fl. I. 1142 : *auriculoides* N. P. (*eu-aur* Z.), Fl. II. 444, 457, Ujv. ap. Ny. Kv. 616 : *longisetiforme* Korb. et Z., Ny. Kv. 617 : *pseudotaxiceps* Z., Melegv. (A. Nyár. et Szűcs ap. Soó Scr. II. 107 : *pseudotanythrix* Z. f. *sursumglaber* Nyár., Ny. Kv. 616 : *tanythrix* N. P. f. *catotrichum* Z.), Apahida (Pr. Cp. 143, Ny. l. c. : *stoloniferum* Bess.), A.zsuk, Ajton (Ny. l. c. 616), Dezmér (Pr. Fl. II. 293), Sz.újvár (Hg. III. 68 *tanythrix, umbellosum* N. P.), Tötör-Moró (Hg. I. 127), Mojos (*sarmentosum* (Fröl.) Z. — Lengy. l. c. 300), Szabéd (Lengy. MBL. XXV. 299 *pachymastix* N. P. *Simkovicsii* N. P. Thaisz MBL. X. 140 *pannonicum* N. P.), M.vásárh. (Ny. Mv. 116 : *asperrim* (Schur) N. P., *longisetum* N. P., *pannonicum* N. P., *parvieapitalum* N. P.)

Dubia : *H. echooides* Lumn. — Kolozs, Torda (Schur En. 385)

1359. **H. auricula** — **caespitosum** (*H. longiscapum* Boiss.) — Faragó-N.nyulas (Janka ap. Z. Ann. Mus. Nat. 1910. 43 *faragense* Z.), M.vásárh. (Ny. Mv. 115 *spatophyllum* N. P.)

H. pilosella — *caespitosum* (*H. flagellare* Willd.) — M.vásárh., ad limites (Ny. Mv. 113 *tatrense* N. P.)

1360. **H. caespitosum** Dum. (*H. pratense* Tausch) — Kv. Szénafű (Pr. Cp. 134), Sz.újvár (K. et O. 14)?, M.vásárh. (Ny. Mv. 115 *silvicolum* Fr.)

1361. **H. Bauhini** — **echooides** — **pilosella** (*H. euchaetium* N. P.) — M.szovát (Ny. Kv. 621, Pr. Fl. I. 1139), M.vásárh., M.szabad (Ny. Mv. 113 *longum* N. P., ap. Z. Syn. I. 485), Galambod (Ny. Mv. 113, ap. Z. l. c. *euchaetium* N. P. et *longum*)

1362. **H. Bauhini** — **cymosum** (*H. Tauschii* Z.) — Kv. Szénafű (Soó ap. Ny. Kv. 620 *spaniopolium* Z.), Jósikatanya (Schmidt ap. Ny. l. c.), M.szilvás (Borza BCl. VIII. 18)

1363. **H. cymosum** L. — Kv. Szénafű (Moesz ap. Z. Ann. l. c. 44, Soó GM. 88, 92, Pr. Cp. 136—138, Fl. II. 444, auct. plures ap. Ny. Kv. 619), A.zsuk (Ny. l. c.), Apahida (Pr. Cp. 143), Kolozs, K.bós (Freyn 94), Szabéd (Szakmáry 119), Torda (Ercsei 74)

 ssp. **eucymosum** Z. (*cymosum* N. P., *typicum* Z.) — Kv. Szénafű (Moesz ap. Z. Ann. 1910. 44, Zsák ap. Z. MBL. XXV. 5, Soó Scr. II. 110, Ny. Kv. 619, Pr. Fl. I. 1127 f. *normale*, f. *hirtum*, f. *obscuriceps* N.

P.), Apahida (Soó l. c.), Feketelak (Pr. MBL. X. 130) — **sabinum** (Seb. et Maur.) N. P. (*eu-sab.* Z.) — Kv. Szénafű (Soó l. c. 111, Borb., Ujv., Ny., 620 f. *genuinum*, f. *pseudosabinum* N. P.)

 ssp. **Vaillantii** (Tausch) Z. **cymigerum** (Rchb.) N. P. — Kv. Szénafű (Soó l. c., Borb., Knapp ap. Ny. Kv. 619 f. *calvipedunculum*, f. *hirtipedunculum* N. P., f. *subeglandulosum* Nyár.), Feketelak (Pr. MBL. XV. 258 f. *reptans* N. P.) b. **ramosum** Nyár. — Kv. Szénafű (Borb. ap. Ny. l. c.)

1364. **H. piloselloides** Vill. — Kv. Szénafű, Melegv., Jósikatanya (Soó Kv. 609, 669), B.váralja (Hg. III. 128), Szabéd (Szakmáry 119)? *H. Bauhini* — *echooides* — *cymosum* (*H. megatrichum* Borb.) — Kv. Szénafű (Pr. Fl. I. 1143—4 cum?)

1365. **H. bifidum** — **transsilvanicum** (*H. pseudobifidum* Schur) — F.mikola (Hg. II. 66 *strictifidum* Z.)

1366. **H. silvaticum** — **transsilvanicum** (*H. praecurrens* Vukot.) — Dés (Z. Syn. II. 769—770 *lancifolium* (Vuk.) Z. et *eu-praeurrens* Z.), B.váralja (Hg. III. 127—8 *eu-praece.* et *macrodiaphyllum* Z.), Szúnémeti, Coptelke (Hg. III. 130), Bál (Borza BCl. VIII. 22 sub „*H. caesio*“)?, Cege-Pujon (Soó 120)

1367. **H. silvaticum** (L.) Grub. — Ajton, Berkenyes, Torda (Freyn 94 sub „*H. Schmidtii*“)?, Mohaj (Janka 588), Bál (Borza BCl. VIII. 22), Kékes, M.szovát (Pr. Cp. 21), M.vásárh. (Ny. Mv. 112) ad limites terr. : **grandidens** Dum., **oblongum** Jord., **pleiophyllogen** Z.

1368. **H. umbellatum** L. — Frequens, in formis multis. — Kv. Szénafű (Soó GM. 84, 98, BK. XXV. 145, Scr. II. 120 *esuriens* Z. f. *limonium* Griseb., Wolff ap. Ny. Kv. 637 f. *verum* Z.), Dés (Z. Syn. III. 502—3 *pervagum* (Jord.) et *serotinum* Host), Szabéd (Lengy. MBL. XXV. 387, f. *verum* Z.), M.bárd (Viski ap. Lengy. l. c. v. *aliflorum* Fr. f. *latius* Z.), Kékes (Pr. MBL. X. 164 *latifolium* A-T.)

1369. **H. sabaudum** L. — Apahida (Soó Erd. Kis. 283), Kolozs, Ajton (Freyn 95), Bál (Borza BCl. VIII. 22), Dés (Z. Syn. III. 537 : *obliquum* (Jord.) Sudre f. *Stiriae* Z., 553 : *vagum* (Jord.) Z., 555 : *subvagum* Murr et Z. f. *latifolium* Z.)

1370. **H. racemosum** W. et K. — M.szilvás (Borza BCl. VIII. 18) an vero?